

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
DE  
**LOUIS VAN HOUTTE.**

PLANTES  
DE  
**SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE,**

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été,  
à décorer les parterres, à l'air libre.

**AMARYLLIDÉES.**  
CACTÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS.  
CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACEES.

**ORCHIDÉES ET PALMIERS.**

PANDANÉES, PASSIFLORÉES, SCITAMINÉES, SARRACÉNIÉES.  
ANÉMONES. — GLADIOLUS. — IRIS. — LILIUM.  
*Graines Fourragères. — Plants d'Asperges.*

**ROSIERS NOUVEAUX EN TOUS GENRES,**


(Livrables en pots),

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE


**LOUIS VAN HOUTTE,**


ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gandbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés horticoles, scientifiques, etc., Éditeur de la **FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE**, etc., Bourgmestre de Gandbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de Belgique, de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne, de Russie, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),  
FOURNISSEUR DU ROI.

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.




 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.

Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

## AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest'ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell'ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.



# CULTURES

## DE


# LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'Ecole d'horticulture de l'État à Gandbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés horticoles, scientifiques, etc., Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc., Bourgmestre de Gandbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de Belgique, de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne, de Russie, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),  
FOURNISSEUR DU ROI.

## SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

### OBSERVATIONS.

 Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un :

- b* sont bulbeuses ou tuberculeuses;
- e* peuvent passer l'été dehors, en pots;
- t* peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- g* sont grimpantes;
- or* se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides;
- pt* qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins;
- aq* sont des plantes aquatiques.

*Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées; mais le nom du genre ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (Flore.....), placée à la suite des noms des plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, dont XXI volumes ont paru et dont le 1<sup>er</sup> fascicule (1, 2, 3) du XXII<sup>e</sup> volume est sous presse.

|   | Fr. C.  |  | Fr. C.  |
|---|---------|--|---------|
| <i>e</i> <i>Abutilon</i> Darwini . . . . .  | 2 "     | <i>or</i> <i>Acalypha</i> tricolor . . . . .         | 2 à 5 " |
| " — tessellatum . . . . .   | 3 "     | <i>pt</i> <i>Acanthus</i> montanus (FLORE) . . . . . | 1 "     |
| <i>t</i> — Sellowianum variegatum. . . . .  | 3 à 5 " | " <i>Achyranthes</i> acuminata . . . . .             | " 50    |
| Feuillage immense, de toute beauté; richissime panachure.<br>Le plus bel <i>Abutilon</i> connu. |         | " — aureo-variegata. . . . .                         | " 50    |

|   | Fr. C. |   | Fr. C.    |
|---|--------|---|-----------|
| <i>pt</i> <i>Achyranthes</i> Lindenii . . . . .       | n 50   | <i>t</i> <i>Alpinia</i> calcarata. . . . .        | 4 n       |
| " — Verschaffelti (FLORE, XV, 191) . . . . .          | n 50   | " — nutans ( <i>Globba</i> ) (FLORE) . . . . .    | 4 n       |
| " — — aureo-variegata . . . . .                       | n 50   | " — sanguinolenta . . . . .                       | 3 n       |
| <i>or</i> <i>Adelaster</i> albo-venosus . . . . .     | 3 n    | " — vittata . . . . .                             | 6 à 100 n |
| <i>or, t</i> <i>Alibertia</i> edulis. . . . .         | 10 n   | <i>pt</i> <i>Alternanthera</i> amabilis . . . . . | n 50      |
| <i>g, or</i> 1. <i>Allamanda</i> Hendersoni . . . . . | 2 n    | " — — latifolia . . . . .                         | n 50      |
| " " 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129) . . . . .        | 2 n    | " — amœna . . . . .                               | n 50      |
| " " 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25) . . . . .         | 5 n    | " — paronychioides . . . . .                      | n 50      |
| " " 6. — Wardleiana . . . . .                         | 5 n    | " — spathulata . . . . .                          | n 50      |
| <i>t</i> <i>Alpinia</i> Bangka . . . . .              | 4 n    | <i>t</i> <i>Amomum</i> Cardamomum . . . . .       | 5 n       |



ALPINIA VITTATA. — 6 à 100 francs.



|  | Fr. C.    |   | Fr. C.     |
|--|-----------|---|------------|
| <i>t</i> <i>Amomum gracile</i> . . . . .             | 3 n       | <i>e</i> <i>Aralia dactylifolia</i> . . . . .             | 12 à 50 n  |
| <i>or</i> <i>Antiaris toxicaria</i> . . . . .        | 10 à 20 n | n — <i>elegantissima</i> . . . . .                        | 35 à 100 n |
| <i>gt</i> <i>Antigonon guatemalense</i> . . . . .    | 3 n       | n — <i>farinosa</i> . . . . .                             | 5 n        |
| n — <i>leptopus</i> (FLORE, XVIII, 105) . . . . .    | 2 n       | n — <i>Guilfoylei</i> . . . . .                           | 6 n        |
| <i>t</i> <i>Aphelandra aurantiaca</i> Rœzli. . . . . | 2 n       | n — <i>Humboldti</i> . . . . .                            | 15 n       |
| (FLORE, XVII, 53.)                                   |           | n — <i>leptophylla</i> . . . . .                          | 5 n        |
| n — <i>fascinator</i> . . . . .                      | 4 n       | n — <i>nymphææfolia</i> . . . . .                         | 2 n        |
| n — <i>nitens</i> . . . . .                          | 4 n       | n — <i>Osyana</i> . . . . .                               | 6 n        |
| n — <i>Porteana</i> (FLORE, X, 41) . . . . .         | 4 n       | <i>pt</i> — <i>papyrifera</i> (FLORE, VII, 153) . . . . . | 1 n        |
| n — <i>squarrosa</i> Leopoldi. . . . .               | 2 n       | <i>e</i> — <i>parasitica</i> . . . . .                    | 60 n       |
| (FLORE, IX, 85.)                                     |           | n — <i>platanifolia</i> . . . . .                         | 5 à 10 n   |
| n — <i>variegata</i> . . . . .                       | 2 n       | n — <i>reticulata</i> . . . . .                           | 4 n        |



ARALIA OSYANA. — 6 francs.



|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| e <i>Aralia Sieboldi</i> . . . . .            | 1 à 10 "   |
| en belles plantes, le cent                    | 50 à 100 " |
| n — — <i>aureo-reticulata</i> . . . . .       | 10 "       |
| n — — <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . . | 5 à 40 "   |
| pt — — — <i>aureo-marginatis</i> . . . . .    | 5 à 25 "   |
| t — <i>Veitchi</i> . . . . .                  | 25 "       |
| n <i>Ardisia crenulata</i> . . . . .          | 2 "        |
| n — — <i>fructu albo</i> . . . . .            | 2 "        |
| or — <i>Groenewegeni</i> . . . . .            | 15 "       |
| t — <i>hortorum fructu luteo</i> . . . . .    | 2 "        |
| n — — — <i>rubro</i> . . . . .                | 2 "        |
| n — <i>villosa</i> . . . . .                  | 2 "        |
| n <i>Argania Sideroxylon</i> . . . . .        | 10 "       |
| g,t 5. <i>Aristolochia barbata</i> . . . . .  | 6 "        |
| n n 14. — <i>clypeata</i> . . . . .           | 5 "        |
| n n 1. — <i>cordifolia</i> . . . . .          | 4 "        |
| n n 2. — <i>Duchartrei</i> . . . . .          | 5 "        |

(FLORE, XVIII, 35.)



ARISTOLOCHIA DUCHARTREI. — 5 francs.

(Voir FLORE, XVIII, page 35.)

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| g,t 15. <i>Aristolochia floribunda</i> . . . . . | 10 "   |
| n n 17. — <i>galeata</i> . . . . .               | 15 "   |
| n n 3. — <i>gigas</i> . . . . .                  | 5 "    |
| n n 6. — <i>labiosa</i> . . . . .                | 3 "    |
| n n 7. — <i>leuconeura</i> . . . . .             | 2 "    |
| n n 8. — <i>ornithocephala</i> . . . . .         | 5 "    |
| (FLORE, XVII, 145.)                              |        |
| n n 9. — <i>ringens</i> . . . . .                | 4 "    |
| n n 11. — <i>tricaudata</i> . . . . .            | 5 "    |

|   | Fr. C.   |
|---|----------|
| g,t 12. <i>Aristolochia trilobata</i> . . . . .   | 3 "      |
| n n 18. — <i>variegata</i> . . . . .  | 25 "     |
| Du Mexique; feuillage tout marbré. L'Établissement en a acheté la propriété à la dernière grande vente de M. Linden, à Bruxelles. |          |
| n <i>Arrabidaea rosea</i> . . . . .   | 2 "      |
| or <i>Artocarpus incisa</i> . . . . .   | 20 "     |
| L'arbre à pain.   |          |
| n — <i>laciniata</i> . . . . .  | 15 "     |
| n — — <i>metallica</i> . . . . .  | 15 "     |
| t <i>Aspidistra elatior</i> . . . . .   | 1 "      |
| n — — <i>foliis aureo-punctatis</i> . . . . .   | 3 "      |
| n — — — <i>vittatis</i> . . . . .   | 2 "      |
| n <i>Astrapæa glutinosa</i> . . . . .   | 6 "      |
| n — <i>Wallichi</i> (FLORE, XXII) . . . . .   | 3 à 15 " |
| or <i>Atacica cristata</i> (FLORE, IX, 13) 10 à 25 "  |          |
| n — <i>pinnatifida</i> ( <i>Tacca</i> ) . . . . .   | 4 à 10 " |
| t <i>Bambusa stricta</i> . . . . .  | 10 "     |
| n — <i>verticillata</i> . . . . .   | 15 "     |
| or <i>Barringtonia racemosa</i> . . . . .   | 10 "     |
| n <i>Bertolonia guttata albo-punctatis-sima</i> . . . . .   | 3 "      |
| n — — <i>roseo-punctatissima</i> . . . . .  | 3 "      |
| Charmautes plantes admirablement ponctuées de blanc et de rose.   |          |
| n — <i>hyb. Marchandii</i> . . . . .  | 5 "      |
| les douze. . . . .  | 50 "     |
| n — — <i>Mirandei</i> . . . . .   | 10 "     |
| (FLORE, XXI, 135.)  |          |
| les douze. . . . .  | 75 "     |
| n — — <i>Van Houttei</i> . . . . .  | 15 "     |
| (FLORE, XX, 109.)   |          |
| les douze. . . . .  | 125 "    |

Nous avons promené ces trois bijoux à toutes nos Expositions et des médailles d'or les y ont accueillis. — A Lille, sous une simple tente de bois, à peine préservé de ces 2-3° de froid, si néfastes alors aux vignobles de France, le *Bertolonia Van Houttei*, brillant comme un diamant, y étalait ses chatoyants rubans rouge aniline sur fond noir, lui-même parsemé de myriades de points tout aussi brillants. Cette conquête est restée là, réglementairement, pendant douze jours, donc une absence de vingt jours, voyage compris! — De là, la même plante est allée se faire décerner la médaille d'or à l'Exposition de la Société Royale de Tournay; puis la Société Royale de Gand l'a couronnée à son tour, aux acclamations de nos meilleurs confrères de toutes les parties de la Belgique et de l'étranger qui l'ont qualifiée de *merveille des merveilles*! — Enfin est venu le tour de Bruxelles!

Voici ce qu'en dit M. Aubanel, de l'Indépendance belge, dans sa Revue de l'Exposition de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles :

« ..... Nous pouvons donner un libre cours à nos éloges, sûr de l'exposer personnes aux déceptions. Il y a une heure agréable à passer dans la vaste cour du palais de justice, et, pour que le visiteur la mette à profit, nous lui demanderons de vouloir bien nous accepter comme guide et cicérone.

« Arrêtons-nous, tout d'abord, à l'entrée, dans la salle qui s'ouvre devant le contrôle, et où sont déposés les herbiers et certaines plantes délicates, qu'on ne peut exposer à l'air. Là se trouve, sous globe, la rareté rarissime de l'Exposition, une plante obtenue de semis par M. Louis Van Houtte, de Gand, la *Bertolonia*, belle à ravir avec ses fonds bruns veinés de rouge, et cotée au faible prix de 6000 francs.

« Nous disons faible prix, et ce n'est pas une plaisanterie. Comme tant d'autres, qui ont coûté plus cher, elle peut faire la fortune de celui qui la vulgarisera. Elle tient le premier pas dans le concours ouvert pour « la plante gagnée de semis et offrant le plus d'avantages au commerce. »

Après le *BERTOLONIA VAN HOUTTEI*, qui occupe certes le haut du trône réservé au trio, le *BERTOLONIA MIRANDÆI* peut parfaitement revendiquer une place bien distinguée,



lui aussi, avec ces perles carmin qui couvrent régulièrement le tapis de velours vert olive qui tapisse son feuillage. On l'associera à tout jamais à son chef de file. Quand au BERTOLONIA MARCHANDI, bien qu'il vienne en troisième ordre, comparé à ses congénères, ses très-grandes feuilles vert velouté et ses rubans blancs en feront toujours l'un des privilèges de ce petit coin réservé aux merveilles végétales à caser sur les tablettes de devant des serres chaudes.

Fr. C.

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| t  | <b>Bignonia Lindleyi</b> (FLORE, IX, 135)      | 2 | " |
|    | Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas. |   |   |
| "  | — <i>ornata</i>                                | 2 | " |
| "  | — <i>venusta</i>                               | 3 | " |
| pt | 11. <i>Bougainvillea elegantissima</i>         | 5 | " |



ARISTOLOCHIA GALEATA. — 15 francs.


|   | Fr. C. |
|---|--------|
| or <i>Bertolonia maculata</i>             | 3      |
| " — <i>margaritacea</i> (FLORE, XVI, 165) | 5      |
| " — <i>marmorata</i> ( <i>Eriocnema</i> ) | 3      |
| (FLORE, VII, 291.)                        |        |

Charmant bijou hilliputien à couleurs chatoyantes et à panachure des plus délicates; à cultiver sous cloche.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| pt 12. <i>Bougainvillea fastuosa</i>        | 5      |
| " 8. — <i>glabra</i>                        | 3      |
| " 2. — <i>gracilis</i> ( <i>Weissiana</i> ) | 2      |
| " 3. — <i>lateritia</i>                     | 3      |
| " 10. — <i>speciosa</i>                     | 4      |



|   | Fr. C.  |   | Fr. C.  |
|---|---------|---|---------|
| <i>pt</i> 4. <i>Bougainvillea splendens</i> . . . . .   | 2       | <i>or</i> <i>Carapa guianensis</i> . . . . .                  | .4 à 10 |
| <i>n</i> 9. — <i>splendida</i> . . . . .                | 3       | <i>n</i> 74. <i>Carludovica atrovirens</i> ( <i>plicata</i> ) | 8 à 15  |
| <i>or</i> <i>Brachychiton sumatranum</i> . . . . .      | 10      | <i>n</i> 76. — <i>humilis</i> . . . . .                       | .25     |
| <i>t</i> <i>Brosimum Alicastrum</i> . . . . .           | 10      | <i>n</i> 326. — <i>macropoda</i> . . . . .                    | 15 à 50 |
| <i>or</i> <i>Brownea Ariza</i> . . . . .                | 10 à 20 | <i>n</i> 78. — <i>microcephala</i> . . . . .                  | .4 à 15 |
| <i>n</i> — <i>erecta</i> . . . . .                      | 19 à 25 | <i>n</i> 79. — <i>palmata</i> . . . . .                       | .8 à 25 |
| <i>n</i> — <i>grandiceps</i> (FLORE, VI, 153) . . . . . | 20      | <i>n</i> 327. — <i>Sartori</i> . . . . .                      | 10 à 25 |
| <i>n</i> — <i>princeps</i> . . . . .                    | 10 à 25 | <i>n</i> 423. — <i>spec.</i> . . . . .                        | .10     |
| <i>Cactées</i> , voir plus loin.                        |         | <i>n</i> <i>Carolinea alba</i> . . . . .                      | .3 à 10 |



CALYPTRION AUBLETHI. — 10 francs.

|  | Fr. C.  |   | Fr. C. |
|--|---------|---|--------|
| <i>t,g</i> <i>Calonyction sanguinolentum</i> . . . . . | 2       | <i>or</i> <i>Carolinea elegans</i> . . . . .      | .4     |
| <i>or</i> <i>Calophyllum inophyllum</i> . . . . .      | 10      | <i>n</i> — <i>macrocarpa</i> . . . . .            | .3     |
| <i>n</i> — <i>Madruno</i> . . . . .                    | .2 à 10 | <i>n</i> <i>Caryophyllus aromaticus</i> . . . . . | .10    |
| <i>t</i> <i>Calyptrion Aubletii</i> . . . . .          | 10      | <i>t</i> <i>Castanospermum albicans</i> . . . . . | .5     |
| <i>or</i> <i>Campomanesia hypoleuca</i> . . . . .      | 10      | <i>n</i> <i>Cecropia palmata</i> . . . . .        | .4     |
| <i>n</i> <i>Campopus Manni</i> . . . . .               | 15 à 30 | <i>or</i> <i>Centradenia floribunda</i> . . . . . | .1     |
| <i>Campylobotrys</i> , voir <i>Higginsia</i> .         |         | <i>n</i> — <i>grandifolia</i> . . . . .           | .1     |



Fr. C.

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| or | <i>Centradenia rosea</i> . . . . .           | 1  | " |
| n  | <i>Cephalotus follicularis</i> . . . . .     | 3  | " |
| t  | <i>Centropogon Lucyanus</i> . . . . .        | 2  | " |
| or | <i>Cephaelis Ipecacuanha</i> . . . . .       | 3  | " |
| t  | <i>Ceropegia Gardneriana</i> . . . . .       | 3  | " |
| n  | — <i>Saundersi</i> . . . . .                 | 5  | " |
| n  | — <i>stapelieiformis</i> (FLORE, II, juin 4) | 2  | " |
| pt | <i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .         | 2  | " |
| or | <i>Chavica officinarum</i> . . . . .         | 5  | " |
| n  | <i>Chlorocodon Whitei</i> . . . . .          | 5  | " |
| n  | <i>Chrysophyllum macrophyllum</i> . . . . .  | 20 | " |

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*arbre à feuilles d'or*.

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| t | <i>Cicca disticha</i> . . . . .                   | 10 | " |
| e | 7. <i>Cinchona Calisaya</i> . . . . .             | 5  | " |
| n | 2. — <i>macrantha</i> . . . . .                   | 5  | " |
| n | 3. — <i>nitida</i> . . . . .                      | 5  | " |
| c | 5. — <i>officinalis</i> ( <i>vrai</i> ) . . . . . | 3  | " |
| n | 6. — <i>succi-rubra</i> . . . . .                 | 2  | " |

Très-beau, à grand feuillage.

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| or   | <i>Cinnamomum aromaticum</i> . . . . .        | 5 | " |
| or,g | <i>Cissus albo-nitens</i> . . . . .           | 2 | " |
| n    | — <i>amazonica</i> . . . . .                  | 2 | " |
| n    | — <i>argentea</i> . . . . .                   | 2 | " |
| n    | — <i>discolor</i> (FLORE, VIII, 149). . . . . | 2 | " |
| n    | — <i>Lindeni</i> . . . . .                    | 2 | " |
| n    | — <i>porphyrophylla</i> . . . . .             | 3 | " |

(FLORE, XIV, 263.)



COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. — 5 à 50 francs.



COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. — 5 à 50 francs.



|  | Fr. C.   |   | Fr. C.  |
|--|----------|---|---------|
| <i>e</i> <b>Clerodendron fragrans</b> . . . . .                  | 2        | <i>t</i> <b>Coccoloba regalis</b> . . . . .                               | 10      |
| <i>t</i> — <b>Kämpferi</b> . . . . .                             | 2        | <i>or</i> <b>Cocculus Chondodendron</b> . . . . .                         | 10      |
| <i>n</i> — <b>squamatum</b> . . . . .                            | 4        | <i>n</i> <b>Cochliostema Jacobianum</b> (FLORE, XVIII, 33) . . . . .      | .5 à 50 |
| <i>e</i> — <b>Thomsonæ (Marshalli)</b> (FLORE, XV, 67) . . . . . | 2        | <b>Codiaeum</b> , voir <i>Croton</i> .                                    |         |
| <i>n</i> — <b>speciosum</b> . . . . .                            | 2        | <i>n</i> <b>Coffea arabica</b> . . . . .                                  | 3 à 6   |
| <i>n</i> — <b>villosum</b> . . . . .                             | 2        | <i>n</i> — <b>angustifolia</b> . . . . .                                  | 4       |
| <i>t</i> <b>Coccoloba excoriata</b> . . . . .                    | 5        | <i>n</i> — <b>foliis variegatis</b> (FLORE) . . . . .                     | 5       |
| <i>n</i> — <b>guatemalensis</b> . . . . .                        | 10 à 100 | Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont richement panachées. |         |
| <i>n</i> — <b>majestica</b> . . . . .                            | 10       | <i>n</i> — <b>monosperma</b> . . . . .                                    | 10      |
| <i>n</i> — <b>pubescens</b> . . . . .                            | 20 à 75  | <i>n</i> — <b>liberica</b> . . . . .                                      | 10      |

L'arbre aux parasols.

Feuillage plus grand, plus vigoureux, fruits plus gros.



CROTON CORNUTUM. — 3 à 20 francs.



|   | Fr. C.    |   | Fr. C.  |
|---|-----------|---|---------|
| or <i>Coffea Moka</i> . . . . .               | 2 à 10 "  | pt <i>Commelina deficiens foliis variegatis</i> 1 " |         |
| t <i>Colea Commersoni</i> . . . . .           | 10 à 25 " | (FLORE, XVIII, 9.)                                  |         |
| " — <i>floribunda</i> . . . . .               | 10 "      | t <i>Condaminea macrophylla</i> . . . . .           | 2 à 5 " |
| <i>Colens</i> , voir plus loin.               |           | " <i>Coniza grandiflora</i> . . . . .               | 10 "    |
| t <i>Colvillea racemosa</i> (FLORE) . . . . . | 3 "       | or <i>Cookia punctata</i> . . . . .                 | 10 "    |



CROTON INTERRUPTUM. — 3 à 6 francs.

|   | Fr. C. |   | Fr. C.    |
|---|--------|---|-----------|
| or <i>Combretum coccineum</i> ( <i>purpureum</i> ),     |        | or <i>Copaifera officinalis</i> . . . . .         | 15 "      |
| 6 à 10 "  |        | tg <i>Corynostylis Hybanthus albiflorus</i>       |           |
| Excellentissime ancienne plante.                        |        | ( <i>Calyptrium</i> ) (FLORE, XXI, 107) . . . . . | 3 "       |
| t — <i>micropetalum</i> (Fl., XIX, 149) 3 à 10 "        |        | t <i>Cossignia borbonica</i> . . . . .            | 10 à 75 " |
| Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune, |        |   |           |



|   | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|---|-----------|--|-----------|
| <i>t</i> <b>Crescentia macrophylla</b> ( <i>Ferdinandusa superba</i> ). . . . . | .3 à 10 n | or 28. <b>Croton Cooperi</b> . . . . . | 20 n      |
| or 2. <b>Croton angustifolium</b> . . . . .                                     | 3 n       | n 4. — <b>cornutum</b> . . . . .       | .3 à 20 n |
|   |           | n 5. — <b>discolor</b> . . . . .       | 5 n       |



CROTON IRREGULARE. — 3 à 6 francs.

|  | Fr. C. |  | Fr. C.    |
|--|--------|--|-----------|
| or 3. <b>Croton aucubæfolium</b> . . . . . | 3 n    | or 17. <b>Croton fucatum</b> . . . . . | 3 n       |
| n 27. — <b>chrysophyllum</b> . . . . .     | 20 n   | n 20. — <b>grande</b> . . . . .        | .3 à 20 n |



|   | Fr. C.    |                                       | Fr. C.    |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| or 6. <i>Croton Hillianum</i> . . . . . | 4 "       | or 14. <i>Croton pictum</i> . . . . . | .3 à 50 " |
| " 7. — <i>Hookeri</i> . . . . .         | .3 à 10 " | " 25. — <i>spirale</i> . . . . .      | 15 à 25 " |
| " 8. — <i>interruptum</i> . . . . .     | .3 à 6 "  | " 15. — <i>undulatum</i> . . . . .    | 4 "       |
| " 9. — <i>irregulare</i> . . . . .      | .3 à 6 "  | " 1. — <i>variegatum</i> . . . . .    | 2 "       |
| " 10. — <i>Johannis (angustissimum)</i> | 4 à 10 "  | " 16. — <i>Veitchi</i> . . . . .      | .3 à 6 "  |
| " 19. — <i>lacteum</i> . . . . .        | 5 "       | " 26. — <i>volutum</i> . . . . .      | 10 à 20 " |



CROTON JOHANNIS (ANGUSTISSIMUM). — 4 à 10 francs.

|   | Fr. C.    |   | Fr. C.    |
|---|-----------|---|-----------|
| or 21. <i>Croton limbatum</i> . . . . . | .10 "     | or 18. <i>Croton Weissmanni</i> . . . . . | .5 à 15 " |
| " 24. — <i>majesticum</i> . . . . .     | 15 à 25 " | " 22. — <i>Youngi</i> . . . . .           | 10 "      |
| " 11. — <i>maximum</i> . . . . .        | .3 à 15 " | † <i>Cryptophragmium zeylanicum</i>       |           |
| " 12. — <i>multicolor</i> . . . . .     | 5 "       | ( <i>Eranthemum</i> ) . . . . .           | 2 "       |
| " 23. — <i>ovalifolium</i> . . . . .    | 10 à 20 " | " <i>Curculigo recurvata</i> . . . . .    | 1 à 3 "   |



|  | Fr. C.           |  | Fr. C.     |
|--|------------------|--|------------|
| <i>t</i> <b>Curculigo recurvata</b> foliis variegatis, |                  | <i>aq</i> <b>Cyperus alternifolius</b> . . . . .     | 2 <i>n</i> |
| 30 à 50 <i>n</i>                                       |                  | <i>n</i> — — albo-variegatus . . . . .               | 3 <i>n</i> |
| <i>or</i> 392. <b>Curmeria picturata</b> . . . . .     | 5 à 100 <i>n</i> | (FLORE, XIV, 238.)                                   |            |
| <i>n</i> — Rœzli . . . . .                             | 25 <i>n</i>      | <i>e</i> — Papyrus . . . . .                         | 3 <i>n</i> |
| <i>n</i> <b>Cyanophyllum assamicum</b> . . . . .       | 3 <i>n</i>       | <i>t</i> <b>Cyrtanthera chrysostephana</b> . . . . . | 2 <i>n</i> |



CROTON UNDULATUM. — 4 francs.

|   | Fr. C.          |   | Fr. C.      |
|---|-----------------|---|-------------|
| <i>or</i> <b>Cyanophyllum Bowmani</b> . . . . . | 3 <i>n</i>      | <i>or</i> <b>Cyrtoceras acuminatum</b> . . . . .      | 3 <i>n</i>  |
| <i>n</i> — magnificum . . . . .                 | 5 à 40 <i>n</i> | <i>t</i> <b>Dalechampia Rœzli alba</b> . . . . .      | 10 <i>n</i> |
| <i>n</i> — spectandum . . . . .                 | 3 à 10 <i>n</i> | <i>n</i> — — rosea (FLORE, XVI, 173) . . . . .        | 2 <i>n</i>  |
| <i>n</i> <b>Cyclanthus bipartitus</b> . . . . . | 5 <i>n</i>      | <i>pt</i> <b>Datura arborea</b> flore pleno . . . . . | 4 <i>n</i>  |



|   | Fr. C.   |   | Fr. C.   |
|---|----------|---|----------|
| <i>pt</i> <i>Datura sanguinea</i> . . . . .                 | 4 n      | <i>t,g</i> <i>Dioscorea singalensis</i> . . . . .   | 1 n      |
| <i>or</i> <i>Dichorisandra argenteo-marginata</i> . . . . . | 2 n      | <i>or,g</i> 1. <i>Dipladenia amabilis</i> . . . . . | 3 à 10 n |
| n — <i>mosaica</i> (FLORE, XVI, 187) . . . . .              | 5 n      | n n 2. — <i>amœna</i> . . . . .                     | 5 n      |
| n — <i>ovata</i> . . . . .                                  | 2 n      | n n 4. — <i>atropurpurea</i> . . . . .              | 5 n      |
| n — <i>undata</i> (FLORE, XVII, 87). . . . .                | 3 n      | (FLORE, I, 167.)                                    |          |
| n — <i>vittata</i> . . . . .                                | 2 n      | n n 5. — <i>bicolor</i> . . . . .                   | 5 n      |
| <i>t</i> <i>Dillenia speciosa</i> . . . . .                 | 2 à 10 n | n n 6. — <i>boliviensis</i> . . . . .               | 15 n     |
| n <i>Dionæa Muscipula</i> . . . . .                         | 3 n      | n n 17. — <i>Brearlleyana</i> . . . . .             | 25 n     |
| <i>or</i> <i>Diospyros Ebenum</i> . . . . .                 | 15 n     | n n 18. — <i>insignis</i> . . . . .                 | 15 n     |



CURCULIGO RECURVATA FOLIIS VARIEGATIS. — 30 à 50 francs.

|  | Fr. C. |   | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| <i>t,g</i> <i>Dioscorea anectochilifolia</i> . . . . . | 2 n    | <i>or,g</i> 14. <i>Dipladenia magnifica</i> . . . . . | 5 n    |
| n n — <i>chrysophylla</i> . . . . .                    | 2 n    | n n 11. — <i>splendens</i> (FLORE, I, 171) . . . . .  | 15 n   |
| n n — <i>discolor</i> . . . . .                        | 1 n    | n n 12. — <i>urophylla</i> . . . . .                  | 5 n    |
| n n — <i>illustrata</i> . . . . .                      | 2 n    | (FLORE, V, 425.)                                      |        |
| n n — <i>melanoleuca</i> . . . . .                     | 2 n    | <i>or</i> <i>Dipteryx odorata</i> . . . . .           | 15 n   |
| n n — <i>metallica</i> . . . . .                       | 2 n    | L'arbre à la fève de Tonka.                           |        |
| n n — <i>picta</i> . . . . .                           | 1 n    | <i>t</i> <i>Dombeya Darwini</i> . . . . .             | 5 n    |



|  | Fr. C.   |  | Fr. C.   |
|--|----------|--|----------|
| <i>t</i> Dombeya Mastersi . . . . .              | 6        | <i>or</i> 59. Dracæna Fraseri . . . . .        | 15 à 75  |
| <i>n</i> Donacodes alliacea . . . . .            | 5        | <i>t</i> 77. — fruticosa . . . . .             | .2 à 10  |
| <i>or</i> Dorstenia argentata . . . . .          | 2        | <i>or</i> 81. — Gemma . . . . .                | 60 à 100 |
| <i>n</i> — Contrayerva var. Riedeliana . . . . . | 5        | <i>t</i> 53. — gloriosa (Shepherdii) . . . . . | 5 à 150  |
| <i>e</i> Doryanthes Palmeri, semis               | 5        | <i>n</i> 12. — gracilis . . . . .              | .4       |
| très-forts . . . . .                             | 25 à 100 | <i>n</i> 33. — Guilfoylei . . . . .            | .3 à 50  |
| <i>or</i> 35. Dracæna albicans . . . . .         | 4        | <i>n</i> 13. — Haageana . . . . .              | .3       |
| <i>n</i> 66. — anabilis . . . . .                | 10 à 75  | <i>or</i> 76. — Hendersoni . . . . .           | 20 à 50  |
| <i>n</i> 52. — angusta . . . . .                 | 10 à 25  | <i>n</i> 79. — hybrida . . . . .               | 30 à 75  |
| <i>n</i> 86. — angustifolia . . . . .            | 50 à 75  | <i>n</i> 57. — imperialis . . . . .            | 10 à 100 |
| <i>pt</i> 1. — australis . . . . .               | .2 à 25  | <i>pt</i> 14. — indivisa . . . . .             | .2 à 30  |
| <i>or</i> 78. — Balmoreana . . . . .             | 75 à 200 | <i>n</i> 43. — — lentiginosa . . . . .         | .40      |
| <i>pt</i> 2. — Banksi (FLORE) . . . . .          | .3 à 10  | <i>n</i> 15. — — lineata . . . . .             | .2 à 25  |
| <i>or</i> 67. — Baptisti . . . . .               | 10 à 200 | <i>or</i> 73. — jaspidea . . . . .             | 10 à 75  |
| <i>n</i> 75. — bellula . . . . .                 | .15      | <i>t</i> 16. — Knerkiana . . . . .             | 10 à 200 |
| <i>e</i> 3. — brasiliensis . . . . .             | .2 à 25  | <i>n</i> 70. — latifolia (grandis) . . . . .   | 15 à 200 |
| <i>n</i> 4. — cannæfolia . . . . .               | .5 à 60  | <i>or</i> 10. — — pendula . . . . .            | .2 à 5   |




DICHORISANDRA MOSAICA. — 5 francs.

|   | Fr. C.   |  | Fr. C.  |
|---|----------|--|---------|
| <i>e</i> 36. Dracæna chelseana . . . . .  | 10 à 25  | <i>or</i> 85. Dracæna Levengeri . . . . .          | 50      |
| <i>n</i> 51. — compacta . . . . .         | .10      | <i>n</i> 38. — Liervali . . . . .                  | 15 à 50 |
| <i>n</i> 47. — concinna . . . . .         | .5 à 25  | <i>n</i> 18. — limbata . . . . .                   | .2 à 5  |
| <i>n</i> 68. — — sp. Madagascar . . . . . | 15 à 40  | <i>n</i> 31. — Macleayi . . . . .                  | .5 à 15 |
| <i>e</i> 6. — congesta . . . . .          | .1       | <i>n</i> 19. — maculata (FLORE, VI, 109) . . . . . | .10     |
| <i>or</i> 7. — Cooperi (FLORE) . . . . .  | .2 à 5   | <i>n</i> 40. — magnifica . . . . .                 | .6 à 25 |
| <i>n</i> 39. — Denisoni . . . . .         | .8 à 20  | <i>t</i> 34. — mauritiana . . . . .                | .5      |
| <i>e</i> 8. — Draco . . . . .             | .2 à 50  | <i>or</i> 48. — metallica . . . . .                | 12 à 15 |
| <i>or</i> 84. — Duffi . . . . .           | 60 à 100 | <i>n</i> 37. — Mooreana . . . . .                  | .6 à 25 |
| <i>n</i> 42. — excelsa . . . . .          | .6 à 25  | <i>n</i> 20. — nigrescens . . . . .                | .2 à 5  |
| <i>n</i> 69. — ferrea . . . . .           | .3 à 6   | <i>n</i> 32. — nigro-rubra . . . . .               | .5 à 20 |



|    |                              | Fr. C.  |    |                                       | Fr. C.  |
|----|------------------------------|---------|----|---------------------------------------|---------|
| or | 71. <i>Dracæna nobilis</i> . | 10      | or | 74. <i>Dracæna Reali</i>              | 20 à 50 |
| n  | 21. — <i>oculata</i>         | 5       | n  | 23. — <i>Reginæ</i> (Fl., XVIII, 104) | 4 à 60  |
| n  | 55. — <i>ornata</i>          | 12 à 25 | n  | pt 24. — <i>rigidifolia</i>           | 2       |
| n  | 41. — <i>porphyrophylla</i>  | .6 à 30 | n  | t 25. — <i>robusta</i>                | .3 à 15 |



DIOSCOREA ILLUSTRATA. — 2 francs.

|    |                             | Fr. C.  |    |                            | Fr. C.  |
|----|-----------------------------|---------|----|----------------------------|---------|
| or | 80. <i>Dracæna princeps</i> | 20 à 50 | or | 82. <i>Dracæna rubella</i> | 25      |
| n  | 51. — <i>pulcherrima</i>    | 15      | n  | pt 26. — <i>rubra</i>      | 1       |
| t  | 22. — <i>punctata</i>       | 3       | n  | t 72. — <i>Rumphi</i>      | 15 à 50 |



|           |                                     | Fr. C.  |   |   | Fr. C.   |   |
|-----------|-------------------------------------|---------|---|---|----------|---|
| <i>t</i>  | 53. <i>Dracæna</i> Shepherdii . . . | 5 à 150 | " | <i>or</i> 50. <i>Dracæna</i> Youngi . . .           | .6 à .75 | " |
| <i>t</i>  | 27. — siamensis . . .               | .4 à 10 | " | " <i>Durio</i> zibethinus. . .                      | .15      | " |
| <i>or</i> | 46. — splendens . . .               | .5 à 25 | " | Le Dourlan, l'un des meilleurs fruits des Moluques. |          |   |
| "         | 83. — striatifolia . . .            | 15 à 25 | " | <i>g,or</i> 3. <i>Echites</i> argyræa . . .         | .2       | " |



DRACÆNA REGINÆ. — 4 à 60 francs.

|    |  | Fr. C.  |   |  | Fr. C. |
|----|--|---------|---|--|--------|
| or | 23. <i>Dracæna stricta</i> . . . . .                   | .3 à 25 | " | g,or 13. <i>Echites nutans</i> (FLORE). . . . .        | 2      |
|    | (FLORE, XV, 77.)                                       |         |   | " " 9. — — <i>maxima</i> ( <i>rubro-venia</i> )        |        |
| n  | 29. — <i>terminalis</i> ( <i>versicolor</i> ). . . . . | .3 à 10 | " | ( <i>Hemadictyon</i> ). . . . .                        | 2      |
| t  | 30. — <i>umbraculifera</i> , <i>fort</i> . . . . .     | 10 à 75 | " | (FLORE, XVII, 29.)                                     |        |
| or | 49. — <i>Weissmanni</i> . . . . .                      | 10 à 25 | " | Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif. |        |



|  | Fr. C. |   | Fr. C.    |
|--|--------|---|-----------|
| <i>g, or</i> 10. <i>Echites refulgens</i> . . . . .  | 2 n    | <i>t</i> <i>Eugenia littoralis</i> . . . . .          | 3 n       |
| <i>t</i> <i>Elettaria atropurpurea</i> . . . . .     | 3 n    | <i>e</i> — <i>Pitanga</i> . . . . .                   | .2 à 10 n |
| <i>n</i> <i>Epiphyllum truncatum</i> :               |        | <i>or</i> <i>Euphorbia sanguinea</i> . . . . .        | 3 n       |
| <i>Six très-belles variétés, très-dis-</i>           |        | <i>e</i> <i>Exacum macranthum</i> . . . . .           | 5 n       |
| <i>tinctes de coloris, greffées sur</i>              |        | <i>or</i> <i>Fagraea imperialis</i> (FLORE) . . . . . | 15 n      |
| <i>tiges</i> . . . . .                               | 10 n   | <i>pt</i> <i>Ferdinanda eminens</i> . . . . .         | 2 n       |
| <i>n</i> <i>Eranthemum adpersum</i> . . . . .        | 1 n    | <i>t</i> 1. <i>Ficus amazonica</i> . . . . .          | 3 n       |
| <i>or</i> — <i>igneum</i> (FLORE, XVII, 19). . . . . | 2 n    | <i>n</i> 2. — <i>Annei</i> . . . . .                  | 2 n       |
| <i>t</i> — <i>Roxburgi</i> . . . . .                 | 3 n    | <i>n</i> 3. — <i>barbata</i> . . . . .                | 1 n       |
| <i>n</i> — <i>sanguineum</i> . . . . .               | 3 n    | <i>t</i> 5. — <i>Cooperi</i> . . . . .                | .2 à 10 n |



DRACÆNA SPLENDENS. — 5 à 25 francs.

|   | Fr. C. |  | Fr. C.    |
|---|--------|--|-----------|
| <i>t</i> <i>Eranthemum sanguinolentum</i> . . . . . | 2 n    | <i>or</i> 6. <i>Ficus dealbata</i> . . . . . | 5 à 15 n  |
| (FLORE, XV, 157.)                                   |        | <i>t</i> 7. — <i>eburnea</i> . . . . .       | .2 à 6 n  |
| <i>e</i> — <i>tuberculatum</i> . . . . .            | 1 n    | <i>pt</i> 8. — <i>elastica</i> . . . . .     | .2 à 10 n |
| <i>or</i> <i>Eriocnema marmoreum</i> . . . . .      | 3 n    | <i>t</i> 18. — <i>ferruginea</i> . . . . .   | 10 n      |
| (FLORE, VII, 291.)                                  |        | <i>n</i> 19. — <i>lancifolia</i> . . . . .   | .2 à 5 n  |
| <i>t</i> <i>Erythroxylon Coca</i> . . . . .         | 3 n    | <i>n</i> 9. — <i>leuconeura</i> . . . . .    | 2 n       |



|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| pt 10. <i>Ficus macrocarpa</i> . . . . .  | 10 "      |
| n 11. — <i>macrophylla</i> ( <i>Artocarpus</i><br><i>imperialis</i> ) . . . . .   | .3 à 10 " |
| n 20. — <i>Parcelli</i> . . . . .   | .4 à 50 " |
| Très-grand feuillage atteignant presque les dimensions de celui du <i>F. elastica</i> , très-élégamment marbré et à très-grandes plaques blanches et jaunes. Sera figuré dans la FLORE. |           |
| n 12. — <i>philippensis</i> . . . . .   | 3 "       |
| n 13. — <i>Porteana</i> . . . . .   | 3 à 6 "   |
| n 14. — <i>pseudonymphæfolia</i> . . . . .  | 5 "       |
| pt 21. — <i>repens</i> . . . . .  | 1 "       |
| or 15. — <i>sarapiquiensis</i> . . . . .  | .6 à 15 " |
| t 16. — <i>Suringari</i> . . . . .  | 4 "       |
| or <i>Fittonia argyrea</i> . . . . .  | 2 "       |
| (FLORE, XVI, 103.)  |           |

Superbe, à réseau blanc d'ivoire. Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| n — <i>gigantea</i> . . . . . | 1 " |
| n — <i>Pearcei</i> . . . . .  | 1 " |

Le plus beau des veinés de rouge.

|   |           |
|---|-----------|
| n — <i>Verschaffelti</i> ( <i>Gymnostachyum</i> ) . . . . . | 1 "       |
| (FLORE, XV, 153.)   |           |
| e <i>Fourcroya interrupta</i> . . . . .                     | .2 à 10 " |
| t <i>Franciscea calycina</i> . . . . .                      | 5 "       |
| n — <i>confertiflora foliis variegatis</i> . . . . .        | 3 "       |
| n — <i>eximia</i> (FLORE, X, 173) . . . . .                 | 4 "       |
| n — <i>Hopeana</i> . . . . .                                | 4 "       |
| n — <i>laurifolia</i> . . . . .                             | 3 "       |
| n — <i>Lindenii</i> . . . . .                               | 3 "       |
| or <i>Galactodendron utile</i> . . . . .                    | 10 "      |
| n <i>Garcinia Livingstonei</i> . . . . .                    | .5 à 10 " |
| n — <i>Mangostana</i> . . . . .                             | " "       |
| t <i>Gardenia citriodora</i> (FLORE, XII, 139) . . . . .    | 4 "       |
| n — <i>Devoniana</i> (FLORE, III, 191) . . . . .            | 2 "       |
| f — <i>florida flore pleno</i> . . . . .                    | .2 à 4 "  |
| t — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .                    | 6 "       |
| f — — <i>major (intermedia)</i> . . . . .                   | .2 à 4 "  |
| n — <i>radicans</i> . . . . .                               | 2 "       |
| n — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .                    | 4 "       |
| n — — <i>major</i> . . . . .                                | 2 "       |
| or — <i>Stanleyana</i> (FLORE, II, Janv., pl. I) 5 "        |           |
| n <i>Geoffroya superba</i> . . . . .                        | 10 "      |
| n <i>Godoya splendida</i> . . . . .                         | 10 "      |
| n <i>Graptophyllum medio-auratum</i> . . . . .              | 2 "       |
| n <i>Gravesia bertolonoides</i> . . . . .                   | 10 "      |
| t <i>Greya Sutherlandii</i> (FLORE, XVII, 45) . . . . .     | 5 "       |

Voyez-en les fleurs page 45 du XVII<sup>e</sup> volume de la FLORE. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

|   |      |
|---|------|
| n <i>Guarea coffæefolia</i> . . . . .   | 5 "  |
| n <i>Gutteria tuberosa</i> . . . . .  | 4 "  |
| or <i>Gustavia Lindenii</i> . . . . .   | 10 " |
| g, or 8. <i>Hæmadictyon nutans</i> . . . . .  | 2 "  |
| n n 9. — <i>maximum (Echites rubro-</i><br><i>venia)</i> (FLORE, XVII, 29). . . . . | 2 "  |

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| n n 10. — <i>refulgens</i> . . . . . | 2 " |
|--------------------------------------|-----|

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| pt <i>Hebeclinium atrorubens</i> . . . . .  | 2 "    |
| Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.   |        |
| n — <i>ianthinum</i> . . . . .  | 1 "    |
| n — <i>megalophyllum</i> . . . . .  | 2 "    |
| Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!  |        |
| n — <i>panamense</i> . . . . .  | 1 "    |
| or <i>Hedysarum gyrans</i> . . . . .  | 6 "    |
| C'est la plante <i>Télégraphe</i> (voir FLORE, XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs. |        |
| t <i>Hemerocallis picta</i> . . . . .   | 10 "   |
| n <i>Heritiera species</i> . . . . .  | 5 "    |
| n <i>Herrania palmata</i> . . . . .   | 10 "   |
| e <i>Hexacentris mysorensis</i> . . . . .   | 2 "    |
| (FLORE, VIII, 1.)   |        |

|  |     |
|--|-----|
| n — — <i>lutea</i> (FLORE, IX, 217). . . . .           | 2 " |
| n 8. <i>Hibiscus hybridus</i> . . . . .                | 1 " |
| n 13. — <i>rosa sinensis albo-variegatus</i> . . . . . | 5 " |
| n 14. — — <i>carmineus perfectus</i> . . . . .         | 5 " |
| n 11. — — <i>Cooperi (H. tricolor)</i> . . . . .       | 2 " |
| (FLORE, XV, 109.)                                      |     |

|   |      |
|---|------|
| n 17. — — — <i>flavus plenus</i> . . . . .        | 3 "  |
| n 18. — — — <i>roseus grandiflorus</i> . . . . .  | 2 "  |
| n 12. — — — <i>metallicus</i> . . . . .           | 2 "  |
| n 15. — — — <i>miniatus semi-plenus</i> . . . . . | 5 "  |
| n 3. — — — <i>roseus plenus</i> . . . . .         | 2 "  |
| n 5. — — — <i>ruber plenus major</i> . . . . .    | 2 "  |
| n 16. — — — <i>vivicans</i> . . . . .             | 10 " |

or *Higginsia Ghiesbreghtii* (*Campylobotrys*) . . . . .

|   |     |
|---|-----|
| n — <i>Ortgiesii</i> . . . . .                | 2 " |
| n — <i>pirifolia</i> . . . . .                | 2 " |
| n — <i>refulgens</i> . . . . .                | 2 " |
| n — <i>regalis</i> (FLORE, XVI, 101). . . . . | 2 " |
| n — <i>Rœzlii</i> . . . . .                   | 2 " |
| n — <i>smaragdina</i> . . . . .               | 2 " |

t *Hippobromus alatus* . . . . .

or *Hippomane ilicifolia* . . . . .

t *Horsfieldia aculeata* . . . . .

g, or 1. *Hoya angustifolia* . . . . .

n n 16. — *australis* . . . . .

n n 2. — *bella* (FLORE, IV, 399) . . . . .

n n 17. — *Bidwilliana* . . . . .

n t 4. — *carnosa* . . . . .

or 5. — *cinnamomifolia* . . . . .

(FLORE, IV, 310.)

n n 8. — *imperialis* . . . . .

(FLORE, IV, 393-4.)

n n 9. — *maxima* . . . . .

n n 12. — *picta* . . . . .

n t 14. — *variegata* (FLORE, VIII, 241) . . . . .

*très-fort.* . . . .

e *Hydrolea spinosa* . . . . .

or *Hymenæa Courbaril* . . . . .

n *Hypocyrtia brevicalyx* . . . . .

*Hypoestes*, voir *Eranthemum*.

e *Imantophyllum cyrtanthiflorum* . . . . .

n — *intermedium splendens* . . . . .



|  | Fr. C. |
|--|--------|
| e <i>Imantophyllum miniatum</i> . . . 5 à 15 " |        |
| très-fort . . . 30 à 100 "                     |        |
| " — maximum . . . 15 à 50 "                    |        |
| très-fort. . . . 200 "                         |        |

Le magnifique *Imantophyllum miniatum* (Flore, IX, 237), dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| pt <i>Ioichroma coccineum</i> . . . . . 2 " |        |
| (FLORE, XII, 151.)                          |        |
| " — <i>Tonelianum</i> . . . . . 4 "         |        |

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées,



HIBISCUS ROSA SINENSIS MINIATUS SEMI-PLENUS. — 5 francs.

corolles safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*, le nec plus ultra de ce beau genre.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| or <i>Impatiens Jerdoniæ</i> . . . . . 5. " |        |
| (FLORE, IX, 133.)                           |        |

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| pt <i>Ioichroma Warscewiczii</i> . . . . . 2 " |        |
| t <i>Ipomœa digitata</i> . . . . . 2 "         |        |
| or, g — <i>Horsfalliæ</i> (FLORE, XVI, 71)     |        |
| (vrai) . . . . . 10 "                          |        |

Admirable de feuillage et de fleurs.



|  | Fr. C.     |  | Fr. C.     |
|--|------------|--|------------|
| <i>t</i> <i>Ipomœa insignis</i> . . . . .  | 5 "        | <i>or</i> 25. <i>Nepenthes albo-marginata</i> . . . . .  | 75 "       |
| " — <i>truncata</i> . . . . .  | 2 "        | " 20. — <i>ampullacea</i> . . . . .  | 35 "       |
| <i>or</i> <i>Isonandra Gutta</i> . . . . .   | 35 à 75 "  | " 13. — <i>picta</i> . . . . .   | 35 à 50 "  |
| Produit la <i>Gutta-Percha</i> .   |            | " 1. — <i>distillatoria</i> . . . . .  | 5 à 15 "   |
| " <i>Ixora coccinea</i> . . . . .  | 4 "        | " 21. — <i>chelseana</i> , <i>fort.</i> . . . .  | 50 à 100 " |
| " — <i>Dixiana</i> . . . . .   | 3 "        | " 3. — <i>gracilis major</i> . . . . .   | 15 à 30 "  |
| <i>t</i> <i>Jacaranda mimosæfolia</i> . . . . .                                      | 4 "        | " 18. — <i>Hookeriana</i> . . . . .  | 50 à 75 "  |
| (FLORE, III, 185.)   |            | " 5. — <i>hybr. Dominiana</i> . . . . .  | 40 à 75 "  |
| " <i>Jambosa densiflora</i> . . . . .  | 5 "        | " 22. — <i>intermedia</i> . . . . .  | 75 "       |
| " — <i>Korthalsi</i> . . . . .   | 2 "        | " 6. — <i>maculata</i> . . . . .   | 20 à 50 "  |
| " 4. <i>Jasminum Sambac flore pleno</i> . . . . .                                    | 4 "        | " 7. — <i>lævis</i> . . . . .  | 10 à 50 "  |
| " 5. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .   | 4 "        | " 8. — <i>lanata, très-rare</i> . . . . .  | 300 "      |
| " 6. — — <i>Grande-Duchesse de Tos-</i><br><i>cane</i> . . . . .                     | 4 "        | " 9. — <i>phyllamphora</i> . . . . .   | 10 à 40 "  |
| <i>t</i> <i>Jatropha Manihot</i> . . . . .   | 3 "        | " 10. — <i>Rafflesiana</i> . . . . .   | 50 "       |
| " — <i>multifida</i> . . . . .   | 10 "       | (FLORE, XVI, 167.)   |            |
| <i>or</i> <i>Kopsia fruticosa</i> . . . . .  | 5 "        | " 11. — <i>rubra</i> . . . . .   | 100 "      |
| " <i>Lagetta lintearia</i> . . . . .   | 6 "        | " 19. — <i>sanguinea, très-rare</i> . . . . .  | 200 "      |
| " <i>Lasiandra macrantha</i> (FLORE, XXII) . . . . .                                 | 2 "        | " 17. — <i>Sedeni</i> . . . . .  | 15 à 30 "  |
| " — — <i>floribunda</i> . . . . .  | 4 "        | " 23. — <i>vittata</i> . . . . .   | 50 "       |
| <i>t</i> <i>Lasiolipsis Bennetti multijuga</i> . . . . .                             | 10 "       | " 24. — — <i>major</i> . . . . .   | 60 à 80 "  |
| " <i>Ledenbergia roseo-ænea</i> . . . . .  | 2 "        | <i>pt</i> <i>Nicotiana wigandioides</i> . . . . .  | 2 "        |
| " <i>Leea sanguinea</i> . . . . .  | 3 "        | " <i>Nipa fruticans</i> . . . . .  | 20 "       |
| " <i>Luculia gratissima</i> . . . . .  | 10 "       | " <i>Oldfieldia africana</i> . . . . .   | 8 "        |
| " <i>Lucuma deliciosa</i> . . . . .  | 6 "        | " <i>Oplismenus imbecillis foliis variegat.</i> . . . .  | 1 "        |
| " <i>Machærium firmum</i> . . . . .  | 3 "        | (FLORE, XVII, 5.)  |            |
| Port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.                               |            | " <i>Otacanthus cæruleus</i> (FLORE, XV, 53) . . . . .   | 2 "        |
| " <i>Mackaya bella</i> . . . . .   | 2 "        | <i>aq</i> <i>Ouvirandra fenestrata</i> . . . . .   | 40 à 75 "  |
| Magnifique Acanthacée; abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.  |            | <i>t</i> <i>Pachira alba</i> ( <i>Carolinea</i> ) . . . . .  | 3 à 10 "   |
| " <i>Magnolia Galeottiana</i> . . . . .  | 4 "        | " <i>Pachyphytum bracteosum</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — <i>mexicana</i> . . . . .  | 6 à 15 "   | <i>t</i> <i>Palicourea discolor</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — <i>pumila</i> . . . . .  | 5 "        | " <i>Panicum maximum</i> . . . . .   | 1 "        |
| <i>t</i> <i>Mangifera indica</i> . . . . .   | 6 "        | " — — <i>variegatum</i> (FLORE) . . . . .  | 1 "        |
| Abricotier des Antilles.   |            | " <i>Paullinia oceanica</i> . . . . .  | 20 "       |
| <i>or</i> <i>Marcgravia paradoxa</i> . . . . .                                       | 5 "        | " — <i>thalictrifolia</i> (FLORE, XIX, 10) . . . . .   | 5 "        |
| <i>or</i> <i>Medinilla magnifica</i> (FLORE, VI, 125<br>et IX, 128 et 237) . . . . . | 3 à 10 "   | <i>or</i> <i>Pavetta borbonica</i> . . . . .   | 10 "       |
| <i>t</i> <i>Melicocca bijuga</i> . . . . .   | 4 "        | " — — <i>maxima</i> . . . . .  | 20 à 40 "  |
| <i>or</i> <i>Memeocylon ramiflorum</i> . . . . .                                     | 5 "        | " — — <i>picta</i> . . . . .   | 25 "       |
| " <i>Meninia turgida</i> . . . . .   | 2 "        | " — — <i>indica</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>t</i> <i>Meyenia erecta</i> (FLORE, XI, 35) . . . . .                             | 2 "        | <i>t</i> 1. <i>Peperomia arifolia</i> . . . . .  | 2 "        |
| " <i>Miconia peruviana</i> . . . . .   | 2 "        | " 9. — <i>argentea</i> . . . . .   | 2 "        |
| <i>g, or</i> <i>Mikania speciosa</i> . . . . .                                       | 2 "        | " 2. — <i>argyræa</i> (FLORE) . . . . .  | 2 "        |
| <i>ge</i> — <i>violacea</i> . . . . .  | 2 "        | " 3. — <i>eburnea</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>or</i> <i>Mimusops Elengi</i> . . . . .   | 10 "       | " 4. — <i>maculosa</i> . . . . .   | 2 "        |
| <i>t</i> <i>Momordica mixta</i> (FLORE, XIV, 227) . . . . .                          | 3 "        | " 5. — <i>pubifolia</i> . . . . .  | 2 "        |
| " <i>Monochætum ensiferum</i> . . . . .  | 2 "        | " 6. — <i>rosedæflora</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — — <i>Lemoinianum</i> . . . . .   | 2 "        | " 7. — <i>velutina</i> . . . . .   | 2 "        |
| " — <i>sericeum multiflorum</i> . . . . .  | 2 "        | " 8. — <i>Verschaffelti</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>or</i> <i>Monodora Myristica grandiflora</i> . . . . .                            | 5 à 10 "   | <i>t</i> <i>Persea gratissima</i> . . . . .  | 4 "        |
| <i>t</i> <i>Morinda Rojoc</i> . . . . .  | 10 "       | " <i>Petræa volubilis</i> . . . . .  | 2 à 5 "    |
| <i>or</i> <i>Myristica moschata</i> . . . . .  | 75 à 200 " | <i>or</i> <i>Pharus vittatus</i> (FLORE, IV, 316) . . . . .  | 10 "       |
| Produit la noix muscade.   |            | " <i>Phyllagathis rotundifolia</i> . . . . .   | 2 "        |
| " <i>Myroxylon balsamiferum</i> . . . . .  | 10 "       | <i>t</i> <i>Phyllanthus nivosus</i> . . . . .  | 30 "       |
| Produit le Baume du Pérou.   |            | <i>or</i> <i>Phyllotænium Lindeni</i> . . . . .  | 8 à 75 "   |
| " <i>Myrtus Pimenta</i> . . . . .  | 5 "        | <i>t</i> <i>Pilea callitrichoides</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>or</i> <i>Napoleona Whitfieldi</i> . . . . .                                      | 2 "        | Le feu d'artifice! Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en les faisant assister à l'explosion d'un véritable feu d'artifice en miniature. Pour procéder à cette petite opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; elle est dans |            |
| (FLORE, IV, 386-7.)  |            |  |            |



cet état pendant des mois. On trempe tout le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau surabondante qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, changera brusquement de direction, écartera la division florale qui lui sert de rideau, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs, munies chacune de quatre étamines, tenant ici lieu de boîtes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

Fr. C.

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| t  | 12. <i>Piper incanum</i> . . . . .       | 1 "       |
| n  | 13. — <i>nigrum</i> . . . . .            | 4 "       |
|    | Produit le poivre du commerce.           |           |
| n  | <i>Pisonia longirostris</i> . . . . .    | .4 à 10 " |
| ag | <i>Pistia Stratiotes</i> . . . . .       | 2 "       |
| pt | <i>Plectranthus fruticosus</i> . . . . . | 1 "       |

*Coleus* a feuillage charnu, à senteur de citron, ayant grande réputation de propriétés antirhumatismales.



PAULLINIA THALICTRIFOLIA. — 5 francs.

Fr. C.

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| e  | <i>Pinckneya pubens</i> (FLORE, XIX, 13) . . . . .  | 5 " |
|    | Nouvelle Cinchonacée de la Géorgie, à fleurs blanches mouchetées de rose; l'une des divisions de leur calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crème bordé de rose. Son écorce est le Quinquina des Géorgiens. |     |
| or | 9. <i>Piper bicolor</i> . . . . .   | 5 " |
| n  | 10. — <i>Cubeba</i> . . . . .   | 4 " |
| n  | 11. — <i>excelsum</i> . . . . .   | 2 " |
| e  | 14. — <i>Futokadsura</i> . . . . .  | 2 " |

Fr. C.

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| e | <i>Pleroma macranthum</i> ( <i>Lasiandra</i> )       |     |
|   | (FLORE) . . . . .                                    | 2 " |
| n | — — <i>floribundum</i> . . . . .                     | 4 " |
| n | <i>Plumbago coccinea</i> var. <i>rosea</i> . . . . . | 1 " |
| n | <i>Pogostemon Patchouli</i> . . . . .                | 2 " |
|   | Parfum très-coulu.                                   |     |
| n | <i>Poinciana pulcherrima</i> . . . . .               | 3 " |



|  | Fr. C.    |   | Fr. C. |
|--|-----------|---|--------|
| t <i>Poinsettia pulcherrima</i> . . . . .  | 5 "       | e <i>Rhopala crenata</i> . . . . .  | 10 "   |
| Excellentissime Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant. Voir FLORE, III, 283B, où la culture est indiquée, et l'excellent <i>Manuel des Plantes</i> de M. Duchartre qui y a reproduit notre article (IV, page 49). |           |   |        |
| n — — <i>alba</i> . . . . .  | 10 "      | n — — <i>frigida</i> . . . . .  | 6 "    |
| n — — <i>flore pleno</i> . . . . .   | 35 "      | Les Rhopala à feuillages décoratifs sont rangés parmi les plus beaux ornements de nos serres.   |        |
| n — — <i>roseo-carminata</i> . . . . .   | 10 "      | t <i>Rhynchosia albo-nitens</i> . . . . .   | 2 "    |
| pt <i>Polymnia grandis</i> . . . . .   | 2 "       | e <i>Rogiera cordata</i> (FLORE, VIII, 13) . . . . .  | 2 "    |
| aq <i>Pontederia crassipes</i> . . . . .   | 2 "       | n — — <i>superba</i> . . . . .  | 4 "    |
| On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau; très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.  |           |   |        |
| t <i>Porphyrocoma lanceolata</i> . . . . .   | 2 "       | t <i>Rondeletia speciosa</i> brillantissima . . . . .   | 5 "    |
| n <i>Psychotria cyanococca</i> . . . . .   | 3 "       | n — — <i>superba</i> . . . . .  | 3 "    |
| (FLORE, XIX, 15.)  |           |   |        |
| n — — <i>leucantha</i> ( <i>Rudgea macrocephala</i> ). . . . .   | 10 "      | e <i>Rubus maculatus</i> . . . . .  | 3 "    |
| (FLORE, XVII, 17.)   |           |   |        |
| n <i>Pteridophyllum zeylanicum</i> . . . . .   | .5 à 25 " | n — — <i>rosæfolius flore simplici</i> . . . . .  | 3 "    |
| or <i>Quassia amara</i> . . . . .  | 10 "      | (FLORE, XVII, 3.)   |        |
| n <i>Quivisia heterophylla</i> . . . . .   | 10 "      | Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, de nombreux fruits comestibles de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Etablissement.   |        |
| e <i>Rhopala corcovadensis</i> . . . . .   | .8 à 50 " | t <i>Rudgea macrocephala</i> . . . . .  | 10 "   |
| n — — <i>glabra</i> . . . . .  | 10 "      | Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVII <sup>e</sup> vol. de la FLORE, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger, et excellentes pour bouquets. |        |
|  |           | aq <i>Saccharum officinarum</i> . . . . .   | 3 "    |
|  |           | La Canne à sucre.   |        |
|  |           | n — — <i>variegatum</i> . . . . .   | 5 "    |



RUBUS ROSÆFOLIUS FLORE SIMPLICI. — 3 francs.



|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| <i>aq</i> <i>Saccharum violaceum</i> . . . . .  | 5 "       |
| De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'ornementation de la berge des pièces d'eau.  |           |
| <i>t</i> <i>Sanchesia nobilis</i> (FLORE, XXII) . . . . .   | 2 à 5 "   |
| " — — <i>glaucophylla</i> . . . . .   | 2 à 5 "   |
| " <i>Sansevieria angolensis</i> ( <i>cylindrica</i> ) . . . . .   | 10 "      |
| Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve et servent de discipline dans les colonies à esclaves où la schlague est encore en vigueur.  |           |
| " — — <i>ruficincta</i> . . . . .   | 2 "       |
| " <i>Sapindus Saponaria</i> . . . . .   | 10 "      |
| <i>e</i> <i>Scutellaria Mociniana</i> . . . . .   | 2 "       |
| " — — <i>pulchella purpurea</i> . . . . .   | 2 "       |
| <i>t</i> <i>Sideroxylon Mastichodendron</i> . . . . .   | 10 "      |
| " <i>Simaruba excelsa</i> . . . . .   | 6 "       |
| <i>e</i> <i>Sinclairia discolor</i> . . . . .   | 2 "       |
| " <i>Siphocampylus microstomus</i> . . . . .  | 2 "       |
| <i>pt</i> <i>Solanum ciliatum</i> . . . . .   | 1 "       |
| " <i>Sonerila Hendersoni</i> . . . . .  | 5 "       |
| " — — <i>argentea</i> . . . . .   | 5 "       |
| " — — <i>marmorata</i> . . . . .  | 5 "       |
| <i>or</i> — — <i>margaritacea</i> (FLORE, XI, 105) . . . . .  | 2 "       |
| " <i>Spharogyne cinnamomea</i> . . . . .  | 3 à 25 "  |
| " — — <i>ferruginea</i> . . . . .   | 4 "       |
| " — — <i>imperialis</i> . . . . .   | 10 à 40 " |
| " — — <i>latifolia</i> . . . . .  | 10 à 50 " |
| Tige revêtue de poils ferrugineux; noble feuillage, genre <i>Cyanophyllum</i> .   |           |
| <i>e</i> <i>Spigelia splendens</i> . . . . .  | 3 "       |
| Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la FLORE, vol. XVII, pages 121 et 123.   |           |
| " <i>Stadmannia australis</i> . . . . .   | 10 à 25 " |
| " — — <i>sorbifolia</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| Feuillage très-ornemental.  |           |
| <i>t</i> <i>Stannia formosa</i> (FLORE, VI, 169). . . . .   | 5 "       |
| <i>gr, t</i> <i>Stephanotis floribunda</i> . . . . .  | 2 "       |
| Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tabéreauses, et répandant un délicieux arôme. |           |
| <i>or</i> <i>Stravadium insigne</i> (non <i>Barringtonia</i> ) (FLORE, VII, 21) . . . . .   | 25 "      |
| " <i>Swietenia chloroxylon</i> . . . . .  | 2 "       |
| " — — <i>Mahagoni</i> . . . . .   | 3 à 10 "  |
| C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le <i>Mahagoni</i> .   |           |
| <i>t</i> <i>Tabernæmontana Camassa</i> . . . . .  | 4 "       |
| Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia.  |           |
| <i>or</i> <i>Tamarindus indica</i> . . . . .  | 5 "       |
| <i>pt</i> <i>Teleianthera versicolor</i> . . . . .  | 50 "      |
| <i>t</i> <i>Terminalia nobilis</i> . . . . .  | 5 "       |
| <i>pt</i> <i>Tetrapanax (Aralia) papyrifera</i> . . . . .   | 1 "       |
| <i>or</i> <i>Theobroma Cacao</i> . . . . .  | 10 à 25 " |
| Ses graines forment la base du <i>Chocolat</i> .  |           |

|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| <i>t</i> 1. <i>Theophrasta attenuata</i> , <i>très-forts</i> . . . . .   | 5 à 25 "   |
| " 2. — <i>crassipes</i> . . . . .  | 5 à 25 "   |
| " 3. — <i>glauca</i> . . . . .   | 10 "       |
| " 4. — <i>imperialis, très-forts</i> . . . . .   | 10 à 300 " |
| " 5. — <i>Jussieui</i> . . . . .   | 10 "       |
| " 6. — — <i>latifolia</i> . . . . .  | 10 "       |
| " 7. — <i>latifolia</i> . . . . .  | 10 "       |
| " 8. — <i>longifolia</i> . . . . .   | 5 à 10 "   |
| " 9. — <i>macrophylla, vrai</i> . . . . .  | 800 "      |
| " 10. — <i>minor</i> . . . . .   | 5 à 10 "   |
| <i>t, g</i> <i>Thunbergia chrysops</i> . . . . .   | 3 "        |
| " — <i>coccinea</i> (FLORE) . . . . .  | 2 "        |
| Beau feuillage, fleurs très-abondantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes à travers un treillis qui peut servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes. Paraîtra prochainement en planche double dans la FLORE. |            |
| " — <i>fragrans</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — <i>Harrisii</i> (FLORE, XII, 177). . . . .   | 2 "        |
| Voyez la planche double qui représente le port de <i>ce Thunbergia</i> et ses magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.   |            |
| " — <i>lutea</i> . . . . .   | 2 "        |
| " — <i>natalensis</i> . . . . .  | 2 "        |
| " <i>Thyrsacanthus rutilans</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>t</i> <i>Torenia asiatica</i> (FLORE, II, 157). . . . .   | 1 "        |
| " — — <i>pulcherrima</i> (FL., XIII, 59) . . . . .   | 1 "        |
| " <i>Toxicophlæa spectabilis</i> . . . . .   | 4 à 10 "   |
| " <i>Tradescantia discolor</i> . . . . .   | 2 "        |
| " — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .   | 2 "        |
| (FLORE, XI, 193.)  |            |
| " — <i>zebrina argentea</i> . . . . .  | 1 "        |
| <i>pt</i> <i>Udhea bipinnata</i> . . . . .   | 2 "        |
| <i>t</i> <i>Uroskinnera spectabilis</i> . . . . .  | 3 "        |
| (FLORE, XVI, 109.)   |            |
| " <i>Urvillea ferruginea</i> . . . . .   | 5 "        |
| " <i>Utricularia montana</i> . . . . .   | 15 "       |
| (FLORE, XIX, 21.)  |            |
| <i>or</i> <i>Vanilla aromatica</i> . . . . .   | 10 "       |
| La <i>Vanillier</i> grimpe volontiers jusqu'au faite de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.   |            |
| <i>aq</i> <i>Victoria regia</i> . . . . .  | 25 "       |
| Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.   |            |
| <i>pt</i> <i>Wigandia caracasana</i> . . . . .   | 2 "        |
| (FLORE, VII, 17.)  |            |
| " — — <i>latifolia</i> . . . . .   | 2 "        |
| " — — <i>floribunda</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — — <i>imperialis</i> . . . . .  | 2 "        |
| " — — <i>urens</i> . . . . .   | 2 "        |
| " — <i>Vigieri</i> . . . . .   | 2 "        |
| Le feuillage des <i>Wigandia</i> prend de beaux développements quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fin de mai.   |            |
| <i>t</i> <i>Xanthochymus pictorius</i> . . . . .   | 10 "       |




## SPÉCIALITÉS

DE

## SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

## AMARYLLIDÉES.

|   | Fr. C.    |   | Fr. C.      |
|---|-----------|---|-------------|
| 2563. <i>Amaryllis fulgida</i> flore pleno . . .  | 6 "       | 2556. <i>Doryanthes excelsa</i> . . .   | " "         |
| (FLORE, XV, 89.)  |           | (FLORE, XX, 77.)  |             |
| 2564. — <i>pardina</i> . . .  | .5 à 25 " | 2557. — <i>Palmeri</i> (FLORE, XVIII, 147). 5 "   |             |
| (FLORE, XVII, 25 et 27.)  |           | <i>très-forts</i> . . .   | .25 à 100 " |
| 2010. — <i>procera</i> . . .  | 15 à 30 " | 2558. <i>Eucharis amazonica</i> . . .   | 3 "         |
| 2565. — <i>reticulata</i> (FLORE, V, 450). . .  | 6 "       | (FLORE, XII, 69.)   |             |
| 2971. — — <i>hybrida</i> . . .  | 10 "      | 3298. — <i>candida</i> . . .  | 5 "         |
| 2566. — <i>solandræflora</i> (FLORE, XI, 11). . .   | 5 "       | 3297. — <i>pumila</i> . . .   | 5 "         |
| — <i>vittata, variétés</i> . . .  | .2 à 50 " | 1827. <i>Eurycles Cunninghami</i> . . .   | 2 "         |
| <b>AMARYLLIS en magnifiques variétés, de 25 à 100 francs la douzaine, en ognons de force à fleurir. — Voir mon Catalogue de Bulbes n° 162, page 265, où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.</b>   |           | 3188. <i>Gastronema sanguineum</i> . . .  | 10 "        |
|  Les Amaryllis de semis de l'Établissement Van Houtte ont remporté, en avril 1869, cinq premiers prix, dont deux médailles en or, à l'Exposition de Bruxelles; elles ont également remporté les premiers prix aux Expositions internationales de Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, Lille, etc. |           | 1843. <i>Hæmanthus coccineus</i> . . .  | 2 "         |
| 2728. <i>Buphone ciliaris</i> . . .   | 10 "      | 1844. — <i>natalensis</i> . . .   | 6 "         |
| 2729. — <i>toxicaria</i> . . .  | 12 "      | 1845. — <i>pubescens</i> . . .  | 2 "         |
| 2730. — — <i>major</i> . . .  | 20 "      | 1846. — <i>puniceus</i> . . .   | 3 "         |
| <b>Clivia, voir <i>Imantophyllum</i>.</b>   |           | Fleur rouge sang; gros bulbe.   |             |
| 1791. <i>Coburgia flava</i> . . .   | 3 "       | 2511. — <i>tigrinus</i> . . .   | 3 "         |
| <i>les douze</i> . . .  | 25 "      | 1847. — <i>virescens albiflos</i> . . .   | 2 "         |
| 1792. — <i>incarnata</i> . . .  | 2 "       | 1848. — — <i>intermedius</i> . . .  | 2 "         |
| <i>les douze</i> . . .  | 20 "      | 1850. <i>Hymenocallis adnata princeps</i> . . .   | 2 à 5 "     |
| 1793. <i>Collania urceolata</i> ( <i>Urceolina</i> ). . .   | 10 "      | 3187. — <i>caribæa</i> . . .  | 4 "         |
| (FLORE, XVII, 133.)   |           | 2559. <i>Imantophyllum cyrtanthiflorum</i>  |             |
| 1794. <i>Crinum amabile</i> . . .   | 25 "      | (FLORE, XVIII, 87). . .   | .3 à 75 "   |
| 3141. — <i>americanum</i> . . .   | 8 "       | 2974. — <i>intermedium splendens</i> . . .  | 10 à 25 "   |
| 2975. — <i>asiaticum</i> . . .  | 10 à 20 " | 2560. — <i>miniatum</i> . . .   | .5 à 15 "   |
| 2555. — <i>brachynema</i> . . .   | 15 "      | <i>très-forts</i> . . .   | .30 à 100 " |
| Odeur suave (FLORE, XXII).  |           | (FLORE, IX, 237.)   |             |
| 1795. — <i>Broussonetianum</i> . . .  | 40 "      | 2561. — — <i>maximum</i> . . .  | 15 à 50 "   |
| 1796. — <i>ornatum insigne</i> . . .  | 25 "      | <i>très-fort</i> . . .  | .200 "      |
| 3181. — <i>pratense canaliculatum</i> . . .   | 10 "      | Plante majestueuse dans toutes ses parties; variété du <i>miniatum</i> ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier; tout à fait hors ligne.  |             |
| 1797. — <i>revolutum</i> . . .  | 5 "       | Tous ces <i>Imantophyllum</i> sont inappréciables comme plantes de décor. On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant; ceux de l' <i>Im. cyrtanthiflorum</i> ressemblent à des Agapanthes à grandes fleurs oranges. |             |
| 3230. — <i>scabrum</i> . . .  | 10 à 25 " | 2962. <i>Ismene viridiflora</i> . . .   | 10 "        |
| (FLORE, XXI, 113.)  |           | 1894. <i>Pancratium speciosum</i> . . .   | 10 "        |
|   |           | 1766. <i>Vallota purpurea</i> . . .   | 1 "         |
|   |           | <i>les douze</i> . . .  | 10 "        |
|   |           | 2879. — — <i>major</i> . . .  | 5 "         |



## AROIDÉES.

|  | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|--|-----------|--|-----------|
| 190. <i>Alocasia alba</i> ( <i>pallida</i> ) . . . . . | 3 "       | 52. <i>Alocasia Lowi</i> . . . . .           | .5 à 10 " |
| 65. — <i>Boryana</i> . . . . .                         | 3 "       | (FLORE, XXI, 89.)                            |           |
| 267. — <i>Gibsoni</i> . . . . .                        | 10 "      | 45. — <i>macrorrhiza foliis variegatis</i> , |           |
| 266. — <i>gigantea</i> . . . . .                       | .5 à 10 " | 5 à 15 "                                     |           |
| 185. — <i>intermedia</i> . . . . .                     | 15 à 25 " | 382. — <i>Marshalli</i> . . . . .            | 3 "       |



ALOCASIA INTERMEDIA. — 15 à 25 francs.

|  | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|--|-----------|--|-----------|
| 186. <i>Alocasia Jenningsi</i> . . . . . | 2 "       | 37. <i>Alocasia metallica</i> . . . . .                        | .5 à 25 " |
| 320. — <i>Liervali</i> . . . . .         | 15 à 25 " | (FLORE, XXI, 97.)  |           |
| 92. — <i>longiloba</i> . . . . .         | 15 "      | Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant |           |



plus d'un pied d'envergure; ce feuillage, très-épais, très-ornemental, hors ligne, se maintient très-verticalement; il est d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré d'une extrême richesse d'effet. Rien d'approchant n'a paru jusqu'à ce jour.

|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| 20. <i>Alocasia plumbea</i> . . . . .      | .5 à 10 "  |
| (FLORE, XXI, 93.)                          |            |
| 414. — <i>Rœzli costata</i> . . . . .      | .25 "      |
| 295. — <i>Sallieri</i> . . . . .           | .3 "       |
| 319. — <i>Sedeni</i> . . . . .             | 10 à 50 "  |
| 66. — <i>zebrina</i> (FLORE, XV, 81). .    | .6 à 75 "  |
| 72. <i>Amorphophallus campanulatus</i> . . | 10 "       |
| 73. — <i>Konjak</i> . . . . .              | .10 "      |
| 121. — <i>nevosus</i> (Dracontium) . . .   | .5 "       |
| 265. — <i>Rivieri</i> . . . . .            | .1 à 15 "  |
| les douze . . . . .                        | 10 à 100 " |
| les vingt-cinq . . . . .                   | 20 à 200 " |
| (FLORE, XIX, 43 à 48.)                     |            |

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 193). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers. Préciense comme décor de massifs.



AMORPHOPHALLUS RIVIERI. — 1 à 15 francs.

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| 74. <i>Anchomanes dubius</i> ( <i>Sauromatum ferox</i> ) . . . . . | .3 "   |
| 296. <i>Anthurium acule.</i> . . . .                               | .6 "   |

Fr. C.

|  |            |
|--|------------|
| 191. <i>Anthurium Augustinianum</i> KOCH<br>( <i>cordatum</i> HORT.) . . . . .   | .5 à 10 "  |
| 192. — <i>bellum</i> . . . . .   | .10 "      |
| 193. — <i>calophyllum</i> . . . . .  | .3 "       |
| 298. — <i>crassipes</i> . . . . .  | .5 "       |
| 383. — <i>crystallinum</i> . . . . .   | .8 à 25 "  |
| 195. — <i>cucullatum</i> . . . . .   | .5 "       |
| 197. — <i>fissum</i> . . . . .   | .10 "      |
| 409. — <i>floribundum</i> . . . . .  | .15 "      |
| 198. — <i>Galeottianum</i> . . . . .   | .5 "       |
| 322. — <i>glaucescens</i> . . . . .  | 10 à 25 "  |
| 199. — <i>Hügelii</i> ( <i>Hookeri</i> ). . . . .  | .3 "       |
| 351. — <i>hybridum</i> . . . . .   | .15 "      |
| 299. — <i>imperiale</i> . . . . .  | .15 "      |
| 200. — <i>leuconeurum</i> , fort . . . . .   | .25 "      |
| 201. — <i>Lindigi</i> . . . . .  | .10 "      |
| 202. — <i>magnificum</i> . . . . .   | 5 à 200 "  |
| 203. — <i>mauritianum</i> . . . . .  | .5 "       |
| 204. — <i>Maximilianum</i> . . . . .   | .10 "      |
| 301. — <i>peltatum radiatum</i> . . . . .  | 25 à 50 "  |
| 210. — <i>radicans</i> . . . . .   | .5 "       |
| 211. — <i>regale</i> . . . . .   | 3 à 200 "  |
| 212. — <i>rubricaula</i> . . . . .   | .6 "       |
| 213. — <i>Scherzerianum</i> . . . . .  | 3 à 200 "  |
| (FLORE, XVII, 129.)  |            |
| 75. <i>Ariopsis peltata</i> . . . . .  | .2 "       |
| 324. <i>Arisæma præcox</i> . . . . .   | .5 "       |
| 217. — <i>filiforme</i> . . . . .  | .3 "       |
| 76. — <i>ringens</i> (FLORE, XI, 167) . . .  | .5 "       |
| 415. — <i>speciosissimum Hookerianum</i> . .   | .15 "      |
| 302. <i>Asterostigma zebrinum</i> . . . . .  | .3 "       |
| Caladium : voir mon Catalogue de<br>Gémériacées, n° 166, pages 96<br>et suivantes, où ils sont énumé-<br>rés et cotés par pièce et par<br>collections. |            |
| 416. <i>Colocasia argyroneura</i> . . . . .  | .25 "      |
| 57. — <i>cærulescens</i> . . . . .   | .3 "       |
| 14. — <i>esculenta</i> . . . . .   | .2 "       |
| 136. — — <i>batavensis</i> . . . . .   | .2 "       |
| 78. <i>Conophallus bulbifer</i> (FLORE) . . .  | .2 "       |
| 387. <i>Curmeria picturata</i> . . . . .   | .5 à 100 " |
| 417. — <i>Rœzli</i> . . . . .  | .25 "      |
| 355. <i>Dieffenbachia amazonica</i> . . . . .  | .3 à 15 "  |
| 280. — <i>Barquiniana</i> . . . . .  | .2 à 100 " |
| 292. — <i>Bausei</i> . . . . .   | .6 à 50 "  |
| 326. — <i>Bowmani</i> . . . . .  | .2 à 200 " |
| 418. — <i>brasiliensis</i> . . . . .   | .50 "      |
| 290. — <i>eburnea</i> . . . . .  | .3 à 10 "  |
| 220. — <i>gigantea</i> . . . . .   | .4 "       |
| 221. — <i>grandis</i> . . . . .  | .4 "       |
| 407. — <i>imperialis</i> , très-fort. . . . .  | 25 à 75 "  |
| 386. — <i>latimaculata</i> . . . . .   | .5 à 50 "  |
| 338. — <i>nebulosa</i> . . . . .   | .3 à 10 "  |
| 379. — <i>nobilis</i> . . . . .  | .6 à 50 "  |
| 223. — <i>Pearcei</i> . . . . .  | .3 à 25 "  |
| 225. — <i>Seguine picta</i> . . . . .  | .3 à 25 "  |
| 291. — <i>Wallisi</i> . . . . .  | .6 "       |



|  | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|--|-----------|--|-----------|
| 227. <i>Dieffenbachia Weiri</i> . . .              | .3 à 25 " | 245. <i>Philodendron</i> sp. ( <i>Philippines</i> ) . . .  | 5 "       |
| 79. <i>Echidnium Schomburgki</i> ( <i>surina-</i>  |           | 305. — <i>spinosum</i> . . .   | 5 "       |
| <i>mense</i> ) . . .                               | 3 "       | 247. — <i>surinamense</i> . . .  | 10 "      |
| 377. <i>Godwinia gigas</i> (FLORE, XXI, 147). 10 " |           | Aroidées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure. |           |
| 303. <i>Gonatanthus sarmentosus</i> . . .          | 2 "       | 389. <i>Phyllotanium Lindenii</i> . . .  | .8 à 75 " |
| 232. <i>Philodendron bipinnatifidum</i> . . .      | 15 "      | 388. <i>Pistia Stratiotes</i> . . .  | 2 "       |
| 234. — <i>crassinervium</i> . . .                  | 5 "       | 248. <i>Pothos argyræa</i> . . .   | 2 "       |
| 410. — <i>Daguense</i> . . .                       | 6 "       | 249. — — <i>major</i> . . .  | 2 "       |
| 235. — <i>giganteum</i> . . .                      | 3 à 8 "   | 390. — <i>filifolia</i> . . .  | 20 "      |
| 236. — <i>grandifolium</i> . . .                   | 10 "      |  |           |



DIEFFENBACHIA NOBILIS. — 6 à 50 francs.

|  | Fr. C. |   | Fr. C.    |
|--|--------|---|-----------|
| 237. <i>Philodendron heliconiæfolium</i> . . . | 2 "    | 250. <i>Pothos lucida</i> . . .                         | 3 "       |
| 238. — <i>Lindenii</i> . . .                   | 5 "    | 251. — <i>pentaphylla</i> . . .                         | .5 à 25 " |
| 239. — <i>longilaminatum</i> . . .             | 10 "   | 1900. <i>Richardia africana</i> ( <i>Calla</i> ) . . .  | 50 "      |
| 411. — <i>melanochrysum</i> . . .              | 6 "    | 1901. — <i>albo-maculata</i> (") (FL., XXI, 165) 2 "    |           |
| 241. — <i>panduræforme</i> . . .               | 5 "    | <i>les douze</i> . . .                                  | 18 "      |
| 243. — <i>sanguineum</i> . . .                 | 5 "    | Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et |           |



arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau CALLA, *Pied de veau d'Ethiopie*, au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est du plus prodigieux effet pendant une grande partie de la belle saison.

|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| 255. <i>Schizocasia</i> Portei. . . . .                               | 4 " "       |
| 257. <i>Spathiphyllum</i> cannaefolium . . . . .                      | 30 " "      |
| 258. — <i>heliconiaefolium</i> . . . . .                              | 25 " "      |
| 262. <i>Syngonium</i> albo-lineatum . . . . .                         | 3 " "       |
| 261. — <i>Schottianum</i> . . . . .                                   | 2 " "       |
| 263. <i>Tornelia</i> fragrans ( <i>Monstera deliciosa</i> ) . . . . . | .5 à 20 " " |

|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| 274. <i>Typhonium</i> divaricatum. . . . .      | 3 à 8 " " |
| 271. <i>Xanthosoma</i> appendiculatum . . . . . | 2 " "     |
| 88. — <i>atrovirens</i> . . . . .               | 2 " "     |
| 90. — <i>helleborifolium</i> . . . . .          | 2 " "     |
| 68. — <i>Maffa</i> . . . . .                    | 2 " "     |
| 85. — <i>— variegatum</i> . . . . .             | 2 " "     |
| 89. — <i>sagittifolium</i> . . . . .            | 2 " "     |
| 273. — <i>utile</i> . . . . .                   | 2 " "     |
| 71. — <i>versicolor</i> (FLORE) . . . . .       | 3 " "     |
| 70. — <i>violaceum</i> . . . . .                | 2 " "     |
| 397. <i>Zamioculcas</i> Loddigesi . . . . .     | 10 " "    |

## BEGONIAS.

|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| 154. <i>Begonia</i> boliviensis . . . . .              | 1 à 3 " " |
| (FLORE, XVII, 21.)                                     |           |
| 277. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .            | 5 " "     |
| 221. — <i>cinnabarina rosea</i> (Lemoine) . . . . .    | 4 " "     |
| 278. — <i>corallina</i> . . . . .                      | 3 " "     |
| 155. — <i>diversifolia</i> (FLORE, XVIII, 7) . . . . . | 25 " "    |
| les douze. . . . .                                     | 2 " "     |

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

|  |        |
|--|--------|
| 156. — <i>Evansiana</i> (discolor) . . . . . | 50 " " |
| les douze . . . . .                          | 5 " "  |

Pleine terre; très-belles fleurs.

|  |       |
|--|-------|
| 198. — <i>hybr.</i> Chelsoni . . . . . | 2 " " |
| 218. — — Craigii. . . . .              | 2 " " |

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 188. <i>Begonia</i> <i>hyb.</i> Laura . . . . .                             | 1 " "  |
| 189. — — <i>multiflora</i> . . . . .  | 1 " "  |
| 217. — — <i>Richardsoniana</i> . . . . .                                    | 1 " "  |
| 222. — <i>intermedia</i> (Veitch) . . . . .                                 | 1 " "  |
| 140. — <i>Pearcei</i> . . . . .   | 75 " " |
| les douze. . . . .  | 6 " "  |
| 231. — — <i>superba</i> . . . . .   | 2 " "  |
| 163. — <i>roseiflora</i> . . . . .  | 4 " "  |
| 191. — — <i>alba</i> . . . . .  | 4 " "  |
| 190. — <i>Sedeni</i> . . . . .  | 1 " "  |
| 157. — <i>Veitchi</i> (FLORE, XXII) . . . . .                               | 8 " "  |
| Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange; espèce précieuse.       |        |
| 174. — <i>Weltoniensis</i> . . . . .  | 1 " "  |
| Excellent pour pleine terre; fleurs roses très-abondantes jusqu'aux gelées. |        |

## BEGONIAS à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc.

|  |            |
|--|------------|
| 12 belles variétés, à notre choix. . . . . | 10 francs. |
| 25 — — — — —                               | 20 " "     |

## BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1872.

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. Ch. Raes. Cette race, contrairement à la propagation facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.


Les sept variétés : 20 francs.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 207. <i>Agate</i> (L. Van Houtte). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme. . . . .  | 3 " "  |
| 208. <i>Cornaline</i> (L. Van Houtte). Crème nuancé aurore, fleur énorme et de tout 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .   | 3 " "  |
| 209. <i>Emeraude</i> (L. Van Houtte). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-large (6 centimètres); hybride ligneux du <i>B. boliviensis</i> et du <i>B. Veitchi</i> , n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra! . . . . .                   | 5 " "  |
| 210. <i>Onyx</i> (L. Van Houtte). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur de <i>Begonia Veitchi</i> qui est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le <i>B. Veitchi</i> . . . . . | 4 " "  |



Fr. C.

212. **Rubis** (*L. Van Houtte*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosiflora*; fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; variété très-florifère . . . . . 3 "
213. **Saphir** (*L. Van Houtte*). Beau rose vif . . . . . 4 "
216. **Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres), variété très-distincte, hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis*. . . . . 4 "



BEGONIA VEITCHI. — 8 francs.



## BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1873.

Les neuf variétés : 40 francs.

Fr. C.

199. **Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei**, mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; cette variété est très-florifère; son port est superbe et elle s'élève en pyramide . . . . . 8 "
204. **Charles Van Eeckhaute** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs blanc carné; florifère . . . . . 5 "
201. **Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet à accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle. . . . . 6 "
202. **Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleurs oranges, serrées; variété florifère . . . . . 5 "
203. **Jules Hye** (*L. Van Houtte*) . . . . . 6 "
205. **Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Dédié à notre excellent collègue de Lille (FLORE, XIX, 26) . . . . . 5 "
211. **Mad. Auguste Lemonnier** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs vermillon; hybride des *B. Sedeni* et *rosaeflora* . . . . . 5 "
215. **Emile De Coninck** (*L. Van Houtte*) . . . . . 5 "
228. **Candidissima** (*L. Van Houtte*). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur . . . . . 6 "

## BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1875.

Les huit variétés : 75 francs.

229. **A. Krieger** (*L. Van Houtte*). Strié . . . . . 7 "
234. **F. Lecoïnte** (*L. Van Houtte*). Rose clair, très-large fleur . . . . . 15 "
233. **Friedrich Siesmeyer** (*L. Van Houtte*). Vermillon feu, variété naine . . . . . 10 "
223. **Léon Plisson** (*L. Van Houtte*). Orange, de 1<sup>re</sup> grandeur. . . . . 7 "
235. **Massange de Louvrex** (*L. Van Houtte*). Orange vif. . . . . 15 "
243. **Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur, orange pur . . . . . 15 "
280. **Mad. Zimmermann** (*L. Van Houtte*) . . . . . 15 "
239. **Madame Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*) . . . . . 20 "

## Prix des BEGONIAS TUBÉREUX en mélange :

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Les six. . . . .         | 8 francs. |
| Les douze . . . . .      | 14 "      |
| Les vingt-cinq . . . . . | 25 "      |
| Les cinquante. . . . .   | 45 "      |
| Le cent . . . . .        | 80 "      |

## Culture des BEGONIAS TUBÉREUX.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3° à 4°, à la manière des *Gladiolus*, etc.

## 236. BEGONIA OCTOPETALA . . . . . 6 francs.

A paru dans le XX<sup>e</sup> vol. de la FLORE, page 25. Du Haut Pérou, presque rustique; très-beau feuillage, fleurs très-grandes, nombreuses, blanches à revers colorés, de la dimension de celles de l'*Anemone japonica*.



## BROMÉLIACÉES.

|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| 2. <i>Æchmea cærulescens</i> . . . . .                  | .3 à 10 " |
| 1. — <i>cœlestis</i> ( <i>Hoplophytum</i> ) . . . . .   | 2 "       |
| les douze. . . . .                                      | 18 "      |
| 3. — <i>fulgens</i> discolor (FLORE, V, 449b) . . . . . | 3 "       |
| 4. — <i>Weilbachi</i> . . . . .                         | 3 "       |
| <i>Ananas, voir ci-après.</i>                           |           |
| 6. <i>Ananassa Porteana</i> variegata, . . . . .        | 15 à 35 " |
| 7. — <i>sativa</i> foliis variegatis . . . . .          | 25 à 50 " |
| 8. <i>Billbergia amœna</i> . . . . .                    | 3 "       |
| 139. — <i>chlorosticta</i> . . . . .                    | 35 "      |
| 11. — <i>discolor</i> . . . . .                         | 4 "       |
| 129. — <i>farinosa</i> . . . . .                        | 5 "       |
| 12. — <i>fasciata</i> ( <i>rhodocyanea</i> ) . . . . .  | 5 "       |
| (FLORE, III, 207.)                                      |           |
| 130. — <i>gigantea</i> . . . . .                        | 15 "      |
| 59. — <i>Joinvillei</i> . . . . .                       | 2 "       |
| 13. — <i>Leopoldi</i> . . . . .                         | 5 "       |
| 14. — <i>Liboniana</i> (FLORE, X, 195) . . . . .        | 2 "       |
| 15. — <i>longifolia</i> . . . . .                       | 2 "       |
| 16. — <i>melanacantha</i> . . . . .                     | 4 "       |
| 17. — <i>pyramidalis</i> . . . . .                      | 5 "       |
| 18. — <i>Quesneliana</i> . . . . .                      | 10 à 25 " |
| (FLORE, X, 157.)  |           |

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* GAUCH., dont l'introduction est due au Voyage de la Bonite. Nous avions tout vendu et il ne nous restait que la ressemblance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige, effet dont le peintre s'est fort mal tiré dans la planche que nous avons publiée.


|   |      |
|---|------|
| 135. — <i>reginæ Ameliæ</i> . . . . .           | " "  |
| 12. — <i>rhodocyanea</i> . . . . .              | 5 "  |
| 127. — — <i>superba</i> . . . . .               | 10 " |
| 20. — <i>sanguinea</i> . . . . .                | 3 "  |
| 22. — <i>thyrsoides</i> . . . . .               | 3 "  |
| 23. — <i>Wioti</i> . . . . .                    | 5 "  |
| 24. — <i>zebrina</i> (FLORE) . . . . .          | 2 "  |
| 132. <i>Bromelia Binotiana, fort.</i> . . . .   | 10 " |
| 72. — <i>Karatas</i> . . . . .                  | 4 "  |
| 98. <i>Caraguata lingulata</i> . . . . .        | 3 "  |
| 95. <i>Cryptanthus acaulis ruber</i> . . . . .  | 2 "  |
| 25. <i>Disteganthus basilateralis</i> . . . . . | 3 "  |
| (FLORE, III, 227.)                              |      |
| 58. <i>Distiacanthus scarlatinus</i> . . . . .  | 10 " |
| 128. <i>Encholirion corallinum</i> . . . . .    | 10 " |
| 75. — <i>Jonghei</i> . . . . .                  | 10 " |
| 133. — <i>roseum</i> . . . . .                  | 10 " |
| 77. — <i>Saundersi</i> . . . . .                | " "  |
| 76. <i>Greigia sphacelata</i> . . . . .         | 4 "  |

|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| 29. <i>Guzmania fragrans</i> . . . . .   | .4 à 10 "  |
| 28. — <i>picta</i> (FLORE) . . . . .   | 6 "        |
| 78. — <i>tricolor</i> (FLORE, IX, 159) . . . . .   | .3 à 6 "   |
| 30. <i>Hechtia Ghiesbreghtii</i> . . . . .   | 10 "       |
| 31. — <i>glomerata, fort</i> . . . . .   | 15 "       |
| 79. <i>Hohenbergia strobilacea</i> . . . . .   | 2 "        |
| 28. <i>Nidularium fulgens</i> ( <i>Guzmania</i><br><i>picta</i> ) . . . . .  | 6 "        |
| 33. — <i>Innocenti</i> . . . . .   | 4 "        |
| 35. — <i>Meyendorffii</i> ( <i>Carolinea</i> ) . . . . .   | 5 "        |
| 36. — <i>Scheremetieffii</i> . . . . .   | 3 "        |
| 116. <i>Pepinia aphelandroflora</i> . . . . .  | 2 "        |
| 38. <i>Pholidophyllum zonatum</i> . . . . .  | 3 "        |
| 84. <i>Pitcairnea flammea gemina</i> . . . . .   | 4 "        |
| 85. — <i>imbricata</i> . . . . .   | 4 "        |
| 87. — <i>polyanthoides</i> . . . . .   | 4 "        |
| 90. — <i>speciosissima</i> . . . . .   | 4 "        |
| 91. — <i>staminea</i> . . . . .  | 4 "        |
| 92. — <i>sulphurea</i> . . . . .   | 4 "        |
| 95. — <i>tabulæformis</i> . . . . .  | 3 "        |
| 40. <i>Portea kermesina</i> . . . . .  | 15 "       |
| 42. <i>Pourretia brevifolia</i> . . . . .  | .3 à 15 "  |
| 43. — <i>mexicana</i> . . . . .  | 4 "        |
| 47. <i>Puya xanthocalyx</i> . . . . .  | 4 "        |
| 18. <i>Quesnelia rufa</i> . . . . .  | 10 à 25 "  |
| (FLORE, X, 157.)   |            |
| 48. <i>Tillandsia bivittata</i> . . . . .  | 5 "        |
| 49. — <i>cyanea</i> . . . . .  | 5 "        |
| 96. — <i>farinosa</i> . . . . .  | 4 "        |
| 122. — <i>Legrellei</i> . . . . .  | 5 "        |
| 114. — <i>Lindenii</i> . . . . .   | 25 à 100 " |
| 133. — <i>mosaica</i> . . . . .  | 60 à 150 " |
| 50. — <i>splendens</i> ( <i>Vriesea</i> ) . . . . .  | .2 à 5 "   |
| (FLORE, II, mai, pl. IV.)  |            |
| 54. — <i>stricta</i> . . . . .   | 25 "       |
| 126. — <i>tessellata</i> . . . . .   | .8 à 20 "  |
| 137. — <i>Zahni</i> . . . . .  | 25 à 75 "  |
| 97. <i>Vriesea brachystachys</i> . . . . .   | 5 "        |
| 53. — <i>Glaziouana</i> . . . . .  | .200 "     |
| 54. — <i>psittacina</i> . . . . .  | 5 "        |
| 134. — <i>sanguinolenta</i> . . . . .  | 25 "       |
| 140. — <i>Hillegeeriana</i> . . . . .  | 25 à 50 "  |
| Espèce très-grande, dans le genre du <i>Vriesea Glaziouana</i> ,<br>tigrée au bas de la feuille, d'un port superbe, très-ornemental. |            |
| 50. — <i>splendens</i> . . . . .   | .2 à 5 "   |



## CYCADÉES.

|   | Fr. C.    |   | Fr. C.    |
|---|-----------|---|-----------|
| 2. <i>Cycas circinalis</i> . . . . .              | 10 à 3000 | 8. <i>Zamia</i> Mac Kenzi ( <i>Macrozamia</i> ),  | 2 à 5     |
| 3. — <i>media</i> . . . . .                       | 10 à 200  | 10. — <i>mexicana</i> ( <i>Cerat.</i> ) <i>très-fort.</i>   | 250       |
| 14. — <i>neo-caledoniana</i> . . . . .            | 25        | 11. — <i>niveo-lanuginosa</i> . . . . .   | 150 à 500 |
| 4. — <i>revoluta</i> . . . . .                    | 5 à 500   | 21. — <i>Perowskiana</i> . . . . .  | 5 à 50    |
| 18. <i>Dion edule</i> . . . . .                   | 25 à 300  | 19. — <i>pecta</i> . . . . .  | 75        |
| 17. <i>Macrozamia plumosa</i> , <i>très-fort.</i> | 25 à 100  | 15. — <i>Rœzli</i> . . . . .  | 15 à 300  |
| 6. <i>Stangeria paradoxa</i> . . . . .            | 40        | 13. — <i>villosa</i> . . . . .  | 75 à 300  |
| 12. <i>Zamia corallipes</i> . . . . .             | 15 à 25   | L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance. |           |
| 7. — <i>furfuracea</i> . . . . .                  | 5 à 30    |   |           |
| 20. — <i>Lindeni</i> . . . . .                    | 200 à 500 |   |           |



ZAMIA CORALLIPES. — 15 à 25 francs.



## CYRTANDRACÉES.

|   | Fr. C. |   | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 7. <i>Æschynanthus</i> Boschianus . . . . . | 1 "    | 6. <i>Æschynanthus</i> zebrinus . . . . .   | 1 "    |
| 1. — cordifolius . . . . .                  | 1 "    | or <i>Chirita</i> lilacina . . . . .  | 2 "    |
| 13. — Hirschbaumi . . . . .                 | 1 "    | t — sinensis . . . . .  | 1 "    |
| 8. — javanicus . . . . .                    | 1 "    | " — — foliis variegatis . . . . .   | 1 "    |
| 9. — Lobbianus . . . . .                    | 1 "    | <i>Cyrtandra</i> bicolor . . . . .  | 2 "    |
| 2. — maculatus . . . . .                    | 1 "    | Cyrtandracées à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un <i>Rhododendron campanulatum</i> . |        |
| 10. — pulcher . . . . .                     | 1 "    | <i>Didymocarpus</i> Humboldtianus . . . . .   | 4 "    |
| 3. — ramosissimus . . . . .                 | 1 "    | (FLORE, XII, 153.)  |        |
| 11. — splendidus . . . . .                  | 1 "    | <i>Streptocarpus</i> polyanthus . . . . .   | 2 "    |
| 5. — tricolor . . . . .                     | 1 "    | — Saundersi (FLORE, XVII, 153) . . . . .  | 3 "    |

## FOUGÈRES

DE

## SERRE CHAUDE ET SERRE FROIDE.

## FILICES.

N. B. Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucune marque ; celles que l'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées du signe † ; enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par la marque \*.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront indiquées par correspondance.

|  | Fr. C.    |   | Fr. C.    |
|--|-----------|---|-----------|
| <i>Acrophorus</i> PRESL.                       |           | <i>Adiantum</i> L.                          |           |
| 298. hemipterus M. . . . .                     | 2 à 5 "   | 424. gracillimum . . . . .                  | 5 "       |
| <i>Actinopteris</i> LINK.                      |           | 439. Hendersoni . . . . .                   | 15 "      |
| 120. radiata LINK . . . . .                    | 15 "      | 420. Henslowianum . . . . .                 | 20 "      |
| (FLORE, XVIII, 51.)                            |           | 425. hispidulum . . . . .                   | 1 "       |
| <i>Adiantum</i> L.                             |           | 135. macrophyllum Sw. . . . .               | 2 "       |
| 122. † Capillus Veneris L. . . . .             | 1 "       | 394. peruvianum . . . . .                   | 2 "       |
| 365. — — amabile. . . . .                      | 2 "       | 367. polyphyllum . . . . .                  | 4 "       |
| 328. — — crispulum . . . . .                   | 2 "       | 311. rubellum . . . . .                     | 5 "       |
| 329. — — magnificum . . . . .                  | 2 "       | 316. Sanctæ-Catharinæ . . . . .             | 2 "       |
| 366. — — undulatum . . . . .                   | 3 "       | 136. Scutum. . . . .                        | 1 "       |
| 133. cardiochloena KZE . . . . .               | 4 à 10 "  | 436. Seemannii . . . . .                    | 15 "      |
| 124. † chilense KLFS. . . . .                  | 4 "       | 434. speciosum . . . . .                    | 20 "      |
| 125. concinnum H. B. K. . . . .                | 1 "       | 301. trapeziforme L. . . . .                | 2 "       |
| 126. — latum M. . . . .                        | 1 "       | les douze. . . . .                          | 15 "      |
| 128. † cuneatum LANGS. et FISH. ( <i>tene-</i> |           | 342. velutinum . . . . .                    | 15 "      |
| <i>rum</i> ) . . . . .                         | 1 "       | 331. Veitchi. . . . .                       | 3 "       |
| 369. curvatum KLFS. . . . .                    | 6 "       | <i>Allantodia</i> , voir <i>Asplenium</i> . |           |
| 300. diaphanum . . . . .                       | 1 "       | <i>Alsophila</i> R. BR.                     |           |
| les douze. . . . .                             | 9 "       | 142. †* australis R. BR. . . . .            | 2 à 50 "  |
| 340. excisum Leyii. . . . .                    | 5 "       | très-fort. . . . .                          | 150 "     |
| 129. — multifidum M. . . . .                   | 3 "       | 140. †* excelsa R. BR. . . . .              | 1 à 200 " |
| 130. farleyense M. (FLORE, XIX, 7) . . . . .   | 4 à 200 " | 144. * infesta KZE . . . . .                | 5 à 25 "  |
| forts, les douze . . . . .                     | 40 "      | 145. * obtusa KL. . . . .                   | 50 "      |
| Noble physionomie d'une extrême élégance.      |           | 146. †* radens KLFS . . . . .               | 10 "      |
| 440. Funcki. . . . .                           | 15 "      | 426. †* Van Geerti . . . . .                | 10 à 25 " |



|                                      | Fr. C. | Angiopteris HOFFM.                                | Fr. C.    |
|--------------------------------------|--------|---|-----------|
| <i>Aneimia</i> Sw.                   |        | 148. <i>evecta</i> HOFFM. . . . .                 | 5 à 400 n |
| 397. † <i>collina</i> RADD . . . . . | 1 n    | 149. <i>longifolia</i> DEVR. . . . .              | 5 à 300 n |
| 480. † <i>Phyllitidis</i> . . . . .  | 2 n    | 150. <i>macrophylla</i> HORT. ( <i>Marattia</i> ) | 5 à 100 n |



ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM M. — 3 francs.



ADIANTUM FARLEYENSE M. — 4 à 200 francs.

L'Établissement est riche en exemplaires de toutes forces de ce trois fois gracieux *Adiantum Farleyense*, aux prix de 4 à 200 francs pièce ; — les 12 : 40 francs. (En voir la figure coloriée au XIX<sup>e</sup> vol. de la FLORE, page 7).



**Angiopteris** HOFFM. Fr. C.

151. pruinosa KZE. . . . . 5 à 600 " "  
 152. Verschaffelti HORT. (*Marattia*),  
 5 à 100 " "

**Antigramma** PRESL.

380. rhizophylla (*Asplenium*). . . . . 5 " "

**Aspidium** SWARTZ.

Voir *Cyrtomium*, *Lastrea*, *Nephrodium*.

**Asplenium** L.

153. alatum HUMB. et BP. . . . . 15 " "  
 (FLORE, XXII.)

443. aristatum . . . . . 5 " "  
 398. auriculatum . . . . . 2 " "  
 399. † bulbiferum FORST. . . . . 1 " "  
 400. compressum SW. . . . . 2 " "  
 155. † dimorphum KZE. . . . . 2 à 10 " "  
 156. † Fabianum H. et J. (*fœniculaceum*  
 HORT.) . . . . . 1 à 5 " "

401. firmum KZE. . . . . 2 " "  
 370. formosum WILLD. . . . . 10 " "  
 158. lætum SW. . . . . 4 " "  
 433. † longissimum . . . . . 3 " "  
 402. nemorale . . . . . 2 " "  
 265. † Nidus (*Thamnopteris*). . . . . 5 " "  
 371. normale . . . . . 5 " "  
 381. † obtusatum FORST. . . . . 3 " "  
 403. pulchellum RADD. . . . . 3 " "  
 419. schizodon . . . . . 3 " "  
 404. umbrosum J. SW. . . . . 2 " "  
 162. † Veitchianum M. . . . . 1 à 4 " "  
 362. viviparum PRESL. . . . . 2 " "

**Athyrium** ROTH.

164. † decurtatum PRESL. (*Diplazium*  
*pubescens* LOWE). . . . . 3 à 10 " "

**Balantium** KLFS.

180. † antarcticum PRESL. . . . . 1 à 1000 " "  
 douze jeunes plantes. 9 " "  
 181. † Culcita KLFS . . . . . 15 " "

**Blechnum** L.

165. †\* brasiliense DESV. . . . . 2 à 50 " "  
 382. † longifolium H. B. K. . . . . 1 " "  
 167. † nitidum contractum Hook. . . . . 5 " "

**Brainea** J. SM.

168. †\* insignis J. SM. . . . . " "

**Campyloneuron**.

317. decurrens PRESL. . . . . 3 " "  
 384. † Phyllitidis PRESL. . . . . 1 " "

**Cheilanthes**.

169. elegans DESV. . . . . 3 " "  
 444. † triangularis . . . . . 3 " "

**Cibotium** KLFS.

429. †\* Beirichianum. . . . . 25 " "  
 170. †\* princeps LIND., fort. . . . . 2 à 4 " "  
 les douze. . . . . 20 à 36 " "  
 très-fort . . . . . 200 " "  
 171. †\* regale M. . . . . 5 à 40 " "  
 172. †\* Schiedei SCHLECH. . . . . 4 à 200 " "  
 173. †\* spectabile HORT., fort. . . . . 6 à 25 " "

**Cyathea** SM.

Fr. C.

428. †\* Burkei, *belle nouveauté*, fort  
 tronc . . . . . 200 à 1500 " "  
 175. †\* dealbata SW. . . . . 2 à 75 " "  
 387. — compacta. . . . . 1500 " "  
 435. †\* Dregii, fort tronc . . . . . 400 " "  
 303. †\* medullaris SW., vrai. . . . . 2 à 25 " "  
 très-fort. . . . . 100 à 300 " "

Imposante Fougère toute noire, vrai Négus éthiopien.

445. †\* Smithi. . . . . 100 " "

**Cyrtomium** PRESL.

176. † falcatum PRESL. (*Aspidium*). . . . . 1 " "  
 les douze. . . . . 9 " "

**Davallia** SM.

405. † alpina . . . . . 3 " "  
 177. † canariensis SM. . . . . 2 " "  
 406. elegans dissecta . . . . . 3 " "  
 344. Moorei Hook. . . . . 6 " "  
 178. parvula WALL. . . . . 2 " "  
 375. † tenuifolia SW. . . . . 2 " "  
 179. † — stricta . . . . . 2 " "  
 345. Tyermani. . . . . 6 " "

**Dicksonia** L'HÉRIT.

180. †\* antarctica LABILL. (*Balantium*).  
 1 à 1000 " "  
 les douze. . . . . 9 " "  
 407. † cicutaria . . . . . 4 " "  
 408. †\* squarrosa SW. . . . . 5 à 500 " "

**Didymochlæna** DESVAUX.

182. † lunulata DESV. (*truncatula*). . . . . 5 " "

**Diplazium** SW.

183. decussatum J. SM. (*lasiopteris*). 2 à 5 " "  
 184. grandifolium SW. (*Asplenium*). . . . . 50 " "

**Doryopteris** FÉE.

206. † Alcyonis HORT. . . . . 5 à 15 " "  
 207. † Curreri HORT. . . . . 4 à 10 " "

**Drynaria** BORY.

346. coronans J. SM. . . . . 15 " "

**Eupodium** J. SM.

185. Kaulfussi J. SM. (*Marattia micro-*  
*phylla* LODD.) . . . . . 5 à 50 " "

**Gleichenia** R. B.

187. dicarpa R. B. . . . . 25 " "  
 446. dichotoma. . . . . 15 " "  
 447. fiabellata . . . . . 40 " "  
 448. Mendeli . . . . . 75 " "  
 449. rupestris . . . . . 50 " "  
 188. Speluncæ . . . . . 8 " "

**Goniophlebium** BLUME.

377. subauriculatum PRESL. (*Polypo-*  
*dium Reinwardti* KZE). . . . . 15 " "

**Gymnogramme** DESV.

190. chrysophylla Laucheana HORT. . . . . 1 " "  
 191. — gigantea . . . . . 1 " "  
 378. decomposita HORT. . . . . 1 " "  
 273. Parsonsi HORT. . . . . 1 " "  
 319. — gigantea . . . . . 1 " "  
 193. peruviana argyrophylla M. . . . . 1 " "



| Gymnogramme DESV.                              |           | Fr. C.    | Lygodium Sw.                                       |           | Fr. C.    |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 194. pulchella ramosa L.                       | . . . . . | 2 "       | 305. † scandens Sw., fort                          | . . . . . | 5 "       |
| 195. Wettenhalliana M                          | . . . . . | 1 "       | Marattia Sm.                                       |           |           |
| 349. — Flandriæ.                               | . . . . . | 1 "       | 319. Laucheana HORT.                               | . . . . . | .5 à 50 " |
| Hymenodium FÉE.                                |           |           | Voir aussi <i>Angiopteris</i> et <i>Eupodium</i> . |           |           |
| 198. crinitum FÉE ( <i>Acrostichum</i> Sw.)    |           |           | Meniscium SCHREB.                                  |           |           |
| (FLORE, IX, 203)                               | . . . . . | .5 à 15 " | 303. giganteum METT.                               | . . . . . | 2 "       |
| Lastrea BORY.                                  |           |           | Microlepia PRESL.                                  |           |           |
| 201. patens PRESL.                             | . . . . . | 1 à 5 "   | 122. † strigosa M.                                 | . . . . . | 1 à 5 "   |
| 431. † — Standishi                             | . . . . . | 4 "       | Neottopteris, voir <i>Thamnopteris</i> .           |           |           |
| 432. † — varia                                 | . . . . . | 3 "       | Nephrodium RICH.                                   |           |           |
| † <i>Leptopteris</i> PRESL.                    |           |           | 412. cuspidatum                                    | . . . . . | 3 "       |
| Voir <i>Todea</i> .                            |           |           | 413. cyatheoides KLFS.                             | . . . . . | 3 "       |
| Litobrochia PRESL.                             |           |           | 222. † molle corymbiferum MOORE.                   | 3 à 6 "   |           |
| 410. leptophylla FÉE                           | . . . . . | 3 "       | 414. sanctum                                       | . . . . . | 3 "       |
| 330. tripartita J. SM.                         | . . . . . | 2 "       | Nephrolepis SCHOTT.                                |           |           |
| Lomaria WILLD.                                 |           |           | 223. † neglecta.                                   | . . . . . | 2 à 5 "   |
| 210. †* Boryana WILLD. ( <i>cycadeifolia</i> ) |           | 2 à 100 " | 226. † undulata J. SM.                             | . . . . . | 2 "       |
| 211. † ciliata M. (FLORE, XXII)                | . . . . . | 1 "       | Niphobolus KLFS.                                   |           |           |
|  |           |           | 225. Gardneri KZE.                                 | . . . . . | 5 "       |



LOMARIA CILIATA. — 1 franc.

| Lomaria WILLD.                |           | Fr. C.  | Niphobolus KLFS.               |           | Fr. C. |
|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|--------|
| 213. † fluviatilis SPRING.    | . . . . . | 3 "     | 390. Lingua corymbiferus MOORE | .6 à 15 " |        |
| 214. † Gibba LABILL.          | . . . . . | 1 à 3 " | Oleandra CAV.                  |           |        |
| 315. † — crispa               | . . . . . | 2 "     | 415. neriiiformis CAV.         | . . . . . | 2 "    |
| 427. † — intermedia           | . . . . . | 15 "    | 385. nodosa PRESL.             | . . . . . | 2 "    |
| 217. † Patersoni SPRING.      | . . . . . | 2 "     | Onychium KLFS.                 |           |        |
| 411. † procera SPRING         | . . . . . | 10 "    | 227. † japonicum KZE.          | . . . . . | 2 "    |
| 352. † zamioïdes GARDN., fort | . . . . . | 15 "    | Phymatodes.                    |           |        |
| Voir aussi <i>Blechnum</i> .  |           |         | 450. leiorrhiza                | . . . . . | 5 "    |



**Platycerium** DESV.

Fr. C.

**Platycerium** DESV.

Fr. C.

228. † alcorné DESV. . . . . 2 à 10 "

229. biforme BL. . . . . 75 "

393. † — majus . . . . . 15 à 30 "

230. grande J. SM. . . . . 10 à 20 "



PLATYCERIUM GRANDE. — 10 à 20 francs.



PTERIS SERRULATA ANGUSTATA.



**Polypodium L.**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 379. angustifolium. . . . .         | 4 " |
| 307. † albo-punctatum RADD. . . . . | 4 " |
| 321. † glaucum RADD. . . . .        | 2 " |

**Polystichum ROTH.**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 416. † aristatum PRESL. . . . . | 3 " |
|---------------------------------|-----|

**Fr. C.****Polystichum ROTH.**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 233. † triangulum FÉE . . . . . | 5 " |
| Voir <i>Lastrea</i> .           |     |

**Pteris L.**

|   |     |
|---|-----|
| 234. argyræa M., fort. . . . .                            | 1 " |
| 235. † cretica albo-lineata <i>foliis varieg.</i> . . . . | 1 " |

**Fr. C.**

TODEA HYMENOPHYLLOIDES. — 15 à 40 francs.



TODEA SUPERBA. — 10 à 125 francs.



| Pteris L.   | Fr. C. | Selaginella PALISS. DE BEAUV.  | Fr. C.  |
|---|--------|--|---------|
| 236. hirsuta excelsa ( <i>Lonchitis excelsa</i><br>et <i>Ghiesbreghtii</i> HORT.) . . . . . | 5 "    | 285. Galeottiana SPRING . . . . .  | 1 "     |
| 308. quadraurata tricolor . . . . .   | 1 "    | 253. Griffithi SPRING . . . . .  | 2 "     |
| (FLORE, XIII, 157.)   |        | 254. lepidophylla SPRING. . . . .  | 2 "     |
| 237. rubrovenia. . . . .  | 1 "    | 289. Ludoviciana . . . . .   | 2 "     |
| 238. † scaberula RICH. . . . .  | 2 "    | 255. Lyalli SPRING. . . . .  | 2 "     |
| 417. semipinnata L. . . . .   | 3 "    | 292. Mertensi SPRING. . . . .  | 2 "     |
| 239. † serrulata L. . . . .   | 1 "    | 388. — compacta. . . . .   | 2 "     |
| 327. † — corymbifera . . . . .  | 25 "   | 257. — — foliis argenteo-variegatis. 2 "   |         |
| 351. † — cristata M. . . . .  | 1 "    | 259. Poulteri M. . . . .   | 2 "     |
| 418. † — — Dixoni . . . . .   | 1 "    | 293. rubricaulis HORT. . . . .   | 2 "     |
| les douze. . . . .  | 9 "    | 294. sarmentosa A. BRAUN. . . . .  | 2 "     |
| 438. † — — tenuissima . . . . .   | 5 "    | 322. setosa . . . . .  | 2 "     |
| 242. † sulcata monstrosa LK. . . . .  | 2 "    | 295. stenophylla . . . . .   | 2 "     |
| 451. undulata. . . . .  | 5 "    | 323. stolonifera. . . . .  | 2 "     |
| Voir aussi <i>Litobrochia</i> .   |        | 260. variabilis . . . . .  | 2 "     |
| 243. <i>Rhipidopteris peltata</i> SCHOTT. . . . .   | 4 "    | 261. viticulosa KLZ. . . . .   | 2 "     |
| <b>Selaginella</b> PALISS. DE BEAUV.  |        | 324. Vogeli . . . . .  | 2 "     |
| 244. africana LD. . . . .   | 2 "    | 262. Wallichi SPRING. . . . .  | 2 "     |
| 245. apoda SPRING ( <i>pour bordure</i> ),<br>par mètre de longueur . . . . .               | 5 "    | 263. Willdenowi HORT . . . . .   | 2 "     |
| C'est à l'aide de cette <i>Selaginelle</i> que nous bordons nos<br>massifs en serre chaude. |        | <b>Thamnopteris</b> PRESL.   |         |
| 246. atroviridis SPRING . . . . .   | 2 "    | 264. australasica M. . . . .   | 4 à 8 " |
| 296. brevipes . . . . .   | 2 "    | 265. † Nidus PRESL. . . . .  | 5 "     |
| 247. cesia . . . . .  | 1 "    | <b>Todea</b> WILLD.  |         |
| 325. californica. . . . .   | 5 "    | 309. †* arborea . . . . .  | 5 "     |
| 248. conferta HORT. . . . .   | 2 "    | 266. † hymenophylloides RICH. 15 à 40 "  |         |
| 280. convoluta . . . . .  | 2 "    | (FLORE, XXII.)   |         |
| 283. delicatissima A. BRAUN. . . . .  | 2 "    | 320. † — compacta. . . . .   | 15 "    |
| 249. † denticulata LINK ( <i>pour bordure</i> ),<br>par mètre de longueur . . . . .         | 2 "    | 267. † superba COL. ( <i>Leptopteris</i> ) 10 à 125 "                            |         |
| <i>Selaginelle</i> propre à border à l'intérieur des serres froides<br>et tempérées.        |        | (FLORE, XXII.)   |         |
| 250. † — variegata . . . . .  | 1 "    | 332. † Wilkesiana . . . . .  | 15 "    |
| 251. dichroa. . . . .   | 2 "    | <b>Trichomanes</b> L.  |         |
| 282. elongata . . . . .   | 2 "    | 268. † radicans Sw. ( <i>speciosum, brevi-</i><br><i>setum</i> ), fort . . . . . | 10 "    |
| 252. erythropus SPRING . . . . .  | 2 "    | <b>Woodwardia</b> SMITH.   |         |
|   |        | 326. † aspera FÉE ( <i>Doodia</i> R. BR.). . . . .                               | 1 "     |
|   |        | 270. † orientalis Sw. . . . .  | 5 "     |

## FOUGÈRES DE SERRES.

Je livre à mon choix :

|    |  |     |    |   |
|----|--|-----|----|---|
| 25 | FOUGÈRES DE SERRE, en 25 sortes, en belles plantes, pour | fr. | 18 | " |
| 40 | — — — — —  | "   | 30 | " |

GESNÉRIACÉES.

✂ Pour l'énumération, la description et les prix des GESNÉRIACÉES diverses, telles que ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIAS, GESNERIAS, GLOXINIAS, KOLLIKERIA, NÆGELIAS, PLECTOPOMAS, ROSANOWIAS (Biglandularia), SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆAS, etc., on est prié de recourir à notre dernier Catalogue N° 166, pages 71 et suivantes.

Les Gesnériacées sont disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis Novembre jusqu'en Avril; pendant cette période, elles sont expédiées chaque sorte en une capsule en papier, et le tout en une petite boîte en zinc.



Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, pendant la saison de la pousse, des rhizomes que nous offrons à l'état sec, pendant la saison du repos, aux prix fixés dans notre Prix-Courant n° 166, pages 71 et suivantes; une fois les rhizomes ou tubercules plantés et en végétation, ces plantes ne se vendent plus aux prix comme il vient d'être dit, mais comme plantes cultivées en pots.

|  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| <i>Alloplectus bicolor</i> . . . . .                         | 3 "    | 90. <i>Gesneria Donkelaari</i> . . . . .                   | 5 "    |
| — <i>Schlimi</i> . . . . .                                   | 3 "    | (FLORE, IX, 119.)  |        |
| — <i>zamorensis</i> . . . . .                                | 5 "    | La plus riche de floraison et de coloris de tous les       |        |
| <i>Centrosolenia bullata</i> . . . . .                       | 3 "    | <i>Gesnerias</i> .   |        |
| <i>Columnnea Schiedeana</i> . . . . .                        | 2 "    | <i>Gloxinia</i> , graines de surchoix, le paquet . . . . . | 3 "    |
| <i>Cyrtodeira chontalensis</i> ( <i>Achimenes</i> ). . . . . | 2 "    | <i>Ophianthe Libonensis</i> . . . . .                      | 2 "    |
| (FLORE, XVIII, 165.)   |        | <i>Pearcea hypocyrtiflora</i> ( <i>Hypocyrtia brevi-</i>   |        |
| — <i>cupreata</i> . . . . .                                  | 1 "    | calyx) . . . . .   | 5 "    |
| — <i>fulgida</i> . . . . .                                   | 2 "    | (FLORE, XVII, 85.)   |        |
| — <i>metallica</i> . . . . .                                 | 1 "    | <i>Sarmienta repens</i> (FLORE, XVI, 69) . . . . .         | 5 "    |
| <i>Drymonia Turialvæ</i> . . . . .                           | 5 "    | <i>Sciadocalyx digitaliflora</i> . . . . .                 | 2 "    |
| 89. <i>Gesneria discolor</i> . . . . .                       | 3 "    | <i>Sinningia purpurea</i> . . . . .                        | 2 "    |
| les six . . . . .  | 15 "   | <i>Tapeinotes Carolinæ</i> . . . . .                       | 2 "    |
|  |        | (FLORE, XVIII, 43.)  |        |
|  |        | 1351. <i>Tydaea Belzebuth</i> (FLORE, XXI, 31) . . . . .   | 3 "    |

C'est le magnifique *Gesneria discolor* à fleurs d'un brillant rouge laque, qui est le procréateur du *Gesneria Donkelaari*. Nous avons eu la chance de le recevoir fleurir et d'en obtenir de beaux pieds que nous offrons aujourd'hui en vente. — Nous doutons qu'à la vue de l'ensemble de ce brillant type, de ses tiges charnues et de son feuillage sans rival, on puisse hésiter encore à reconnaître la descendance du *Gesneria Donkelaari*, l'hybride le plus merveilleux des Gesnériacées.

A paraître en planche double dans le XXI<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 31. C'est un pendant du *Tydaea Robert-le-Diable*; il sera accueilli avec la même faveur. Ses fleurs, à fond cramoisi, sont entièrement couvertes de taches toutes noires comme celles de la peau d'un léopard.

57. — *magnifica* (*Locheria*) . . . . . 1 "

## LILIACÉES.

|   | Fr. C.    |   | Fr. C. |
|---|-----------|---|--------|
| 1866. <i>Gloriosa Planti</i> ( <i>Methonica</i> ) . . . . . | 1 "       | 1865. <i>Littonia modesta</i> . . . . . | 1 50   |
| (FLORE, IX, 121.)   |           | (FLORE, IV, 9.)                         |        |
| 1867. — <i>superba</i> . . . . .                            | .5 à 10 " |   |        |

## ORCHIDÉES TROPICALES, pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 à 8000 pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les *Odontoglossum*, les *Masdevallia*, les *Sophronitis* et beaucoup de *Lælia* et d'*Oncidium*, etc., qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les *Vanda*, les *Saccolabium*, les *Aerides*, les *Phalænopsis* et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver; la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de *Sphagnum* (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le *Sphagnum* doit être vivant. Les *Cypripedium* de l'Asie, les *Sobralia*, les *Thunia*, les *Limatodes*, les *Calanthe vestita*, les *Goodyera*, etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes terrestres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les *Phalænopsis*, les *Barkeria*, les *Sophronitis*, plusieurs *Dendrobium*, *Cattleya*, *Lælia*, *Oncidium*, etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. —



Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les *Stanhopea*, les *Acineta*, etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs *Dendrobium* à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et l'aérage fait avec précaution, en évitant l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosements; c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil; il en est pourtant, surtout les mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre 10 à 30° centigrades suivant l'ardeur du soleil; 15 à 25° suffisent pour la serre tempérée et 20 à 30° pour la serre chaude (5° centigrades = 4° Réaumur). Le maximum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire; le minimum, pendant leur repos, surtout durant la nuit.

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, pour le prix de 150 à 200 francs et plus; l'acheteur peut être certain d'avoir des plantes bonnes, saines et de 1<sup>er</sup> choix.

|  | Fr. C.     |  | Fr. C.     |
|--|------------|--|------------|
| <i>Acineta densa</i> . . . . .   | 15 à 25 "  | <i>Anguloa Ruckeri</i> . . . . .               | . 25 "     |
| — <i>Humboldti (superba)</i> . . . . .   | 10 à 15 "  | — — <i>sanguinea</i> . . . . .                 | . 50 "     |
| De serre tempérée, d'une culture facile.   |            | — <i>uniflora</i> . . . . .                    | . 20 "     |
| <i>Ada aurantiaca</i> . . . . .  | 15 à 20 "  | <i>Anæctochilus argenteus</i> . . . . .        | . 5 à 15 " |
| <i>Aerides affine (vrai)</i> . . . . .   | 25 à 35 "  | — <i>Dawsonianus</i> . . . . .                 | 10 à 15 "  |
| — <i>crassifolium</i> . . . . .  | 75 à 100 " | (FLORE, XVIII, 21.)                            |            |
| — <i>crispum (FLORE, V, 438)</i> . . . . .   | 20 à 30 "  | — <i>Frederici-Augusti</i> . . . . .           | 15 à 25 "  |
| Très-belle espèce, fleurissant en juin-juillet en longs racèmes. Fleurs blanches teintées de rose. |            | — <i>imperialis</i> . . . . .                  | . 25 "     |
| — <i>Fieldingi (Fox Brush)</i> . . . . .   | 50 à 75 "  | — <i>Lobbianus</i> . . . . .                   | 20 à 35 "  |
| — <i>Larpentæ</i> . . . . .  | . 50 "     | — <i>Lowi</i> . . . . .                        | . 50 "     |
| — <i>Lindleyanum</i> . . . . .   | 50 à 100 " | — <i>Petola (Macodes)</i> . . . . .            | . 25 "     |
| — <i>Lobbi</i> . . . . .   | 25 à 50 "  | — <i>pulcher (Nephelaphyllum)</i> . . . . .    | . 10 "     |
| — <i>maculosum</i> . . . . .   | . 50 "     | — <i>setaceus</i> . . . . .                    | . 50 "     |
| — <i>nobile</i> . . . . .  | 35 à 50 "  | — <i>xanthophyllum</i> . . . . .               | 20 à 30 "  |
| — <i>odoratum</i> . . . . .  | 10 à 25 "  | <i>Ansellia africana</i> . . . . .             | . 25 "     |
| — — <i>majus</i> . . . . .   | 15 à 25 "  | <i>Arpophyllum Cardinalis</i> . . . . .        | 25 à 50 "  |
| — — <i>purpurascens</i> . . . . .  | 30 à 50 "  | — <i>giganteum</i> . . . . .                   | 15 à 25 "  |
| — <i>quinquevulnerum</i> . . . . .   | 35 à 50 "  | — <i>spicatum</i> . . . . .                    | 25 à 35 "  |
| — <i>rubrum</i> . . . . .  | 40 à 75 "  | <i>Barberia Skinneri</i> . . . . .             | 10 à 15 "  |
| — <i>suavissimum</i> . . . . .   | 30 à 50 "  | — <i>spectabilis (FLORE, I, 139)</i> . . . . . | . 15 "     |
| — <i>testaceum</i> . . . . .   | . 25 "     | <i>Batemanian Wallisi</i> . . . . .            | 50 à 75 "  |
| — <i>virens</i> . . . . .  | . 25 "     | <i>Bifrenaria aurantiaca</i> . . . . .         | . 15 "     |
| — — <i>Dayanum</i> . . . . .   | 25 à 50 "  | — <i>Harrisoni alba</i> . . . . .              | . 10 "     |
| — <i>Warneri</i> . . . . .   | . 25 "     | <i>Bletia Orgiesiana</i> . . . . .             | . 10 "     |
| <i>Angræcum eburneum, fort</i> . . . . .   | 30 à 50 "  | — <i>patula</i> . . . . .                      | . 15 "     |
| — <i>pellucidum</i> . . . . .  | 20 à 30 "  | <i>Bolbophyllum aureum</i> . . . . .           | . 10 "     |
| — <i>pertusum</i> . . . . .  | 40 à 60 "  | — <i>Carreyanum</i> . . . . .                  | . 15 "     |
| — <i>sesquipedale</i> . . . . .  | 50 à 100 " | — <i>cupreum</i> . . . . .                     | 15 à 25 "  |
| (FLORE, XIV, 49.)  |            | — <i>guttatum</i> . . . . .                    | 15 à 20 "  |
| — <i>superbum</i> . . . . .  | 50 à 100 " | — <i>Henshalli</i> . . . . .                   | . 15 "     |
| — <i>virens</i> . . . . .  | 25 à 40 "  | — <i>Lobbi</i> . . . . .                       | 10 à 15 "  |
| <i>Anguloa Clowesi</i> . . . . .   | 15 à 25 "  | — <i>neilgherriense</i> . . . . .              | 15 à 20 "  |
| — — <i>macrantha</i> . . . . .   | 25 à 35 "  | — <i>psittacoglossum</i> . . . . .             | 15 à 25 "  |
|  |            | — <i>umbellatum</i> . . . . .                  | 10 à 15 "  |



|   | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Brassavola Digbyana</b> . . . . .  | 20 à 35 " | <b>Cattleya Perrini</b> ( <i>Lælia</i> ) . . . . .   | 15 à 25 " |
| (FLORE, III, 237.)  |           | Belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.  |           |
| — glauca . . . . .  | 10 à 15 " | — præstans ( <i>Lælia</i> ) . . . . .  | 25 "      |
| — nodosa . . . . .  | 10 "      | (FLORE, XVIII, 127.)   |           |
| <b>Brassia brachyata</b> . . . . .  | 15 à 20 " | — — carminea . . . . .   | 30 à 50 " |
| — candida . . . . .   | 25 "      | — purpurata ( <i>Lælia</i> ) . . . . .   | 15 à 30 " |
| — Gireoudiana . . . . .   | 15 "      | — quadricolor . . . . .  | 25 à 50 " |
| — Keiliana . . . . .  | 15 à 25 " | — Schilleriana Regnelli . . . . .  | 35 à 50 " |
| — verrucosa . . . . .   | 10 à 15 " | — Skinneri . . . . .   | 15 à 25 " |
| — — major . . . . .   | 15 à 25 " | — speciosissima . . . . .  | 20 à 35 " |
| <b>Broughtonia sanguinea</b> . . . . .  | 15 "      | Le <i>C. speciosissima</i> ressemble au <i>C. labiata</i> . Ses fleurs sont les plus grandes du genre. |           |
| <b>Burlingtonia granatensis</b> . . . . .   | 15 "      | — superba (FLORE, IX, 177) . . . . .   | 30 à 50 " |
| — venusta . . . . .   | 15 à 20 " | — Trianae . . . . .  | 20 à 30 " |
| <b>Calanthe Masuca grandiflora</b> . . . . .  | 25 à 35 " | — Wageneri . . . . .   | 50 à 75 " |
| — Veitchi superba . . . . .   | 35 "      | — Walkeriana ( <i>bulbosa</i> ) . . . . .  | 15 à 25 " |
| — veratrifolia . . . . .  | 15 à 25 " | — Wallisi . . . . .  | 35 à 50 " |
| — vestita . . . . .   | 10 "      | — Warscewiczii . . . . .   | 50 à 75 " |
| — — roseo-oculata . . . . .   | 10 "      | <b>Chysis bractescens</b> . . . . .  | 20 à 30 " |
| <b>Catasetum discolor</b> . . . . .   | 20 à 30 " | (FLORE, VII, 87.)  |           |
| <b>Cattleya</b> (voir aussi sous <i>Lælia</i> ).  |           | — Limminghei . . . . .   | 25 à 35 " |
| — Aclandiae . . . . .   | 20 à 30 " | <b>Cirrhopetalum Candelabrum</b> . . . . .   | 20 "      |
| — amethystina . . . . .   | 15 à 25 " | — umbellatum . . . . .   | 10 à 15 " |
| — amethystoglossa . . . . .   | 35 à 50 " | <b>Cœlia macrostachya</b> . . . . .  | 10 à 15 " |
| — aurea . . . . .   | 30 à 50 " | <b>Cœlogyne biflora</b> . . . . .  | 15 "      |
| — bicolor . . . . .   | 20 à 35 " | — cristata (FLORE, XVII, 163). . . . .   | 10 à 25 " |
| — bogotensis . . . . .  | 25 "      | Une des meilleures Orchidées; fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.                      |           |
| — bulbosa ( <i>Walkeriana</i> ) . . . . .   | 15 à 25 " | — elegans . . . . .  | 20 à 30 " |
| — chocoensis . . . . .  | 25 "      | — fimbriata . . . . .  | 10 à 15 " |
| — citrina (FLORE, XVI, 147) . . . . .   | 15 "      | — flaccida . . . . .   | 10 à 15 " |
| — crispa ( <i>Lælia</i> ) . . . . .   | 15 à 25 " | Fleurs en longs racèmes, très-odorantes.   |           |
| — Dowiana (FLORE, XVI, 185). . . . .  | 50 à 75 " | — fuliginosa . . . . .   | 15 à 20 " |
| — Eldorado (FLORE, XVIII, 13) . . . . .   | 50 à 75 " | — graminifolia . . . . .   | 15 "      |
| — elegans ( <i>Lælia</i> ) . . . . .  | 35 à 50 " | — Lowi . . . . .   | 35 à 50 " |
| — Forbesi . . . . .   | 15 "      | — pandurata (FLORE, XX, 145) . . . . .   | 15 à 25 " |
| — gigas . . . . .   | 35 à 75 " | — speciosa . . . . .   | 15 "      |
| — guttata . . . . .   | 20 à 30 " | <b>Colax jugosus</b> . . . . .   | 20 à 30 " |
| — intermedia . . . . .  | 15 à 25 " | <b>Cynoches lepidum</b> . . . . .  | 20 à 50 " |
| — labiata (FLORE, XVIII, 115). . . . .  | 25 à 50 " | — musciferum . . . . .   | 25 à 35 " |
| — — maxima . . . . .  | 35 à 75 " | <b>Cymbidium aloifolium</b> . . . . .  | 10 à 15 " |
| — — Mendeli . . . . .   | 30 à 50 " | — eburneum . . . . .   | 150 "     |
| — — Rœzli . . . . .   | 30 à 50 " | — giganteum . . . . .  | 25 à 50 " |
| — — Warneri . . . . .   | 35 à 50 " | — grandiflorum . . . . .   | 10 à 15 " |
| Les <i>Cattleya labiata</i> , <i>Mossiae</i> et leurs variétés sont les plus magnifiques des Orchidées par la grandeur et le coloris de leurs fleurs; il serait bien difficile d'en trouver deux de la même nuance. |           | — Mastersi . . . . .   | 25 à 50 " |
| — Leopoldi (FLORE, XIV, 209). . . . .   | 15 à 30 " | — pendulum . . . . .   | " "       |
| — Lindleyana . . . . .  | 15 à 25 " | — tigrinum . . . . .   | 25 à 35 " |
| — lobata ( <i>Lælia Boothiana</i> ) . . . . .   | 20 à 35 " | <b>Cypripedium Argus</b> . . . . .   | 50 à 75 " |
| — Loddigesii . . . . .  | 15 à 25 " | — barbatum (FLORE, III, 190). . . . .  | 2 à 5 "   |
| — Luddemanniana . . . . .   | 20 à 30 " | — — biflorum . . . . .   | 10 à 15 " |
| — maxima . . . . .  | 20 à 35 " | — — Crossi . . . . .   | 15 à 25 " |
| — Mendeli . . . . .   | 35 à 50 " | — — grandiflorum . . . . .   | 10 à 25 " |
| — Mossiae . . . . .   | 15 à 25 " | (FLORE, XVIII, 91.)  |           |
| — — aurantiaca . . . . .  | 20 à 30 " | — — superbum . . . . .   | 10 à 15 " |
| — — maxima . . . . .  | 20 à 30 " | Ces deux derniers <i>Cypripedium</i> sont les plus beaux du genre et d'une culture très-facile.        |           |
| — — pallida . . . . .   | 20 à 25 " | — Bullenianum . . . . .  | 15 à 25 " |
| — — superba . . . . .   | 20 à 30 " | — caudatum ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .   | 20 à 50 " |
|   |           | (FLORE, IV, 99 et 100.)  |           |
|   |           | — — roseum . . . . .   | 25 à 50 " |



|  | Fr. C.      |
|--|-------------|
| <i>Cypripedium concolor</i> . . . . .  | 20 à 30 "   |
| — Dauthieri . . . . .  | 75 à 100 "  |
| — Dayanum (FLORE, XV, 55) . . . . .  | 25 à 40 "   |
| Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.   |             |
| — Dominicanum ( <i>Selenipedium</i> ). . . . .   | 30 à 50 "   |
| — Druryi . . . . .   | " "         |
| — Fairieanum (FLORE, XII, 119) . . . . .   | 25 à 35 "   |
| — Harrisianum . . . . .  | 30 à 150 "  |
| — hirsutissimum . . . . .  | 20 à 35 "   |
| (FLORE, XV, 97.)   |             |
| — Hookeri (FLORE, XV, 125) . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — insigne . . . . .  | 2 à 5 "     |
| — — Chantini . . . . .   | 25 à 50 "   |
| — Maulei (FLORE, XV, 123) . . . . .  | 5 à 15 "    |
| Magnifique variété du <i>C. insigne</i> ; le sépal supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.  |             |
| — irapeanum (FLORE III, 186) . . . . .   | 40 à 60 "   |
| — javanicum (FLORE, VII, 165) . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — lævigatum . . . . .  | 100 à 300 " |
| (FLORE, XVII, 83.)   |             |
| — longifolium ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — Lowi (FLORE, IV, 375) . . . . .  | 25 à 50 "   |
| — niveum . . . . .   | 25 à 40 "   |
| — Parishii . . . . .   | 30 à 50 "   |
| — Pearcei ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .  | 10 à 25 "   |
| (FLORE, XVI, 73.)  |             |
| — purpuratum (FLORE, XI, 173) . . . . .  | 20 à 30 "   |
| — Reichenbachii ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — Rœzli ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .  | 20 à 30 "   |
| — Schlumi ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .  | 30 à 50 "   |
| (FLORE, XVIII, 153.)   |             |
| — Stonei (FLORE, XVII, 137) . . . . .  | 20 à 40 "   |
| — superbiens ( <i>Veitchii</i> ) . . . . .   | 25 à 50 "   |
| (FLORE, XIV, 161.)   |             |
| Plante magnifique, très-florifère.   |             |
| — venustum . . . . .   | 5 à 10 "    |
| — villosum (FLORE, XIV, 223) . . . . .   | 15 à 25 "   |
| Les fleurs du <i>C. villosum</i> sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.   |             |
| Les <i>Cypripedium</i> sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc. Les <i>Sabots de Vénus</i> méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur accordent les amateurs; aussi sont-ils ici l'objet d'une de nos cultures favorites. |             |
| <i>Cyrtopodium Andersoni</i> . . . . .   | 25 à 35 "   |
| — tigrinum . . . . .   | 30 à 50 "   |
| <i>Dendrobium aggregatum</i> . . . . .   | 20 à 30 "   |
| — albo-sanguineum . . . . .  | 25 "        |
| (FLORE, VII, 209.)   |             |
| — Bensoniæ . . . . .   | 30 "        |
| — bicolor . . . . .  | 15 "        |
| — cærulescens . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — calameifolium . . . . .  | " "         |
| — Calceolaria . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — Cambridgeanum . . . . .  | 20 à 30 "   |
| — capillipes . . . . .   | 20 à 30 "   |
| — cariniferum . . . . .  | 20 "        |
| — chrysanthum . . . . .  | 10 à 15 "   |

|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| <i>Dendrobium chrysotis</i> . . . . .   | 25 à 35 "  |
| — chrysotoxum . . . . .   | 20 "       |
| — clavatum . . . . .  | 20 à 30 "  |
| — Coelogyne . . . . .   | " "        |
| — crassinodum . . . . .   | 30 à 50 "  |
| — crepidatum . . . . .  | 20 à 30 "  |
| — cretaceum (FLORE, VIII, 187) . . . . .  | 20 "       |
| — crystallinum . . . . .  | 25 à 40 "  |
| — cupreum . . . . .   | 15 à 25 "  |
| — Dalhousianum (FLORE, VII, 147) . . . . .  | 25 "       |
| — Dayanum . . . . .   | 20 à 50 "  |
| — densiflorum . . . . .   | 20 à 125 " |
| (FLORE, XIV, 5.)  |            |
| — Devonianum (FLORE, VII, 1) . . . . .  | 15 à 25 "  |
| Excellente espèce pour culture en panier. Bulbes gracieusement retombants et se garnissant de fleurs.               |            |
| — dixanthum . . . . .   | 20 "       |
| — eburneum . . . . .  | 20 à 30 "  |
| — Falconeri . . . . .   | 20 à 30 "  |
| — Farmeri (FLORE, VII, 267) . . . . .   | 20 à 40 "  |
| — fimbriatum (FLORE, VII, 217) . . . . .  | 10 à 15 "  |
| — — oculatum . . . . .  | 15 à 25 "  |
| — formosum giganteum . . . . .  | 25 à 35 "  |
| (FLORE, XVI, 45.)   |            |
| Un des plus beaux <i>Dendrobium</i> . Fleurs grandes, blanches à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois. |            |
| — Fytchianum . . . . .  | 25 à 35 "  |
| — Gibsoni . . . . .   | 20 à 30 "  |
| — Griffithi . . . . .   | 20 à 35 "  |
| — Guiberti . . . . .  | " "        |
| — Henckeanum . . . . .  | 20 à 30 "  |
| — heterocarpum . . . . .  | 15 à 25 "  |
| — Hilli . . . . .   | 15 à 30 "  |
| — Infundibulum . . . . .  | 20 à 40 "  |
| — japonicum . . . . .   | 10 à 25 "  |
| — Jenkinsi . . . . .  | 10 à 25 "  |
| — Kingianum . . . . .   | 15 à 25 "  |
| — lasioglossum . . . . .  | 20 à 35 "  |
| — linguiforme . . . . .   | 20 à 30 "  |
| — lituiflorum . . . . .   | 20 à 35 "  |
| — Lowi . . . . .  | " "        |
| — luteolum . . . . .  | 25 à 35 "  |
| — Mac Carthiæ . . . . .   | 30 "       |
| — macrophyllum Dayanum . . . . .  | 20 à 35 "  |
| — — giganteum . . . . .   | 20 à 30 "  |
| — moniliforme . . . . .   | 15 à 25 "  |
| — moschatum . . . . .   | 15 à 25 "  |
| — nobile . . . . .  | 10 à 15 "  |
| — — elegans . . . . .   | 20 à 30 "  |
| — — Wallichi . . . . .  | 20 "       |
| Le <i>Dendrobium nobile</i> et ses variétés sont des plus beaux et des plus faciles à cultiver. Floraison en hiver. |            |
| — nodatum (FLORE, XV, 155) . . . . .  | 10 à 20 "  |
| — palpebræ ( <i>Farmeri album bicolor</i> ). . . . .  | 15 à 25 "  |
| — Parishii . . . . .  | 15 à 25 "  |
| — Paxtoni . . . . .   | 15 à 20 "  |
| — Pierardi . . . . .  | 10 "       |
| — — majus . . . . .   | 15 à 20 "  |



|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| <i>Dendrobium primulinum</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>pulchellum</i> . . . . .   | 10 " "      |
| — <i>pycnostachyum</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>rigidum</i> . . . . .  | " " "       |
| — <i>sanguinolentum</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>sculptum</i> . . . . .   | 20 à 30 " " |
| — <i>senile</i> . . . . .   | 25 à 40 " " |
| — <i>speciosum</i> . . . . .  | 20 à 30 " " |
| — <i>Hilli</i> . . . . .  | 25 " "      |
| — <i>sphaëgidoglossum</i> . . . . .   | 20 à 30 " " |
| — <i>taurinum</i> . . . . .   | 20 à 35 " " |
| (FLORE, XVIII, 133.)  |             |
| — <i>thyrsoflorum</i> . . . . .   | 20 à 40 " " |
| — <i>tortile roseum</i> . . . . .   | 20 à 30 " " |
| — <i>transparens</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>tradienium</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>Wallichianum</i> . . . . .   | 20 à 35 " " |
| — <i>Wardi</i> . . . . .  | 40 à 60 " " |
| <i>Dendrochilum filiforme</i> . . . . .   | 20 à 30 " " |
| — <i>glumaceum</i> . . . . .  | 20 à 30 " " |
| — <i>longifolium</i> . . . . .  | 25 " "      |
| <i>Disa grandiflora</i> (FLORE, II, 160.) . . . . .   | 10 à 25 " " |
| — <i>Herschelli</i> . . . . .   | 25 " "      |
| <i>Duboisia Raymondi</i> . . . . .  | 15 à 30 " " |
| <i>Epidendrum alatum</i> . . . . .  | 10 à 20 " " |
| — <i>ambiguum</i> . . . . .   | 10 à 20 " " |
| — <i>aromaticum</i> . . . . .   | 10 à 20 " " |
| — <i>atropurpureum</i> ( <i>macrochilum roseum</i> ) (FLORE, IV, 372) . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>album</i> ( <i>macrochilum album</i> ) . . . . .   | 25 " "      |
| (FLORE, XXII.)  |             |
| — <i>aurantiacum</i> . . . . .  | 15 " "      |
| — <i>bicornutum</i> . . . . .   | 25 à 50 " " |
| Excellente Orchidée à grandes fleurs blanches de longue durée, rappelant beaucoup celles du <i>Phalaenopsis grandiflora</i> . |             |
| — <i>campylostalix</i> . . . . .  | 25 " "      |
| — <i>ciliare</i> . . . . .  | 10 à 15 " " |
| — <i>cochleatum</i> . . . . .   | 10 à 15 " " |
| — <i>majus</i> . . . . .  | 30 " "      |
| — <i>Clowesi</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>conspicuum</i> . . . . .   | 10 à 15 " " |
| — <i>dichromum</i> . . . . .  | 10 " "      |
| — <i>diffusum</i> . . . . .   | 10 à 15 " " |
| — <i>erubescens</i> . . . . .   | 30 à 50 " " |
| — <i>falcatum</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>fragrans</i> . . . . .   | 10 " "      |
| — <i>Frederici-Guillielmi</i> . . . . .   | 30 à 50 " " |
| — <i>glumaceum</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>Imperator</i> . . . . .  | 150 " "     |
| — <i>lactiferum</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>lancifolium</i> . . . . .  | " " "       |
| — <i>leopardinum</i> . . . . .  | 25 à 40 " " |
| — <i>macrochilum roseum</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>nutans</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>odoratissimum</i> . . . . .  | 15 à 25 " " |
| — <i>Parkinsoni</i> . . . . .   | 10 à 15 " " |
| — <i>pentotes</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| — <i>prismatocarpum</i> . . . . .   | 15 à 25 " " |
| (FLORE, XXII.)  |             |

|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| <i>Epidendrum rhizophorum</i> . . . . . | 10 " "      |
| — <i>Ruckeri</i> . . . . .              | 15 à 30 " " |
| — <i>Sceptrum</i> . . . . .             | 25 à 35 " " |
| — <i>Stamfordianum</i> . . . . .        | 25 à 50 " " |
| — <i>stenopetalum</i> . . . . .         | 15 " "      |
| — <i>vitellinum majus</i> . . . . .     | 15 à 25 " " |

(FLORE, X, 153.)

Très-florifère; fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles de la variété ordinaire.

|  |             |
|--|-------------|
| — <i>xanthinum</i> . . . . .                             | 25 " "      |
| <i>Eria odorata</i> . . . . .                            | 10 " "      |
| <i>Eriopsis rutidobulbon</i> ( <i>biloba</i> ) . . . . . | 25 " "      |
| <i>Eulophia macrostachya</i> . . . . .                   | 20 à 30 " " |
| <i>Gongora aurea purpurea</i> . . . . .                  | 10 à 15 " " |
| — <i>macrantha</i> . . . . .                             | 15 à 20 " " |
| — <i>maculata</i> . . . . .                              | 15 à 25 " " |
| — <i>portentosa</i> . . . . .                            | 15 à 25 " " |
| <i>Goodyera discolor</i> . . . . .                       | 5 à 10 " "  |
| <i>Grammatophyllum multiflorum</i> . . . . .             | 30 " "      |
| — <i>speciosum, fort</i> . . . . .                       | 150 " "     |

(FLORE, XIII, 177.)

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Helcia sanguinolenta</i> . . . . .       | 15 à 30 " " |
| <i>Houlletia Brocklehurstiana</i> . . . . . | 15 à 25 " " |

Très-bonne espèce du Brésil, très-florifère et d'une culture facile.

|  |             |
|--|-------------|
| — <i>Lowi</i> . . . . .                            | 25 " "      |
| — <i>odoratissima</i> . . . . .                    | 20 " "      |
| — <i>tigrina</i> . . . . .                         | 20 à 35 " " |
| <i>Ionopsis paniculata</i> (FLORE, XXII) . . . . . | 25 " "      |
| <i>Isochilus graminifolius</i> . . . . .           | 15 à 25 " " |
| <i>Kefersteinia graminea</i> . . . . .             | 15 " "      |
| — <i>leucantha</i> . . . . .                       | 35 à 50 " " |
| — <i>sanguinolenta</i> . . . . .                   | " " "       |
| <i>Lacæna bicolor</i> . . . . .                    | 25 " "      |

*Lælia* (voir aussi sous *Cattleya*).

|   |             |
|---|-------------|
| — <i>acuminata</i> (FLORE, I, 51) . . . . . | 15 " "      |
| — <i>albida</i> . . . . .                   | 15 " "      |
| — <i>anceps</i> . . . . .                   | 20 " "      |
| — <i>Barkeriana</i> . . . . .               | 15 à 30 " " |
| (FLORE, XI, 51.)                            |             |
| — <i>autumnalis</i> . . . . .               | 15 à 25 " " |

Un des meilleurs *Lælia* du Mexique.

|   |              |
|---|--------------|
| — <i>Boothiana</i> ( <i>Cattleya lobata</i> ) . . . . . | 25 à 35 " "  |
| — <i>cinnabarina</i> . . . . .                          | 20 à 35 " "  |
| — <i>crispa</i> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .           | 15 " "       |
| — <i>crispilabia</i> ( <i>Lawrenceana</i> ) . . . . .   | 20 à 30 " "  |
| — <i>elegans</i> . . . . .                              | 50 à 100 " " |
| — <i>erubescens</i> . . . . .                           | 15 " "       |
| — <i>euspatha</i> . . . . .                             | 50 à 75 " "  |
| — <i>flava</i> . . . . .                                | 20 à 30 " "  |
| — <i>furfuracea</i> . . . . .                           | 25 " "       |
| — <i>grandis</i> (FLORE, VII, 238) . . . . .            | 30 à 50 " "  |
| — <i>irrorata</i> . . . . .                             | 35 à 50 " "  |
| — <i>majalis</i> . . . . .                              | 15 à 25 " "  |
| — <i>Nelisi</i> . . . . .                               | 35 à 50 " "  |
| — <i>Perrini</i> . . . . .                              | 15 à 25 " "  |

Très-belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.

|   |         |
|---|---------|
| — <i>Pilcheri</i> . . . . .                     | 300 " " |
| — <i>præstans</i> (FLORE, XVIII, 127) . . . . . | 25 " "  |



|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| <i>Lælia præstans carminea</i> . . . . .  | 50 "      |
| — <i>purpurata</i> . . . . .  | 15 à 30 " |
| (FLORE, XI, 133.)   |           |
| Magnifique Orchidée qui varie en couleurs presque autant que le <i>Cattleya labiata</i> . |           |
| — <i>Schilleriana splendens</i> . . . . .   | 50 à 75 " |
| — <i>Stelzneriana</i> . . . . .   | 40 à 75 " |
| — <i>superbiens</i> (FLORE, XI, 209). . . . .   | 15 à 50 " |
| — <i>xanthina</i> . . . . .   | 15 à 30 " |
| <i>Leptotes bicolor</i> . . . . .   | 15 "      |
| <i>Limatodes rosea</i> . . . . .  | 15 "      |
| — — <i>superba</i> . . . . .  | 20 "      |
| <i>Lycaste aromatica</i> . . . . .  | 10 à 15 " |
| — <i>aurantiaca</i> . . . . .   | 10 à 15 " |
| — <i>balsamea</i> . . . . .   | 10 à 25 " |
| — <i>Barringtoniæ</i> . . . . .   | 15 "      |
| — <i>candida</i> . . . . .  | 15 à 25 " |
| — <i>costata</i> . . . . .  | 15 à 30 " |
| — <i>cruenta</i> . . . . .  | 15 "      |
| — <i>Depeei</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>flavescens</i> . . . . .   | 15 à 20 " |
| — <i>gigantea</i> . . . . .   | 15 à 30 " |
| — <i>Harrisoni</i> . . . . .  | 10 à 15 " |
| — <i>lanipes</i> . . . . .  | 20 "      |
| — <i>macrobulbon</i> . . . . .  | 15 à 25 " |
| — <i>macrophylla</i> . . . . .  | 20 "      |
| — <i>mesochleana</i> . . . . .  | 15 à 25 " |
| — <i>Skinneri</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — — <i>alba</i> . . . . .   | 15 à 30 " |
| — — <i>magnifica</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — — <i>picta</i> . . . . .  | 20 à 35 " |
| — — <i>purpurata</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — — <i>superba</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — <i>xytriophora</i> . . . . .  | 15 à 25 " |
| <i>Masdevallia amabilis</i> . . . . .   | 25 "      |
| — <i>Benedicti</i> . . . . .  | 20 à 35 " |
| — <i>Bruchmülleri</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>caudata</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — <i>Chimæra</i> . . . . .  | " "       |
| — <i>civilis</i> . . . . .  | 15 à 30 " |
| — <i>coccinea</i> . . . . .   | 35 à 50 " |
| — <i>coriacea</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>cucullata</i> . . . . .  | 20 à 25 " |
| — <i>elephanticeps</i> (FLORE, X, 77) . . . . .   | 150 "     |
| — <i>fenestrata</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>Gorgona</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — <i>Harryana</i> (FLORE, XXI, 155) . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>igneæ</i> . . . . .  | 20 à 30 " |
| — <i>infracta</i> . . . . .   | 15 "      |
| — <i>Lindeni</i> . . . . .  | 30 à 50 " |
| — <i>macrura</i> . . . . .  | " "       |
| — <i>maculata</i> . . . . .   | 35 à 50 " |
| — <i>melanopoda</i> . . . . .   | 20 à 30 " |
| — <i>Nycterina</i> . . . . .  | 30 à 50 " |
| — <i>ochthodes</i> . . . . .  | 10 à 25 " |
| — <i>Peristeria</i> (FLORE, XXI). . . . .   | 20 à 35 " |
| — <i>polysticta</i> . . . . .   | 25 à 50 " |
| — <i>tovarensis (candida)</i> . . . . .   | 100 "     |

|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| <i>Masdevallia Trochilus</i> . . . . . | " "       |
| — <i>Veitchiana</i> . . . . .          | 50 à 75 " |
| (FLORE, XVII, 155.)                    |           |

Les *Masdevallia* habitent les forêts humides des montagnes de l'Amérique intertropicale, notamment du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. Ce sont des Orchidées de petite ou moyenne taille, sans bulbes, mais à feuilles épaisses pour contenir la vitalité pendant la saison sèche. Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — blanc chez le *tovarensis*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*igneæ* et le *Veitchi*, — ou bien tigrées ou ponctuées comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

|  |           |
|--|-----------|
| — <i>Wagneriana</i> . . . . .          | 30 à 50 " |
| <i>Maxillaria anatomorum</i> . . . . . | 15 à 25 " |
| — <i>angustifolia</i> . . . . .        | 10 "      |
| — <i>grandiflora</i> . . . . .         | 10 à 25 " |
| — <i>Harrisoniæ</i> . . . . .          | 10 "      |
| — <i>leptosepala</i> . . . . .         | 10 à 15 " |
| — <i>luteo-alba</i> . . . . .          | 15 à 25 " |
| — <i>Macleani</i> . . . . .            | 15 à 20 " |
| — <i>nigrescens</i> . . . . .          | 10 à 15 " |
| — <i>picta</i> . . . . .               | 10 "      |
| — <i>tenuifolia</i> . . . . .          | 10 "      |
| — <i>venusta superba</i> . . . . .     | 15 à 25 " |

Grande fleur blanche à odeur suave.

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Mesospinidium sanguineum</i> . . . . . | 15 à 25 " |
| Fleurs d'un beau rouge vif.               |           |
| — <i>vulcanicum</i> . . . . .             | 25 "      |
| <i>Miltonia anceps</i> . . . . .          | 15 à 25 " |
| — <i>bicolor</i> . . . . .                | 10 "      |
| — <i>candida</i> . . . . .                | 20 à 30 " |
| — <i>Clowesi</i> . . . . .                | 15 à 25 " |

Très-belles fleurs tricolores.

|   |           |
|---|-----------|
| — <i>cuneata</i> . . . . .                          | 35 à 50 " |
| — <i>festiva</i> . . . . .                          | 35 à 50 " |
| — <i>flavescens</i> . . . . .                       | 10 "      |
| — <i>radiata</i> . . . . .                          | 20 à 35 " |
| — <i>Regnelli (cereola)</i> . . . . .               | 30 à 50 " |
| — <i>spectabilis</i> . . . . .                      | 10 à 20 " |
| — — <i>Moreliana</i> . . . . .                      | 20 à 35 " |
| — — <i>rosea</i> (FLORE, X, 105) . . . . .          | 25 à 50 " |
| — <i>virginalis</i> . . . . .                       | 15 à 25 " |
| — <i>Warszewiczii (Oncidium fuscatum)</i> . . . . . | 25 à 50 " |

(FLORE, XVIII, 23)

Fleurs grandes, magnifiques; voyez-en le portrait dans la FLORE.

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Nanodes Medusæ</i> (FLORE, XVII, 99). . . . . | " "         |
| <i>Nasonia punctata</i> . . . . .                | 20 à 30 "   |
| <i>Neottia maculata</i> . . . . .                | 15 "        |
| — <i>speciosa</i> . . . . .                      | 15 "        |
| <i>Odontoglossum Andersoni</i> . . . . .         | 100 à 150 " |
| — <i>angustatum</i> . . . . .                    | 100 à 150 " |
| — <i>bictoniense</i> (FLORE, XV, 3) . . . . .    | 15 à 20 "   |
| — <i>Blunti (Alexandra)</i> . . . . .            | 20 à 50 "   |
| (FLORE, XVI, 81.)                                |             |

Grandes fleurs blanches, plus ou moins mouchetées de carmin.

|   |           |
|---|-----------|
| — <i>Cervantesi</i> . . . . .               | 15 à 25 " |
| — <i>citrosimum</i> . . . . .               | 15 à 25 " |
| — — <i>roseum</i> (FLORE, VI, 307). . . . . | 25 "      |



|  | Fr. C.       |
|--|--------------|
| <i>Odontoglossum constrictum</i> . . . | 20 à 30 " n  |
| — <i>cordatum</i> (FLORE, XXII) . . .  | 15 à 25 " n  |
| — <i>coronarium</i> . . . . .          | 75 à 100 " n |
| — <i>cristatum</i> . . . . .           | 20 " n       |
| — <i>crocatum</i> . . . . .            | 35 à 60 " n  |
| — <i>crocidipterum</i> . . . . .       | 50 " n       |
| — <i>densiflorum</i> . . . . .         | 20 à 30 " n  |
| — <i>distans</i> . . . . .             | 25 à 50 " n  |

|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| <i>Odontoglossum Egertoni</i> . . . . .   | 15 " n      |
| — <i>Ehrenbergi</i> . . . . .   | 10 à 15 " n |
| (FLORE, VIII, 263.)   |             |
| Coquette espèce mexicaine très-florifère, à labelle blanc pur.  |             |
| — <i>gloriosum</i> . . . . .  | 20 à 35 " n |
| — <i>grande</i> (FLORE, I, 25) . . . . .  | 10 à 25 " n |
| La plus grande fleur du genre; l'une des meilleures Orchidées connues, magnifique et facile à cultiver, |             |



ODONTOGLOSSUM BLUNTLI. — 20 à 50 francs.



|  | Fr. C.      |
|--|-------------|
| <b>Odontoglossum Halli</b> . . . . .                                   | 50 à 75 "   |
| — <i>hastatum</i> . . . . .  | 15 "        |
| — <i>hastilabium</i> . . . . .   | 25 "        |
| — <i>Insleayi</i> (FLORE, I, 243). . . . .                             | 15 à 25 "   |
| Genre de l' <i>Odontoglossum grande</i> et d'une culture aussi facile. |             |
| — <i>Krameri</i> . . . . .   | 30 à 40 "   |
| — <i>lave</i> . . . . .  | 20 à 35 "   |
| — <i>Lindeni</i> . . . . .   | 30 "        |
| — <i>Lindleyanum</i> . . . . .   | 15 à 30 "   |
| — <i>luteo-purpureum</i> . . . . .                                     | 20 à 35 "   |
| — <i>maculatum</i> . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>maxillare</i> . . . . .   | 50 "        |
| — <i>membraceum</i> . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — <i>naevium majus</i> . . . . .                                       | 50 à 75 "   |
| (FLORE, VI, 191.)  |             |
| — <i>nebulosum</i> . . . . .   | 25 "        |
| — <i>nevadense</i> . . . . .   | 150 à 200 " |
| — <i>odoratum</i> . . . . .  | 25 à 50 "   |

|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| <b>Odontoglossum pardinum</b> . . . . .        | 50 à 75 " |
| — <i>Pescatorei</i> (FLORE, XVI, 23). . . . .  | 25 à 75 " |
| Fleurs blanches en hiver.                      |           |
| — <i>Phalaenopsis</i> (FLORE, XXII). . . . .   | 25 à 50 " |
| Magnifique fleur de couleurs tendres.          |           |
| — <i>platyodon</i> . . . . .                   | 20 à 30 " |
| — <i>prasinum</i> . . . . .                    | 25 à 35 " |
| — <i>pulchellum grandiflorum</i> . . . . .     | 15 à 30 " |
| — <i>radiatum</i> . . . . .                    | 25 "      |
| — <i>ramosissimum</i> . . . . .                | 50 à 75 " |
| — <i>recurvum</i> ( <i>Gomezia</i> ) . . . . . | 15 à 25 " |
| — <i>Reichenheimi</i> . . . . .                | 35 à 50 " |
| — <i>Roezli</i> . . . . .                      | 30 à 50 " |
| — <i>Rossi majus</i> (FLORE, XXI, 95). . . . . | 30 "      |
| — <i>roseum</i> . . . . .                      | 40 à 60 " |
| — <i>Sceptrum</i> . . . . .                    | 30 à 50 " |
| — <i>Schlieperianum</i> . . . . .              | 20 à 35 " |
| — <i>spathaceum</i> . . . . .                  | 50 à 75 " |



ODONTOGLOSSUM PHALÉNOPSIS. — 25 à 50 francs.



|  | Fr. C.      |
|--|-------------|
| <i>Odontoglossum spilotanthum</i> . . . . .                      | " "         |
| — <i>stenochilum</i> . . . . .                                   | 100 à 150 " |
| — <i>tripudians</i> . . . . .                                    | 25 "        |
| — <i>triumphans</i> . . . . .                                    | 25 à 50 "   |
| Bel <i>Odontoglossum</i> à fleurs jaune d'or, tachées de bronze. |             |
| — <i>ulopterum</i> . . . . .                                     | " "         |
| — <i>Uroskinneri</i> . . . . .                                   | 15 à 75 "   |
| Bonne plante, très-florifère.                                    |             |
| — <i>vexillarium</i> . . . . .                                   | 150 à 300 " |

La plus magnifique des Orchidées introduites dans ces derniers temps ! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre. L'introduction de son pays natal est des plus difficiles ; mais sa culture est très-aisée, et une petite plante peut donner deux hampes (FLORE, XX, 27).

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| — <i>Wallisi</i> . . . . .          | 75 à 100 " |
| <i>Oncidium abortivum</i> . . . . . | 15 "       |
| — <i>altissimum</i> . . . . .       | 10 à 25 "  |
| — <i>ampliatum majus</i> . . . . .  | 20 à 35 "  |
| (FLORE, XX, 147.)                   |            |
| — <i>andigenum</i> . . . . .        | 20 à 30 "  |
| — <i>anomalum</i> . . . . .         | 15 "       |
| — <i>aurosum</i> . . . . .          | 20 à 35 "  |

Jaune d'or ; très-florifère.

|  |           |
|--|-----------|
| — <i>barbatum</i> . . . . .                      | 15 "      |
| — <i>Batemanianum (gallopavinum)</i> . . . . .   | 15 à 30 " |
| — <i>Baueri</i> . . . . .                        | 20 à 30 " |
| — <i>bicallosum</i> . . . . .                    | 15 à 25 " |
| — <i>bifolium majus</i> . . . . .                | 20 à 30 " |
| — <i>calanthum</i> . . . . .                     | 20 à 30 " |
| — <i>cariniferum</i> . . . . .                   | 15 "      |
| — <i>carthaginense</i> . . . . .                 | 15 à 25 " |
| — <i>Cavendishianum (pachyphyllum)</i> . . . . . | 20 à 30 " |
| — <i>Cebolleta (juncifolium)</i> . . . . .       | 10 "      |
| — <i>cerebriferum</i> . . . . .                  | 25 à 35 " |
| — <i>crispum</i> . . . . .                       | 15 "      |
| — <i>cucullatum</i> . . . . .                    | 20 à 35 " |

(FLORE, VIII, 235.)

Fleurs très-belles, très-variées de couleurs.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| — <i>deltoideum</i> . . . . .   | 25 à 35 " |
| — <i>densiflorum</i> . . . . .  | 20 à 35 " |
| — <i>divaricatum</i> . . . . .  | 15 à 25 " |
| — <i>exasperatum</i> . . . . .  | 20 à 35 " |
| — <i>excavatum</i> . . . . .    | 20 à 35 " |
| — <i>falcipetalum</i> . . . . . | 30 à 50 " |
| — <i>flexuosum</i> . . . . .    | 10 à 30 " |

Jaune d'or ; très-florifère.

|  |           |
|--|-----------|
| — <i>fuscatum (FLORE, XVIII, 23)</i> . . . . . | 25 à 50 " |
| — <i>gyrobulbon</i> . . . . .                  | 25 "      |
| — <i>Harrisoni</i> . . . . .                   | 15 "      |
| — <i>Hartwegi</i> . . . . .                    | 20 à 30 " |
| — <i>hastiferum</i> . . . . .                  | " "       |
| — <i>heteranthum</i> . . . . .                 | 20 à 35 " |
| — <i>hians</i> . . . . .                       | 15 "      |
| — <i>janeirense</i> . . . . .                  | 15 "      |
| — <i>Kramerianum</i> . . . . .                 | 20 à 30 " |

(FLORE, XIX, 41.)

Genre de l'*Oncidium Papilio*, mais de couleurs plus brillantes.

|                                     | Fr. C.    |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Oncidium Lanceanum</i> . . . . . | 20 à 30 " |
| (FLORE, XVIII, 37.)                 |           |
| — <i>leopardinum</i> . . . . .      | 20 à 30 " |
| — <i>leucochilum</i> . . . . .      | 15 "      |
| — <i>Limminghei</i> . . . . .       | 10 à 25 " |
| (FLORE, XVIII, 15.)                 |           |
| — <i>longipes</i> . . . . .         | 15 à 25 " |
| — <i>luridum</i> . . . . .          | 20 à 30 " |
| — <i>macranthum</i> . . . . .       | 40 à 75 " |
| — <i>micropogon</i> . . . . .       | 15 "      |
| — <i>murinum</i> . . . . .          | 15 à 25 " |
| — <i>nubigenum</i> . . . . .        | 20 à 35 " |
| — <i>ornithorrhynchum</i> . . . . . | 15 à 25 " |
| — <i>oxyacanthosmum</i> . . . . .   | 15 à 25 " |
| — <i>Papilio majus</i> . . . . .    | 10 à 15 " |

(FLORE, IX, 165.)

|   |             |
|---|-------------|
| — <i>pardothyrsus</i> . . . . .         | 20 à 30 "   |
| — <i>Philipsianum</i> . . . . .         | 15 "        |
| — <i>phymatochilum</i> . . . . .        | 20 "        |
| — <i>planilabre</i> . . . . .           | 25 à 35 "   |
| — <i>pubes</i> . . . . .                | 10 "        |
| — <i>pulvinatum (Sciurus)</i> . . . . . | 15 "        |
| — <i>pumilum</i> . . . . .              | 15 "        |
| — <i>sarcodes</i> . . . . .             | 50 "        |
| — <i>Schillerianum</i> . . . . .        | 20 à 35 "   |
| — <i>sculptum</i> . . . . .             | 30 à 50 "   |
| — <i>Semele</i> . . . . .               | 20 à 30 "   |
| — <i>serratum</i> . . . . .             | 25 à 75 "   |
| — <i>sphacelatum</i> . . . . .          | 10 à 35 "   |
| — <i>splendidum</i> . . . . .           | 150 à 200 " |

(FLORE, XVIII, 11.)

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| — <i>Sprucei</i> . . . . .            | 20 à 35 " |
| — <i>stramineum</i> . . . . .         | 15 à 25 " |
| — <i>superbiens Enaoi</i> . . . . .   | 35 à 60 " |
| — <i>tigrinum (Barkeri)</i> . . . . . | 25 à 40 " |

Le plus beau des *Oncidium*. Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| — <i>trulliferum</i> . . . . . | 15 à 25 " |
| — <i>Uncia</i> . . . . .       | 10 "      |

Très-florifère.

|  |           |
|--|-----------|
| — <i>uniflorum</i> . . . . .               | 15 à 25 " |
| — <i>Wentworthianum</i> . . . . .          | 15 "      |
| — <i>xanthodon (FLORE, XXII)</i> . . . . . | 25 à 35 " |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Palumbina candida</i> . . . . . | 20 à 50 " |
|------------------------------------|-----------|

|   |      |
|---|------|
| <i>Paphinia cristata (FLORE, IV, 335)</i> . . . . . | 50 " |
|---|------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Peristeria elata</i> . . . . . | 15 à 25 " |
|-----------------------------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| — <i>Lowi</i> . . . . . | 25 " |
|-------------------------|------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| — <i>pendula</i> . . . . . | 15 à 25 " |
|----------------------------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Pescatorea Bruchmülleri</i> . . . . . | 40 à 60 " |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| — <i>cerina (FLORE, XVII, 177)</i> . . . . . | 40 à 60 " |
|--|-----------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| — <i>violacea</i> . . . . . | 75 à 100 " |
|-----------------------------|------------|

|   |     |
|---|-----|
| — <i>Wallisi (FLORE, XVIII, 17)</i> . . . . . | " " |
|---|-----|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <i>Phajus grandifolius</i> . . . . . | 5 à 15 " |
|--------------------------------------|----------|

Magnifique hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs ; culture très-facile.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| — <i>maculatus</i> . . . . . | 15 " |
|------------------------------|------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| — <i>Wallichi</i> . . . . . | 20 à 50 " |
|-----------------------------|-----------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| — <i>Woodfordi</i> . . . . . | 10 à 15 " |
|------------------------------|-----------|





ONCIDIUM FUSCATUM. — 25 à 50 francs.



|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| <b>Phalaenopsis amabilis</b> . . . . .      | 60 à 100 " |
| (FLORE, I, 201.)                            |            |
| — <i>Cornu cervi</i> . . . . .              | 50 à 75 "  |
| — <i>equestris (rosea)</i> . . . . .        | 75 "       |
| — <i>grandiflora</i> . . . . .              | 20 à 40 "  |
| — <i>Lowi</i> (FLORE, XVIII, 143) . . . . . | " "        |
| — <i>Luddemanniana</i> . . . . .            | 40 à 75 "  |
| (FLORE, XV, 53.)                            |            |
| — <i>rosea</i> . . . . .                    | 75 "       |
| — <i>Schilleriana</i> . . . . .             | 75 à 100 " |
| (FLORE, XVI, 115.)                          |            |

Les *Phalaenopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs), et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Pholidota imbricata</b> . . . . . | 10 "      |
| <b>Pilumna nobilis</b> . . . . .     | 15 à 30 " |
| <b>Pleione Hookeriana</b> . . . . .  | " "       |
| — <i>humilis</i> . . . . .           | 25 "      |
| — <i>lagenaria</i> . . . . .         | 15 à 25 " |
| — <i>maculata</i> . . . . .          | 25 "      |
| — <i>Reichenbachiana</i> . . . . .   | 20 à 50 " |
| — <i>Schilleriana</i> . . . . .      | 25 "      |
| — <i>Wallichiana</i> . . . . .       | 15 à 25 " |

Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grands fleurs. Ils sont originaires de l'Himalaya. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Polycycnis lepida</b> . . . . .                 | 25 "      |
| — <i>muscifera</i> . . . . .                       | 15 "      |
| <b>Promenæa stapelioides</b> . . . . .             | 20 à 35 " |
| — <i>xanthina</i> . . . . .                        | 30 à 40 " |
| <b>Renanthera coccinea</b> (FLORE, XXII) . . . . . | 15 "      |
| — <i>Lowi (Vanda Lowi)</i> . . . . .               | 200 "     |

|   |             |
|---|-------------|
| (FLORE, XXI, 163.)                              |             |
| <b>Restrepia antennifera</b> . . . . .          | 25 à 60 "   |
| — <i>elegans</i> (FLORE, VII, 271) . . . . .    | 30 à 50 "   |
| <b>Saccolabium ampullaceum</b> . . . . .        | 25 "        |
| — <i>Blumei majus</i> . . . . .                 | 50 à 100 "  |
| — <i>calcaratum</i> . . . . .                   | 20 à 35 "   |
| — <i>calceolare</i> . . . . .                   | 35 à 50 "   |
| — <i>curvifolium</i> . . . . .                  | 25 à 50 "   |
| — <i>furcatum</i> . . . . .                     | 150 à 200 " |
| — <i>giganteum (Vanda densiflora)</i> . . . . . | 20 à 50 "   |
| (FLORE, XVII, 89.)                              |             |

Magnifique !

|   |            |
|---|------------|
| — <i>guttatum</i> . . . . .                     | 50 à 100 " |
| — <i>præmorsum</i> . . . . .                    | 50 à 100 " |
| — <i>retusum</i> (FLORE, XIV, 109) . . . . .    | 35 à 50 "  |
| — <i>trichromum</i> . . . . .                   | 20 à 35 "  |
| — <i>violaceum</i> . . . . .                    | 25 "       |
| — <i>Harrisonianum</i> . . . . .                | 25 "       |
| — <i>zeylanicum</i> . . . . .                   | 50 à 75 "  |
| <b>Sarcopodium Lobbi</b> . . . . .              | 10 à 15 "  |
| <b>Schomburgkia crispa</b> . . . . .            | 15 "       |
| — <i>undulata</i> . . . . .                     | 15 "       |
| <b>Scuticaria Steeli</b> . . . . .              | 25 à 50 "  |
| <b>Selenipedium</b> , voir <i>Cypripedium</i> . |            |
| <b>Sigmatostalix radicans</b> . . . . .         | 10 à 20 "  |
| <b>Sobralia macrantha</b> . . . . .             | 20 à 35 "  |
| (FLORE, VII, 69.)                               |            |
| — <i>virginalis</i> . . . . .                   | 25 "       |

|  | Fr. C.      |
|--|-------------|
| <b>Sophranitis cernua</b> . . . . .  | 10 "        |
| — <i>coccinea</i> (FLORE, XVII, 7) . . . . .   | 10 à 15 "   |
| Port nain, grandes fleurs rouge brillant.  |             |
| — <i>violacea</i> . . . . .  | 15 à 25 "   |
| <b>Stanhopea aurata</b> . . . . .  | 10 à 15 "   |
| — — <i>punctatissima</i> . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>Barkeri Bucephalus</i> . . . . .  | 15 "        |
| — <i>bicolor</i> . . . . .   | 20 "        |
| — <i>Devoniensis</i> (FLORE, X, 117) . . . . .   | 15 "        |
| — <i>eburnea</i> . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>ecornuta</i> (FLORE, II, 181) . . . . .   | 50 "        |
| — <i>expansa</i> . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>grandiflora</i> . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>graveolens</i> (FLORE, II, août 1) . . . . .  | 10 "        |
| — <i>guttata</i> . . . . .   | 10 à 15 "   |
| — <i>insignis</i> . . . . .  | 20 "        |
| — <i>Jenischiana</i> . . . . .   | 15 "        |
| — <i>Lindleyana</i> . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — <i>Martiana bicolor</i> (FLORE, XX, 99) . . . . .  | 40 "        |
| — <i>oculata</i> . . . . .   | 10 à 15 "   |
| — <i>saccata</i> (FLORE, XXII) . . . . .   | 10 "        |
| — <i>tigrina</i> . . . . .   | 10 "        |
| — — <i>superba</i> (FLORE, VII, 191) . . . . .   | 15 à 25 "   |
| — <i>virginalis</i> . . . . .  | 15 "        |
| — <i>Wardi</i> . . . . .   | 10 "        |
| <b>Stenia fimbriata</b> . . . . .  | 20 à 30 "   |
| <b>Thunia alba</b> . . . . .   | 10 à 15 "   |
| — <i>Bensoni</i> . . . . .   | 15 à 20 "   |
| <b>Trichoceros muralis</b> . . . . .   | 20 "        |
| — <i>platyceros</i> . . . . .  | 30 "        |
| <b>Trichopilia coccinea</b> (FLORE, XIV, 261) . . . . .  | 15 "        |
| — <i>crispa marginata</i> . . . . .  | 150 "       |
| (FLORE, XVIII, 167.)   |             |
| — <i>fragrans</i> . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — <i>laxa</i> . . . . .  | 10 à 15 "   |
| — <i>picta</i> . . . . .   | 25 "        |
| — <i>suavis</i> (FLORE, VIII, 20) . . . . .  | 10 à 25 "   |
| — <i>tortilis</i> . . . . .  | 10 à 15 "   |
| Les <i>Trichopilia</i> sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre en dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot. |             |
| <b>Uropedium Lindeni</b> . . . . .   | 30 à 50 "   |
| (FLORE, VI, 123.)  |             |
| <b>Vanda Batemani</b> . . . . .  | 100 à 350 " |
| (FLORE, XVIII, 161.)   |             |
| — <i>Bensoni</i> . . . . .   | 15 à 30 "   |
| — <i>cærulea</i> (FLORE, VI, 239) . . . . .  | 75 à 100 "  |
| — <i>cærulescens</i> . . . . .   | 60 à 100 "  |
| — <i>Cathearti</i> (FLORE, XII, 133) . . . . .   | 100 à 200 " |
| — <i>cristata</i> . . . . .  | 50 "        |
| — <i>Denisoniana</i> . . . . .   | 75 "        |
| — <i>densiflora</i> (FLORE, XVII, 89) . . . . .  | 20 à 50 "   |
| Port et fleurs magnifiques.  |             |
| — <i>gigantea (Lindleyana)</i> (FLORE) . . . . .   | 25 à 200 "  |
| — <i>insignis</i> . . . . .  | " "         |
| — <i>Lowi (Renanthera)</i> . . . . .   | 200 "       |
| (FLORE, XXI, 163.)   |             |
| — <i>Parishi</i> . . . . .   | 125 "       |
| — <i>Roxburghi</i> (FLORE, II, fév. 2) . . . . .   | 25 "        |




|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| <b>Vanda Roxburghi</b> cœrulea. . . . .  | 50 "       |
| — <i>suavis</i> . . . . .  | 35 à 75 "  |
| — <i>teres</i> (FLORE, VI, 330) . . . . .  | 10 à 20 "  |
| — <i>tricolor</i> (FLORE, VI, 329). . . . .  | 25 à 100 " |
| <b>Vanilla aromatica</b> (FLORE, XXII) . . . . .   | 5 "        |
| — <i>planifolia</i> . . . . .  | 5 "        |
| Les fruits de ces deux espèces fournissent la Vanille du commerce. Ce sont des plantes grimpantes, à beau feuillage, et qui fructifient souvent dans les serres. |            |
| <b>Warrea Lindeniana</b> . . . . .   | 25 à 50 "  |
| — <i>tricolor</i> . . . . .  | 25 "       |
| <b>Warscewiczella aromatica</b> . . . . .  | 25 à 35 "  |
| — <i>discolor</i> (FLORE, XXII) . . . . .  | 20 "       |

|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| <b>Warscewiczella velata</b> . . . . .    | 30 "      |
| <b>Zygopetalum crinitum</b> . . . . .     | 20 à 35 " |
| — <i>Mackayi</i> . . . . .                | 10 à 15 " |
| — — <i>compactum</i> . . . . .            | 10 à 15 " |
| — — <i>grandiflorum</i> (FLORE) . . . . . | 20 à 35 " |
| — — — <i>superbum</i> . . . . .           | 25 à 50 " |
| — <i>maxillare</i> . . . . .              | 20 à 30 " |
| — <i>Gautieri</i> . . . . .               | 30 à 50 " |

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

## PALMIERS.

 *N. B.* La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

 Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (+) sont de **SERRE FROIDE**.

|  | Fr. C.       |
|--|--------------|
| 1. <b>Acanthophoenix crinita</b> ( <i>Areca crinita</i> BORY) (FLORE, XVI, 181). . . . .   | 25 "         |
| — <i>très-fort</i> . . . . .   | 300 à 500 "  |
| Bien plus beau de port que le plus gracieux des <i>Thrinax</i> ; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation. |              |
| 3. <b>Acanthorrhiza Warscewiczii</b> . . . . .   | 75 "         |
| 4. <b>Acrocomia lasiospatha</b> , <i>fort.</i> . . . .   | 15 à 100 "   |
| 5. — <i>sclerocarpa</i> . . . . .  | 100 "        |
| 6. <b>Areca alba</b> . . . . .   | 3 "          |
| 7. — <i>aurea</i> (FLORE, XVII, 43) . . . . .  | 3 à 300 "    |
| Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.  |              |
| 277. + — <i>Baueri</i> ( <i>Seaforthia robusta</i> ) . . . . .   | 10 à 50 "    |
| 9. — <i>concinna</i> , <i>fort.</i> . . . .  | 75 "         |
| 1. — <i>crinata</i> BORY, voir <i>Acanthophoenix</i> . . . . .   |              |
| 10. — <i>furfuracea</i> . . . . .  | 10 à 20 "    |
| 382. — <i>gracilis</i> . . . . .   | 10 à 20 "    |
| 12. + — <i>lutescens</i> . . . . .   | 2 à 50 "     |
| 13. — <i>madagascariensis</i> . . . . .  | 3 à 100 "    |
| 14. + — <i>monostachya</i> . . . . .   | 5 "          |
| 236. — <i>nobilis</i> ( <i>Oncosperma Van Houtteanum</i> ), <i>fort.</i> . . . .   | 500 à 1500 " |
| 18. — <i>rubra</i> HORT. (non BORY) . . . . .  | 1 à 250 "    |
| 194. + — <i>sapida</i> (FLORE) . . . . .   | 3 à 30 "     |
| 189. — <i>speciosa</i> ( <i>Hyophorbe amari-caulis</i> ) . . . . .   | 10 à 125 "   |
| 191. — <i>Verschaffeltii</i> ( <i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> ) . . . . .   | 5 à 500 "    |
| 312. <b>Arenga Bonnetii</b> . . . . .  | 50 "         |
| 19. — <i>obtusifolia</i> . . . . .   | 5 à 50 "     |
| 20. — <i>saccharifera</i> . . . . .  | 5 à 300 "    |
| 21. — <i>Westerhoutii</i> . . . . .  | 50 "         |
| 427. — <i>Wightii</i> . . . . .  | 15 "         |

|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| 22. <b>Astrocaryum Aira</b> . . . . .               | 25 "        |
| 431. — <i>argenteum</i> . . . . .                   | 50 "        |
| 432. — <i>filare</i> . . . . .                      | 35 "        |
| 408. — <i>Malibo</i> . . . . .                      | 30 "        |
| 26. + — <i>mexicanum</i> . . . . .                  | 150 à 325 " |
| 42. <b>Attalea spectabilis</b> . . . . .            | 25 "        |
| 409. <b>Bentinckia Rendah</b> . . . . .             | 10 "        |
| 54. + <b>Brahea egregia</b> . . . . .               | 25 "        |
| 57. <b>Calamus adspersus</b> , <i>fort.</i> . . . . | 200 à 500 " |
| 60. — <i>ciliaris</i> . . . . .                     | 50 "        |
| 388. — <i>fasciculatus</i> . . . . .                | 40 "        |
| 262. — <i>Flagellum</i> , <i>fort.</i> . . . .      | 200 "       |
| 62. — <i>Gedah</i> . . . . .                        | 10 à 75 "   |
| 383. — <i>Hystrix</i> . . . . .                     | 10 "        |
| 389. — <i>javanensis</i> . . . . .                  | 25 "        |
| 437. — <i>junghunianus</i> . . . . .                | 50 "        |
| 65. — <i>micranthus</i> . . . . .                   | 25 à 200 "  |
| 67. — <i>niger</i> . . . . .                        | 10 "        |
| 68. — <i>nitidus</i> . . . . .                      | " "         |
| 330. — <i>Oxleyanus</i> . . . . .                   | 10 "        |
| 393. — <i>sumatranus</i> . . . . .                  | 10 "        |
| 342. + <b>Calyptrogyna spicigera</b> . . . . .      | 25 "        |
| 74. <b>Carludovica atrovirens</b> . . . . .         | 8 à 15 "    |
| 76. — <i>humilis</i> . . . . .                      | 25 "        |
| 423. — <i>laciniata</i> . . . . .                   | 20 "        |
| 326. — <i>macropoda</i> . . . . .                   | 15 à 50 "   |
| 78. — <i>microcephala</i> . . . . .                 | 4 à 15 "    |
| 79. — <i>palmata</i> . . . . .                      | 8 à 25 "    |
| 327. — <i>Sartori</i> . . . . .                     | 10 à 25 "   |
| 81. <b>Caryota Cummingi</b> , <i>fort.</i> . . . .  | 200 "       |
| 83. — <i>excelsa</i> , <i>fort.</i> . . . .         | 200 "       |
| 84. — <i>furfuracea</i> . . . . .                   | 5 à 100 "   |
| 85. — <i>javanica</i> . . . . .                     | 50 "        |
| 318. — <i>Rumphii</i> , <i>fort.</i> . . . .        | 1000 "      |
| 88. — <i>sobolifera</i> . . . . .                   | 5 à 100 "   |
| 90. — <i>urens</i> , <i>fort.</i> . . . .           | 3 à 100 "   |



|  | Fr. C.                     |   | Fr. C.  |
|--|----------------------------|---|---|
| 408. <i>Catoblastus præmorsus</i> . . . . .  | 10 "                       | 147. <i>Dæmonorops fissus</i> . . . . .                       | 10 "  |
| 92. <i>Ceroxylon andicola</i> . . . . .  | 25 "                       | 150. — <i>latispinus</i> . . . . .                            | 10 "  |
| 94. — <i>niveum</i> . . . . .  | 15 à 75 "                  | 385. — <i>Lewisianus</i> . . . . .                            | 10 "  |
|  | <i>très-fort</i> . . . . . |   | <i>les douze</i> . . . . .                    |
| 96. † <i>Chamædorea amazonica</i> . . . . .  | 15 à 30 "                  | 152. — <i>melanochaetes</i> . . . . .                         | 10 "  |
| 97. — <i>Arenbergi</i> . . . . .   | 10 à 20 "                  | 430. — <i>palembangensis</i> . . . . .                        | 10 "  |
| 98. — <i>atrovirens</i> . . . . .  | 15 à 50 "                  |   | <i>les douze</i> . . . . .                    |
| 101. † — <i>concolor</i> . . . . .   | 10 à 30 "                  | 154. — <i>periacanthus</i> . . . . .                          | 10 "  |
| 357. — <i>Deckeriana</i> . . . . .   | 10 à 25 "                  | 155. — <i>spectabilis</i> . . . . .                           | 50 à 125 "                                    |
| 102. † — <i>desmoncoides</i> . . . . .   | 10 à 20 "                  | 156. — <i>trichrous</i> . . . . .                             | 10 "  |
| 103. — <i>elator</i> . . . . .   | 10 à 50 "                  |   | <i>les douze</i> . . . . .                    |
| 104. — <i>elegans</i> . . . . .  | .5 à 40 "                  |   | <i>fort</i> . . . . .                         |
|  | (FLORE, XIII, 133.)        | 158. <i>Dekenia nobilis</i> . . . . .                         | .125 "  |
| 374. — <i>elegantissima</i> . . . . .  | 10 "                       | 438. <i>Drymophlaeus paradoxus</i> . . . . .                  | .40 "   |
| 105. — <i>Ernesti-Augusti</i> . . . . .  | 10 à 50 "                  | 390. — <i>Rumphi</i> . . . . .                                | .50 "   |
|  | (FLORE, XIII, 123.)        | 411. <i>Dypsis spec.</i> . . . . .                            | .15 "   |
| 108. — <i>fragens</i> . . . . .  | .50 "                      | 161. <i>Elæis guineensis macrocarpa</i> (FLORE),              |   |
| 343. — <i>geonomæformis</i> . . . . .  | 10 à 20 "                  |   | <i>très-fort</i> . . . . .                    |
| 110. † — <i>glaucofolia</i> . . . . .  | .100 "                     |   | .300 à 500 "                                  |
| 358. — <i>gracilis</i> . . . . .   | .15 "                      | 162. — <i>melanococca</i> . . . . .                           | .5 "  |
| 311. — <i>graminifolia</i> . . . . .   | .40 "                      | 164. <i>Enterpe edulis</i> . . . . .                          | .2 à 75 "                                     |
| 107. — <i>interrupta, fort.</i> . . . . .  | .200 "                     | 242. — <i>Sancona</i> . . . . .                               | 10 à 25 "                                     |
| 111. — <i>Lindeniana</i> . . . . .   | 10 à 25 "                  | 167. <i>Gaussia princeps</i> . . . . .                        | .20 "   |
| 112. † — <i>lunata</i> . . . . .   | 10 à 20 "                  | 216. <i>Geonoma fenestrata</i> ( <i>Malortica</i> ) . . . . . | .20 "   |
| 364. — <i>Martiana</i> . . . . .   | 10 à 20 "                  | 172. — <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .                         | .200 "  |
| 115. — <i>pygmæa</i> . . . . .   | .15 "                      | 416. — <i>gracilis</i> . . . . .                              | .25 "   |
| 116. — <i>Sartori</i> . . . . .  | 10 à 25 "                  | 180. — <i>pumila, fort.</i> . . . . .                         | .200 "  |
| 117. — <i>Schiedeana</i> . . . . .   | 10 à 25 "                  | 181. — <i>Schottiana</i> . . . . .                            | 5 à 150 "                                     |
| 359. — <i>Warscewiczii</i> . . . . .   | 10 à 20 "                  | 378. — <i>Spixiana</i> . . . . .                              | 15 à 30 "                                     |
| 347. — <i>Wendlandi</i> . . . . .  | 10 à 25 "                  | 314. <i>Georgia fibrosa</i> . . . . .                         | .75 "   |
| 120. † <i>Chamærops excelsa</i> . . . . .  | 1 à 500 "                  | 396. <i>Glaziona insignis</i> . . . . .                       | 15 à 30 "                                     |
| 121. † — <i>Fortunei (sinensis)</i> . . . . .                                      | 10 "                       | 187. <i>Guilielma speciosa, fort.</i> . . . . .               | .100 à 150 "                                  |
| 122. † — <i>humilis</i> . . . . .  | 1 à 200 "                  | 297. <i>Harina, voir Wallichia.</i>                           |   |
| 400. † — — <i>nivea</i> . . . . .  | 5 à 1000 "                 | 189. <i>Hyophorbe amaricaulis</i> ( <i>Areca spe-</i>         |   |
| 369. † — — <i>robusta</i> . . . . .  | 5 à 200 "                  |   | <i>ciosa</i> ) (FLORE, XVI, 177), <i>fort</i> |
| 123. † — — <i>tomentosa</i> . . . . .  | 5 à 30 "                   |   | 10 à 125 "                                    |
| 428. † — <i>Hystrix (vrai)</i> . . . . .   | 150 à 1000 "               | 190. — <i>indica, vrai, fort</i> . . . . .                    | 1000 "  |
| 124. † — <i>Martiana</i> . . . . .   | .75 "                      |   | (FLORE, XVI, 105.)                            |
| N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du <i>Chamærops humilis</i> . |                            | 191. — <i>Verschaffelti</i> ( <i>Areca</i> ) (FLORE,          |   |
|  |                            |   | XVI, 171), <i>fort</i> . . . . .              |
| 410. † — <i>Palmetto</i> . . . . .   | .2 "                       |   | 5 à 500 "                                     |
| 394. † — <i>Ritchiana</i> . . . . .  | .15 "                      | 102. <i>Hyospathe chiriquensis</i> . . . . .                  | .40 "   |
| 292. † — <i>stauracantha</i> . . . . .   | 20 à 200 "                 | 227. † <i>Jubæa spectabilis</i> HORT. non                     |   |
| 126. † <i>Cocos australis</i> . . . . .  | .2 "                       |   | HUMB. ( <i>Micrococos</i> ) . . . . .         |
| 131. † — <i>flexuosa</i> . . . . .   | .3 à 15 "                  |   | <i>extra-fort</i> . . . . .                   |
| 133. — <i>Mikaniana</i> . . . . .  | .50 "                      |   | <i>— la couple</i> . . . . .                  |
| 137. † — <i>plumosa</i> . . . . .  | .5 à 25 "                  | 368. † <i>Kentia australis</i> . . . . .                      | 50 à 350 "                                    |
| 375. — <i>Procopæana</i> . . . . .   | .15 "                      | 365. † — <i>Balmorea</i> . . . . .                            | 15 à 100 "                                    |
| 138. — <i>Romanzoffiana</i> . . . . .  | .5 "                       | 367. † — <i>Forsteriana</i> . . . . .                         | 15 à 100 "                                    |
| 139. — <i>schizophylla, très-fort.</i> . . . . .                                   | .200 "                     | 194. † — <i>sapida</i> . . . . .                              | .3 à 30 "                                     |
| 142. — <i>Weddelliana, fort.</i> . . . . .   | 25 à 50 "                  | 195. <i>Korthalsia debilis</i> . . . . .                      | .100 "  |
| 405. <i>Copernicia Wightii</i> . . . . .   | 10 "                       | 198. <i>Latania aurea</i> ( <i>Latania Verschaf-</i>          |   |
| 207. † <i>Corypha australis</i> ( <i>Livistona</i> ) 1 à 50                        |                            |   | <i>felti</i> ) . . . . .                      |
|  | <i>très-fort</i> . . . . . |   | .30 "   |
|  | .100 à 350 "               | 213. † — <i>borbonica</i> ( <i>Livistona sinen-</i>           |   |
| 440. — <i>elata</i> . . . . .  | .10 "                      |   | <i>sis</i> ) . . . . .                        |
| 429. † — <i>filifera</i> . . . . .   | 25 à 50 "                  |   | .1 à 75 "                                     |
| 144. — <i>macrogllossa (spinosa)</i> . . . . .                                     | .5 "                       |   | <i>fort</i> . . . . .                         |
|  | <i>fort</i> . . . . .      |   | .300 à 500 "                                  |
|  | .200 "                     | 199. — <i>Loddigesi (glaucophylla)</i> . . . . .              | .15 "   |
|  |                            | 201. — — <i>Commersoni</i> . . . . .                          | .40 "   |
|  |                            | 202. <i>Licuala amplifrons</i> . . . . .                      | 10 à 20 "                                     |
|  |                            | 203. — <i>elegans, fort.</i> . . . . .                        | 10 à 200 "                                    |



|   | Fr. C.      |   | Fr. C.      |
|---|-------------|---|-------------|
| 204. <i>Licuala peltata</i> . . . . .         | 10 à 25 "   | 209. † <i>Livistona humilis</i> . . . . .     | 3 "         |
| 412. — <i>Rumphi</i> . . . . .                | 10 "        | <i>les douze</i> . . . . .                    | 25 "        |
| 205. — <i>spinosa</i> . . . . .               | 10 "        | 210. — <i>Jenkinsi, fort</i> . . . . .        | 300 "       |
| 206. <i>Livistona altissima</i> . . . . .     | 6 à 400 "   | 280. — <i>mauritiana</i> . . . . .            | 3 "         |
| (FLORE, XVII, 51.)                            |             | 213. † — <i>sinensis (Latania borbonica)</i>  | 1 à 75 "    |
| 207. † — <i>australis (Corypha)</i> . . . . . | 1 à 50 "    | <i>fort</i> . . . . .                         | 300 à 500 " |
| <i>très-fort</i> . . . . .                    | 100 à 350 " | 216. <i>Malortiea simplex (Geonoma fenes-</i> |             |
| 208. — <i>Hoogendorpi</i> . . . . .           | 3 à 25 "    | <i>trata)</i> . . . . .                       | 20 "        |
| <i>les douze</i> . . . . .                    | 30 "        | 219. <i>Martinezia caryotæfolia</i> . . . . . | 8 à 200 "   |
| <i>extra-fort, unique</i> . . . . .           | 2000 "      |   |             |



COCOS WEDDELLIANA. — 25 à 50 francs.



|  | Fr. C.     |   | Fr. C.       |
|--|------------|---|--------------|
| 362. <i>Martinezia erosa</i> . . . . .       | 40 à 125 " | 228. † <i>Morenia corallina</i> . . . . .     | 10 à 20 "    |
| 433. — <i>leucophæa</i> . . . . .            | 25 "       | 234. <i>Oncosperma fasciculatum</i> . . . . . | 50 "         |
| 413. — <i>minor</i> . . . . .                | 30 "       | 235. — <i>filamentosum</i> . . . . .          | 15 "         |
| 225. <i>Maximiliana regia</i> . . . . .      | 30 "       | 236. — <i>Van Houtteanum</i> ( <i>Areca</i>   |              |
| 227. † <i>Micrococos chilensis</i> . . . . . | 3 à 10 "   | <i>nobilis</i> ), <i>fort</i> . . . . .       | 500 à 1500 " |
| <i>extra-fort</i> . . . . .                  | 800 "      | ( <i>FLORE</i> , XVII, 147.)                  |              |
| — <i>la couple</i> . . . . .                 | 1500 "     | 237. <i>Orania macroclada</i> . . . . .       | 20 "         |



DÆMONOROPS PALEMBANGENSIS. — *Pièce* : 10 francs. — *Les douze* : 75 francs.



|   | Fr. C.       |   | Fr. C.      |
|---|--------------|---|-------------|
| 241. <i>Oreodoxa regia</i> . . . . .  | 50 à 75 "    | 270. † <i>Sabal Adansoni</i> . . . . .                                | 2 "         |
| 242. — <i>Sancona</i> HORT. . . . .   | 10 à 75 "    | 415. † — <i>longipedunculata</i> . . . . .                            | 10 "        |
| 243. <i>Phœnicophorium sechellarum</i><br>(FLORE, XV, 177), <i>extra-fort</i> . | .600 "       | 398. † — <i>mauritiaeformis</i> . . . . .                             | 5 "         |
| 336. † <i>Phoenix acaulis</i> . . . . .   | 15 à 25 "    | 274. † — <i>Mocini</i> . . . . .                                      | .2 à 10 "   |
| 245. † — <i>dactylifera</i> . . . . .   | 2 à 100 "    | 275. † — <i>princeps</i> . . . . .                                    | .2 "        |
| 246. † — <i>farinifera</i> . . . . .  | . 2 "        | 325. † — <i>umbraculifera</i> . . . . .                               | .5 à 15 "   |
| 248. † — <i>leonensis</i> . . . . .   | 10 à 25 "    | 225. † <i>Scheelia regia</i> . . . . .                                | .30 "       |
| 397. † — <i>paludosa</i> . . . . .  | . 10 "       | 276. † <i>Seaforthia elegans</i> . . . . .                            | .2 à 10 "   |
| 414. † — <i>paradenia</i> . . . . .   | . 25 "       | 277. † — <i>robusta (Areca Baueri)</i> .                              | 10 à 50 "   |
| 250. † — <i>reclinata</i> . . . . .   | .2 à 40 "    | 243. <i>Stevensonia sechellarum</i> , voir<br><i>Phœnicophorium</i> . |             |
| <i>fort</i> . . . . .   | .300 "       | 328. <i>Syagrus majestica</i> . . . . .                               | .200 "      |
| 337. † — <i>saharensis picta nigra</i> . . . . .                                | . 5 "        | 107. <i>Synechanthus interruptus</i> , <i>fort</i> .                  | .200 "      |
| 251. † — <i>sylvestris</i> . . . . .  | . 10 "       | 279. <i>Thrinax argentea</i> . . . . .                                | 30 à 50 "   |
| 252. † — <i>tenuis</i> . . . . .  | .3 à 50 "    | 421. — <i>barbadensis</i> . . . . .                                   | .200 "      |
| 253. <i>Phytelephas macrocarpa</i> , <i>fort</i> ,<br><i>200 à 400</i> "        |              | 280. — <i>elegans</i> , <i>fort</i> . . . . .                         | 5 à 300 "   |
| 255. <i>Pinanga Kuhlii</i> . . . . .  | . 15 "       | 401. — <i>elegantissima</i> . . . . .                                 | . 75 "      |
| 387. — — <i>alba</i> . . . . .  | . 25 "       | 283. — <i>graminea</i> . . . . .                                      | .200 "      |
| 256. — <i>latisecta</i> . . . . .   | .150 "       | 284. — <i>grandis</i> . . . . .                                       | 30 à 250 "  |
| 386. — <i>species Bornéo</i> . . . . .  | . 20 "       | 286. — <i>Martiana</i> . . . . .                                      | . 25 "      |
| 422. — <i>ternatensis</i> . . . . .   | . 15 "       | 287. — <i>parviflora</i> . . . . .                                    | .2 à 50 "   |
| 441. <i>Pritchardia filifera</i> . . . . .                                      | . 4 "        | 289. — <i>Robini</i> . . . . .  | . 30 "      |
| 418. — <i>macrocarpa</i> . . . . .  | . 50 "       | 299. — <i>species</i> . . . . .                                       | .150 "      |
| 211. — <i>pacifica</i> . . . . .  | .50 à 1000 " | 293. † <i>Trithrinax mauritiæformis</i> .                             | .3 à 25 "   |
| 263. <i>Ptychosperma Alexandræ</i> (FLORE).<br>5 à 15 "                         |              | 366. † <i>Veitchia Canterburyana</i> . . . . .                        | . 50 "      |
| 435. — <i>hexandra</i> . . . . .  | . 75 "       | 294. — <i>Johannis</i> , <i>très-rare</i> , <i>très-fort</i> .        | .400 "      |
| 425. — <i>rupicola</i> . . . . .  | . 30 "       | 295. <i>Verschaffeltia melanochætes</i> .                             | 40 à 75 "   |
| 265. — <i>species Mont Ternat</i> . . . . .                                     | .175 "       | 296. — <i>splendida</i> (FLORE, XV, 181) .                            | . 25 "      |
| 267. † <i>Rhaphis flabelliformis</i> . . . . .                                  | .6 à 50 "    | 297. <i>Wallichia caryotoides</i> . . . . .                           | . 50 "      |
| <i>les douze</i> . . . . .  | .60 à 200 "  | 299. — <i>oblongifolia</i> . . . . .                                  | " "         |
| 268. † — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .                                   | . 75 "       | 300. — <i>Orani</i> . . . . .   | 10 à 25 "   |
| 269. † — — <i>Sierotsik</i> . . . . .   | . 50 "       | 301. — <i>porphyrocarpa</i> . . . . .                                 | .20 à 100 " |
|   |              | 304. — <i>species Insula Palocoki</i> . . . . .                       | .200 "      |
|   |              | 306. <i>Welfia regia</i> . . . . .                                    | 10 à 25 "   |
|   |              | 381. <i>Zalacca edulis</i> . . . . .                                  | . 35 "      |

## PANDANÉES.

|   | Fr. C.     |   | Fr. C.       |
|---|------------|---|--------------|
| 1. <i>Pandanus amaryllidifolius</i> . . . . .       | .5 à 10 "  | 15. <i>Pandanus ornatus</i> . . . . .     | .300 à 500 " |
| 2. — <i>caricosus</i> . . . . .                     | .3 à 25 "  | 17. — <i>pygmæus</i> . . . . .            | .3 à 10 "    |
| 4. — <i>cuspidatus</i> , <i>très-fort</i> . . . . . | . 50 "     | 18. — <i>reflexus</i> . . . . .           | .25 à 400 "  |
| 28. — <i>decorus</i> . . . . .                      | .150 "     | 22. — <i>species Madagascar</i> . . . . . | .100 à 200 " |
| 5. — <i>drupaceus (unique)</i> . . . . .            | .400 "     | 23. — — — <i>à feuilles farineuses</i> .  | 50 à 100 "   |
| 6. — <i>elegantissimus</i> . . . . .                | 25 à 75 "  | 24. — <i>species</i> — . . . . .          | .100 à 200 " |
| 7. — <i>furcatus</i> . . . . .                      | 50 à 100 " | 25. — <i>utilis</i> . . . . .             | . 1 à 100 "  |
| 8. — <i>gramineus</i> . . . . .                     | . 5 "      | 26. — <i>Vandermeerschii</i> (FLORE) .    | 50 à 500 "   |
| 9. — <i>graminifolius</i> . . . . .                 | . 4 "      | 27. — <i>Veitchi</i> . . . . .            | .5 à 25 "    |
| 10. — <i>inermis</i> , <i>fort</i> . . . . .        | . 10 "     | — <i>species, unique</i> . . . . .        | .100 à 500 " |
| 11. — <i>javanicus foliis variegatis</i> .          | .5 à 15 "  |   |              |



## PASSIFLOREES.

## Passiflora. — Tacsonia.

|  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 2. <i>Passiflora Actinia</i> . . . . .               | 2 "    | 30. <i>Passiflora Impératrice Eugénie</i> . . . . .  | 2 "    |
| (FLORE, II, avril 10.)                               |        | 75. — <i>insignis (Tacsonia)</i> . . . . .           | 10 "   |
| 4. — <i>alata</i> . . . . .                          | 2 "    | 69. — <i>Junesi</i> . . . . .                        | 2 "    |
| 6. — <i>amabilis</i> (FLORE, III, 209) . . . . .     | 2 "    | 31. — <i>kermesina</i> . . . . .                     | 2 "    |
| 77. — <i>Arc-en-ciel</i> . . . . .                   | 4 "    | 64. — <i>Lawsoniana</i> . . . . .                    | 2 "    |
| 10. — <i>Bijou</i> . . . . .                         | 2 "    | 65. — <i>Loudoni</i> . . . . .                       | 2 "    |
| 11. — <i>Bonapartei</i> . . . . .                    | 2 "    | 35. — <i>macrocarpa</i> . . . . .                    | 3 "    |
| 53. — <i>Buchanani (Tacsonia)</i> . . . . .          | 2 "    | 68. — <i>Madona</i> . . . . .                        | 2 "    |
| 71. — <i>cærulea</i> . . . . .                       | 2 "    | 55. — <i>manicata (Tacsonia)</i> . . . . .           | 2 "    |
| 13. — <i>cardinalis</i> . . . . .                    | 2 "    | 63. — <i>Munroi</i> . . . . .                        | 2 "    |
| 15. — <i>coelestina</i> . . . . .                    | 2 "    | 39. — <i>Neumanni</i> . . . . .                      | 2 "    |
| 20. — <i>Decaisneana</i> (FLORE, VIII, 267). . . . . | 2 "    | 57. — <i>pinnatistipula (Tacsonia)</i> . . . . .     | 2 "    |
| 22. — <i>edulis</i> . . . . .                        | 1 "    | 42. — <i>princeps</i> . . . . .                      | 2 "    |
| 60. — <i>eriantha (Tacsonia)</i> . . . . .           | 2 "    | 43. — <i>quadrangularis</i> . . . . .                | 2 "    |
| (FLORE, XVIII, 159.)                                 |        | 72. — — <i>aucubæfolia</i> . . . . .                 | 5 "    |
| 70. — <i>exoniensis (Tacsonia)</i> . . . . .         | 2 "    | 73. — <i>quitensis eriantha (Tacsonia)</i> . . . . . | 2 "    |
| 26. — <i>fulgens</i> . . . . .                       | 2 "    | 74. — <i>splendens (Tacsonia)</i> . . . . .          | 3 "    |
| 27. — <i>Gontieri</i> . . . . .                      | 2 "    | 58. — <i>trifasciata</i> . . . . .                   | 2 "    |
| 54. — <i>igneæ (Tacsonia)</i> . . . . .              | 2 "    | 59. — <i>Van Volxemi (Tacsonia)</i> . . . . .        | 2 "    |

## SARRACÉNIÉES.

Les **Sarracéniées** sont toutes plantes de marais; elles se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; elles peuvent être hivernées sous châssis froid.

|  | Fr. C. | sont admirablement teintes d'un beau rose et tachetées de blanc. Nous l'avons introduit de son pays natal.                                     | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| <i>Cephalotus follicularis</i> . . . . .               | 3 "    |  |        |
| <i>Darlingtonia californica</i> , <i>fort.</i> . . . . | 25 "   | 4. <i>Sarracenia purpurea</i> . . . . .  | 2 "    |
| (FLORE, XIV, 125.)                                     |        | les douze. . . . .   | 18 "   |
| <i>Dionæa Muscipula</i> . . . . .                      | 3 "    | (FLORE, X, 247.)   |        |
| 8. <i>Sarracenia Drummondii</i> . . . . .              | 25 "   | Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé. Fleurs rouges. Parfaitement rustique. |        |
| (FLORE, VI, 81 et X, 239.)                             |        | 5. — <i>rubra</i> (FLORE, X, 243) . . . . .  | 5 "    |
| Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.   |        | 6. — <i>variolaris</i> . . . . .   | 8 "    |
| 2. — <i>flava</i> . . . . .                            | 5 "    | Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleurs rouge sang.   |        |
| 3. — <i>psittacina</i> (FLORE, XX, 33) . . . . .       | 10 "   |  |        |
| les douze . . . . .                                    | 100 "  |  |        |

Le plus nain et le plus beau des *Sarracenia*. Ses ascidies

## SCITAMINÉES.

|  | Fr. C.    |  | Fr. C. |
|--|-----------|--|--------|
| 125. <i>Alpinia Bangka</i> . . . . .         | 4 "       | 9. <i>Curcuma cæsia</i> . . . . .                                  | 1 "    |
| 126. — <i>calcarata</i> . . . . .            | 4 "       | 11. — <i>elata</i> . . . . .                                       | 1 "    |
| 2. — <i>nutans (Globba)</i> . . . . .        | 4 "       | 12. — <i>leucorrhiza</i> . . . . .                                 | 1 "    |
| 3. — <i>sanguinolenta</i> . . . . .          | 2 "       | 13. — <i>longa</i> . . . . .                                       | 1 "    |
| 116. — <i>vittata</i> . . . . .              | 6 à 100 " | 14. — <i>Roscoeana</i> . . . . .                                   | 3 "    |
| 4. <i>Amomum Cardamomum</i> . . . . .        | 4 "       | Epi dressé, magnifiques bractées oranges.                          |        |
| 130. — <i>gracile</i> . . . . .              | 5 "       | 15. — <i>rubricaulis</i> . . . . .                                 | 1 "    |
| 7. <i>Costus discolor</i> . . . . .          | 3 "       | 16. — <i>Zedoaria (aromatica, officinalis, Zerumbet)</i> . . . . . | 1 "    |
| 8. — <i>Malortieanus (elegans)</i> . . . . . | 2 "       |  |        |



|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 127. <i>Elettaria atropurpurea</i> . . . . .            | 3 "    |
| 1837. <i>Globba Rœzli</i> . . . . .                     | 3 "    |
| 1836. — <i>saltatoria</i> ( <i>Mantisia</i> ) . . . . . | 5 "    |

Nous avons publié dans le XX<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 41, cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont blanches, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil tenu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| 28. <i>Heliconia pulverulenta</i> ( <i>farinosa</i> ) . . . . . | 3 "       |
| 100. — <i>Seemanni</i> . . . . .                                | 15 à 30 " |
| 101. — <i>vinosa</i> . . . . .                                  | .3 à 50 " |
| 31. <i>Kämpferia Roscoeana</i> . . . . .                        | 3 "       |
| (FLORE, XIX, 117.)  |           |
| 113. <i>Maranta amabilis</i> . . . . .                          | 3 "       |
| 32. — <i>argyræa</i> . . . . .                                  | 3 "       |
| 135. — <i>Bachemiana</i> . . . . .                              | 25 "      |



HELICONIA SEEMANNI. — 15 à 30 francs.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 128. <i>Hedychium album</i> . . . . .               | 4 "    |
| 21. — <i>Gardnerianum</i> . . . . .                 | 4 "    |
| 129. — <i>luteum</i> . . . . .                      | 4 "    |
| 23. <i>Heliconia angustifolia</i> (FLORE) . . . . . | 5 "    |
| 24. — <i>aurantiaca</i> . . . . .                   | 2 "    |
| 26. — <i>metallica</i> . . . . .                    | 5 "    |
| 27. — <i>psittacorum</i> . . . . .                  | 4 "    |

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 33. <i>Maranta Baraquiniana</i> . . . . . | 3 "    |
| 109. — <i>bellula</i> . . . . .           | 5 "    |
| 36. — <i>bicolor</i> . . . . .            | 2 "    |
| 34. — <i>chimboracensis</i> . . . . .     | 3 "    |
| 93. — <i>cinerea</i> . . . . .            | 3 "    |
| 35. — <i>coriifolia</i> . . . . .         | 3 "    |
| 37. — <i>densa</i> . . . . .              | 2 "    |



|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| 139. <i>Maranta eburnea</i> . . . . .                | 10 "      |
| 38. — <i>eximia</i> . . . . .                        | 3 "       |
| 39. — <i>fasciata</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 41. — <i>Groenewegeniana</i> . . . . .               | 3 "       |
| 115. — <i>hieroglyphica</i> . . . . .                | 10 à 25 " |
| 42. — <i>illustris</i> . . . . .                     | .4 à 50 " |
| (FLORE, XVI, 157.)                                   |           |
| 43. — <i>Jagoriana</i> . . . . .                     | 2 "       |
| 44. — <i>Legrelleana</i> . . . . .                   | 3 "       |
| 131. — <i>leopardina</i> . . . . .                   | 35 "      |
| 136. — <i>Lietzei</i> . . . . .                      | 25 "      |
| 45. — <i>Lindeni</i> . . . . .                       | .4 à 50 " |
| 110. — <i>Luciani</i> . . . . .                      | 5 "       |
| 46. — <i>majestica</i> ( <i>Phrynium</i> ) . . . . . | 5 "       |
| 114. — <i>Makoyana</i> . . . . .                     | 4 à 100 " |
| (FLORE, XX, 15.)                                     |           |

Espèce naine, très-ornementale; dessins aussi beaux que ceux qui ornent le *Maranta Veitchi*, mais d'un style plus mignon.

|   |           |
|---|-----------|
| 124. — <i>Mazeli</i> . . . . .                        | 6 à 100 " |
| 47. — <i>metallica</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 119. — <i>micans longifolia</i> . . . . .             | 3 "       |
| 120. — <i>nigro-costata</i> . . . . .                 | 15 "      |
| 137. — <i>Oppenheimiana</i> . . . . .                 | 25 "      |
| 49. — <i>orbifolia</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 50. — <i>ornata picta</i> ( <i>Van Houttei</i> ) fort | 5 "       |
| 104. — <i>pacifica</i> . . . . .                      | .6 à 10 " |
| 51. — <i>pavonia</i> (FLORE) . . . . .                | 20 "      |
| 132. — <i>pinnato-picta</i> . . . . .                 | 20 "      |
| 133. — <i>porphyrocaulis</i> . . . . .                | 25 "      |
| 52. — <i>Porteana</i> . . . . .                       | 2 à 100 " |
| 94. — <i>princeps</i> . . . . .                       | .3 à 75 " |
| 134. — <i>prasina</i> . . . . .                       | 25 "      |
| 53. — <i>regalis</i> (FLORE, X, 231) . . . . .        | 5 "       |
| 54. — <i>roseo-picta</i> . . . . .                    | .5 à 10 " |
| (FLORE, XVI, 127.)                                    |           |
| 55. — <i>rufibarba</i> . . . . .                      | 2 "       |
| 56. — <i>sanguinea</i> (FLORE) . . . . .              | 2 "       |
| 95. — <i>setosa</i> . . . . .                         | 3 "       |
| 96. — <i>smaragdina</i> . . . . .                     | 10 "      |
| 57. — <i>spicata</i> . . . . .                        | 2 "       |
| 58. — <i>splendida</i> . . . . .                      | 4 "       |
| 97. — <i>truncata</i> . . . . .                       | 3 "       |
| 59. — <i>tubispata</i> . . . . .                      | 5 "       |
| 118. — <i>undulata</i> . . . . .                      | 5 "       |
| 60. — <i>Van den Heckeii</i> . . . . .                | 2 à 5 "   |
| 61. — <i>variegata</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 62. — <i>Veitchi</i> . . . . .                        | .5 à 10 " |
| 63. — <i>virginalis</i> . . . . .                     | .5 à 10 " |
| 123. — — <i>major</i> . . . . .                       | 10 "      |
| 64. — <i>vittata</i> (FLORE) . . . . .                | 3 "       |
| 98. — <i>Wagneri</i> . . . . .                        | 3 "       |
| 65. — <i>Wallisi</i> . . . . .                        | .3 à 50 " |

|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| 111. <i>Maranta Wallisi</i> discolor . . . . . | 6 "       |
| 66. — <i>Warscewiczii</i> . . . . .            | .4 à 50 " |
| (FLORE, IX, 209.)                              |           |
| 138. — <i>Wioti</i> . . . . .                  | 25 "      |
| 67. — <i>zebrina</i> . . . . .                 | 3 à 300 " |

### JE LIVRE, A MON CHOIX :

|   |                                     |                |          |   |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|---|
| 12  | Maranta en 12 sortes.               | . . . . .      | 25       | n |
| 25  | —                                   | 25 — . . . . . | 60       | n |
| 68.   | Musa Cavendishi (sinensis).         | . . . . .      | .8 à 15  | n |
| 121.  | — Cliffortiana simiarum . . . . .   |                | 10       | n |
| 69.   | — coccinea (FLORE, VII, 213)        | . . . . .      | 10       | n |
| 70.   | — discolor, fort . . . . .          |                | 10 à 20  | n |
| 71.   | — Ensete (FLORE, XIV, 65)           | . . . . .      | 6 à 30   | n |
|   | extra-fort . . . . .                |                | .250     | n |
| — — Graines garanties de première fraîcheur, tout récemment importées : |                                     |                |          |   |
|   | la graine . . . . .                 |                | 1 75     |   |
|   | 12 graines . . . . .                |                | 18       | n |
|   | 100 " . . . . .                     |                | .125     | n |
| 72.   | — ornata . . . . .                  |                | 15       | n |
| 73.   | — paradisiaca, fort . . . . .       |                | 10       | n |
| 74.   | — rosacea . . . . .                 |                | .5 à 10  | n |
| 105.  | — rubra . . . . .                   |                | 10 à 20  | n |
| 117.  | — sanguinea . . . . .               |                | "        | n |
| 140.  | — sapida . . . . .                  |                | 15       | n |
| 75.   | — sapientum . . . . .               |                | 15       | n |
| 106.  | — superba . . . . .                 |                | 15 à 25  | n |
| 76.   | — textilis . . . . .                |                | 25       | n |
| 99.   | — violacea . . . . .                |                | 10 à 20  | n |
| 77.   | — vittata . . . . .                 |                | 60       | n |
|   | (FLORE, XV, 25 à 27.)               |                |          |   |
| 78.   | — zebrina (FLORE, X, 223) . . . . . |                | 15       | n |
| 80.   | Ravenala guianensis . . . . .       |                | 20       | n |
|   | (FLORE, XIII, 117 et 118.)          |                |          |   |
| 81.   | — madagascariensis . . . . .        |                | .6 à 60  | n |
|   | (FLORE, XXI, 161.)                  |                |          |   |
| 83.   | Strelitzia augusta . . . . .        |                | 10       | n |
|   | (FLORE, II, 173-4.)                 |                |          |   |
| 84.   | — Nicolai . . . . .                 |                | 10 à 75  | n |
|   | (FLORE, XIII, 121.)                 |                |          |   |
| 85.   | — Reginæ . . . . .                  |                | 10 à 25  | n |
| 86.   | — — humilis . . . . .               |                | 10       | n |
| 87.   | — — juncifolia, très-fort . . . . . |                | 40 à 100 | n |
| 122.  | — — lancifolia . . . . .            |                | 10 à 20  | n |
| 88.   | — — spathulata . . . . .            |                | 25       | n |
| 56.   | Stromanthe sanguinea (Maranta).     | . . . . .      | 2        | n |
|   | (FLORE, VIII, 97.)                  |                |          |   |
| 89.   | Thalia dealbata . . . . .           |                | 2        | n |
|   | Urania, voir Ravenala.              |                |          |   |



# SERRE FROIDE.

Fr. C.

|  |          |    |
|--|----------|----|
| <b>Abelia floribunda</b> (FLORE, II, janv. 4) . . .                                | 2        | n  |
| — <i>uniflora</i> (FLORE, VIII, 203) . . .   | 2        | n  |
| 16. <b>Abutilon Alphonse Karr</b> . . .  | 1        | n  |
| 17. — <i>Béranger</i> . . .  | 1        | n  |
| 13. — <i>Boule de neige</i> . . .  | 1        | n  |
| 18. — <i>Comtesse de Medici-Spada</i> . . .  | 1        | n  |
| 22. — <i>Darwini</i> . . .   | 2        | n  |
| 23. — — <i>tessellatum</i> . . .   | 3        | n  |
| 19. — <i>Duc de Malakoff</i> . . .   | 1        | n  |
| 1. — <i>Lemoinei</i> . . .   | 1        | n  |
| 4. — <i>megapotamicum</i> . . .  | 1        | n  |
| 11. — — <i>foliis variegatis</i> . . .   | 1        | n  |
| 12. — — <i>venosum</i> . . .   | 1        | n  |
| 20. — <i>Montgolfier</i> . . .   | 1        | n  |
| 2. — <i>rubrum multiflorum</i> . . .   | 1        | n  |
| 15. — <i>Sellowianum variegatum</i> (Fl.). . .                                     | 3 à 5    | n  |
| 21. — <i>Souvenir de Couchy</i> . . .  | 1        | n  |
| 10. — <i>Souvenir de Maximilien</i> . . .  | 1        | n  |
| 6. — <i>striatum foliis variegatis</i> . . .                                       | 1        | n  |
| 9. — <i>Thompsoni</i> . . .  | 1        | n  |
| <b>Acacia albicans</b> . . .   | 2        | n  |
| — <i>argyrophylla</i> . . .  | 2        | n  |
| — <i>coccinea</i> . . .  | 2        | n  |
| — <i>Drummondii</i> . . .  | 2 à 5    | n  |
| — <i>grandis</i> . . .   | 2        | n  |
| — <i>Julibrissin</i> . . .   | 2        | n  |
| — <i>lineata</i> . . .   | 2        | n  |
| — <i>lophantha</i> . . .   | 1        | n  |
| — — <i>Neumannii</i> . . .   | 2        | n  |
| — <i>Neillii</i> . . .   | 3        | n  |
| — <i>nitida</i> . . .  | 2        | n  |
| — <i>ornata</i> . . .  | 1        | n  |
| — <i>ovata</i> . . .   | 3        | n  |
| — <i>paradoxa</i> . . .  | 2        | n  |
| — <i>pendula</i> . . .   | 2        | n  |
| — <i>platyptera</i> . . .  | 2 à 5    | n  |
| — <i>Riceana</i> . . .   | 2 à 5    | n  |
| <b>Achyrocline Saundersonii</b> . . .  | 1        | n  |
| <b>Adenandra fragrans</b> . . .  | 2        | n  |
| <b>Adromistus clavatus</b> . . .   | 3        | n  |
| — <i>cristatus</i> . . .   | 3        | n  |
| — <i>Desmetianus</i> . . .   | 5        | n  |
| 1737. <b>Agapanthus umbellatus</b> . . .   | 1        | n  |
| — — <i>les douze</i> . . .   | 9        | n  |
| 1738. — — <i>flore albo</i> . . .  | 2        | n  |
| 1739. — — <i>bicolori</i> . . .  | 1        | 50 |
| 1740. — — <i>foliis albo-vittatis</i> . . .  | 2        | n  |
| Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements. |          |    |
| 1741. — — <i>aureo-vittatis</i> . . .  | 25       | n  |
| 2869. — — <i>maximus</i> . . .   | 4        | n  |
| <b>Agathæa coelestis foliis variegatis</b> . . .                                   | 50       | n  |
| <b>Agave americana, fort.</b> . . .  | 2 à 25   | n  |
| — — <i>foliis striatis, fort.</i> . . .  | 5 à 15   | n  |
| — — — <i>variegatis</i> . . .  | 4 à 15   | n  |
| — — — <i>medio-pictis</i> . . .  | 10 à 100 | n  |

Fr. C.

|                               |         |   |
|-------------------------------|---------|---|
| <b>Agave applanata.</b> . . . | 3 à 100 | n |
| — <i>attenuata</i> . . .      | 25      | n |
| — <i>Bessereriana</i> . . .   | 25      | n |
| — <i>cærulescens</i> . . .    | 10 à 20 | n |
| — <i>Celsiana</i> . . .       | 25      | n |



ACACIA RICEANA. — 2 à 5 francs.

Fr. C.

|  |         |   |
|--|---------|---|
| <b>Agave chiapensis</b> . . .              | 5       | n |
| — <i>coccinea</i> . . .                    | 5       | n |
| — <i>dealbata, extra-fort</i> . . .        | 75      | n |
| — — <i>spiralis</i> . . .                  | 100     | n |
| — <i>densiflora</i> . . .                  | 10      | n |
| — <i>filifera</i> . . .                    | 5 à 50  | n |
| — — <i>major, fort.</i> . . .              | 10 à 50 | n |
| — — <i>Ortgiesii</i> . . .                 | 15      | n |
| — <i>grandidentata, fort</i> . . .         | 10 à 25 | n |
| — <i>Ixtli</i> . . .                       | 5 à 10  | n |
| — <i>mexicana</i> . . .                    | 2 à 10  | n |
| — <i>micracantha</i> . . .                 | 25      | n |
| — <i>Milleri picta</i> . . .               | 10 à 60 | n |
| — <i>Parryi</i> . . .                      | 5       | n |
| — <i>Rumphi</i> . . .                      | 6       | n |
| — <i>Salmiana</i> . . .                    | 10 à 50 | n |
| — <i>Sartori</i> . . .                     | 5       | n |
| — <i>schidigera</i> . . .                  | 10 à 25 | n |
| — <i>univittata</i> . . .                  | 20      | n |
| — — <i>variegata</i> . . .                 | 5 à 10  | n |
| — <i>Verschaaffelti</i> . . .              | 5 à 25  | n |
| — <i>xalapensis, fort</i> . . .            | 25      | n |
| — <i>xylinacantha</i> . . .                | 30      | n |
| 7. <b>Ageratum coelestinum</b> . . .       | 50      | n |
| 8. — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . | 50      | n |
| 1. — <i>Imperial dwarf</i> . . .           | 1       | n |
| 4. — <i>Lasseauxi</i> . . .                | 50      | n |



|  | Fr. C.    |
|--|-----------|
| 6. <i>Ageratum mexicanum aureum</i> . . . . .      | 50 "      |
| 3. — <i>White Tom Thumb</i> . . . . .              | 1 "       |
| <i>Agnostus sinuatus (Stenocarpus)</i> . . . . .   | .5 à 20 " |
| (FLORE, III, 189.)                                 |           |
| — — <i>integrifolius</i> . . . . .                 | .4 à 20 " |
| <i>Aletris arborea foliis variegatis</i> . . . . . | 5 "       |
| <i>Aloe albo-cincta</i> . . . . .                  | 5 "       |
| — — <i>depressa</i> . . . . .                      | 2 "       |
| — — <i>ferox</i> . . . . .                         | .8 à 40 " |
| — — <i>incurva</i> . . . . .                       | 5 "       |
| — — <i>retusa</i> . . . . .                        | 2 "       |
| — — <i>rigida</i> . . . . .                        | 4 "       |
| — — <i>tessellata</i> . . . . .                    | 5 "       |
| — — <i>variegata</i> . . . . .                     | 3 "       |
| 2010. <i>Amaryllis procera</i> . . . . .           | 10 à 30 " |
| (FLORE, XX, 53.)                                   |           |

*Amaryllis* à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.

Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.

|   |            |
|---|------------|
| 1766. — <i>purpurea (Vallota)</i> . . . . .           | 1 "        |
| les douze. . . . .                                    | 10 "       |
| <i>Amphicome arguta</i> . . . . .                     | 1 "        |
| — <i>Emodi (FLORE, XI, 69)</i> . . . . .              | 1 "        |
| <i>Andromeda augusta</i> . . . . .                    | 2 "        |
| — <i>formosa</i> . . . . .                            | 3 "        |
| <i>Angelonia grandiflora</i> . . . . .                | 1 "        |
| A cultiver en orangerie.                              |            |
| <i>Anigosanthus coccineus</i> . . . . .               | 3 "        |
| <i>Anopterus glandulosa</i> . . . . .                 | 2 "        |
| <i>Anthericum variegatum (Phalangium)</i> , . . . . . | 15 à 30 "  |
| <i>Antirrhinum flore roseo pleno</i> . . . . .        | 1 "        |
| — (hybr.) <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . . | 1 "        |
| — <i>sulphureum plenum</i> . . . . .                  | 1 "        |
| <i>Aotus gracillima</i> . . . . .                     | 2 "        |
| <i>Aphelexis</i> , voir <i>Helichrysum</i> .          |            |
| <i>Aponogeton distachyum</i> . . . . .                | 2 "        |
| (FLORE, XVII, 125.)                                   |            |
| — <i>juncum (FLORE, XXII)</i> . . . . .               | 5 "        |
| <i>Aralia arborea</i> . . . . .                       | 3 "        |
| — <i>crassifolia</i> . . . . .                        | .3 à 15 "  |
| — — <i>integrifolia</i> . . . . .                     | .3 à 15 "  |
| — — <i>picta</i> . . . . .                            | .6 à 15 "  |
| — — <i>spatulata</i> . . . . .                        | 10 à 25 "  |
| — <i>papyrifera</i> . . . . .                         | 1 "        |
| — <i>quinquefolia</i> . . . . .                       | .3 à 10 "  |
| — <i>Sieboldi</i> . . . . .                           | .1 à 10 "  |
| belles plantes, le cent. . . . .                      | 50 à 100 " |
| — — <i>aureo-reticulata</i> . . . . .                 | 10 "       |
| — — <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .           | .5 à 40 "  |
| — — <i>aureo-marginatis</i> . . . . .                 | .5 à 25 "  |
| — <i>trifoliata</i> . . . . .                         | .2 à 10 "  |
| — — <i>Baueri</i> . . . . .                           | 5 "        |
| — — <i>Cooki</i> . . . . .                            | 3 "        |
| — — <i>Cunninghami</i> . . . . .                      | 5 "        |

|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| <i>Aralia trifoliata Enkei</i> . . . . .              | 5 "        |
| — — <i>heteromorpha</i> . . . . .                     | .5 à 10 "  |
| — — <i>latifolia</i> . . . . .                        | .3 à 10 "  |
| <i>Araucaria Bidwilli</i> . . . . .                   | 20 à 400 " |
| (FLORE, XXI, 119.)                                    |            |
| — <i>brasiliensis (FLORE, XXI, 85), fort.</i> . . . . | 2 "        |
| — <i>Cooki</i> . . . . .                              | 10 à 200 " |
| — <i>Cunninghami</i> . . . . .                        | 15 à 350 " |
| — — <i>glauca</i> . . . . .                           | 40 à 100 " |
| — <i>elegans, fort</i> . . . . .                      | 25 à 300 " |



ANGELONIA GRANDIFLORA. — 1 franc.


|   | Fr. C.      |
|---|-------------|
| <i>Araucaria excelsa</i> . . . . .  | 20 à 75 "   |
| fort . . . . .  | 200 à 400 " |
| — — <i>albo-spica</i> . . . . .   | 15 à 75 "   |
| — — <i>glauca</i> . . . . .   | 25 à 60 "   |
| — — <i>Jos.-Nap. Baumann</i> . . . . .  | 100 à 300 " |
| — — <i>multiceps</i> . . . . .  | 15 à 25 "   |
| — <i>imbricata</i> . . . . .  | 2 à 500 "   |
| (FLORE, XV, 147 et 150.)  |             |
| — <i>Rulei, de semis</i> . . . . .  | 25 "        |
| très-fort . . . . .   | 100 à 250 " |
| Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l' <i>Araucaria excelsa</i> . |             |
| <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .  | 1 "         |



|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| <i>Ardisia japonica</i> foliis variegatis. . . . .  | 5 "       |
| <i>Aristolochia ciliosa</i> . . . . .   | 2 "       |
| <i>Aristea capitata</i> major. . . . .  | 3 "       |
| <i>Artemisia argentea</i> . . . . .   | 50 "      |
| — <i>Stelleriana</i> . . . . .  | 50 "      |
| <i>Arthropodium cirrhatum</i> . . . . .   | 2 "       |
| <i>Arthrotaxis alpina</i> ( <i>selaginoides</i> ). . 4 à 10 "   |           |
| — <i>Doniana</i> . . . . .  | 5 "       |
| — <i>Gunneana</i> . . . . .   | 10 "      |
| — <i>taxifolia</i> . . . . .  | 8 "       |
| 75. <i>Arundo conspicua</i> . . . . .   | 1 "       |
| <i>Arundinaria falcata</i> foliis variegatis. . 10 "  |           |
| <i>Astelia Banksi</i> . . . . .   | 1 à 5 "   |
| <i>Astelma eximia</i> (FLORE, XXII) . . . . .   | 3 "       |
| <i>Azalea indica</i> . — Le Catalogue général paraîtra en août prochain.  |           |
| <i>Babingtonia camphorosma</i> . . . . .  | 3 "       |
| 105. <i>Bambusa Fortunei</i> foliis niveo-vitatis " 50 "  |           |
| les douze. . . . .  | 5 "       |
| Charmant petit Bambou tout rubané blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la page 169 du XV <sup>e</sup> volume de la FLORE. |           |
| 1587. — — <i>aureo-striata</i> . . . . .  | 1 "       |
| <i>Banksia collina</i> . . . . .  | 3 à 10 "  |
| — <i>integrifolia</i> . . . . .   | 3 à 30 "  |
| — <i>verticillata</i> . . . . .   | 5 à 30 "  |
| <i>Beaucarnea</i> ( <i>Pincenectitia</i> ) glauca . 1 à 10 "  |           |
| — <i>tuberculata</i> ( <i>recurvata</i> ) . . . . .   | 2 "       |
| (FLORE, XVIII, 26.)   |           |
| <i>Berberidopsis corallina</i> . . . . .  | 3 à 5 "   |
| (FLORE, XX, 141.)   |           |
| <i>Berberis Darwini</i> (FLORE, VII, 47) . . 1 "  |           |
| les douze. . . . .  | 9 "       |
| — <i>Jamesoni</i> . . . . .   | 2 "       |
| — <i>macrophylla</i> . . . . .  | 2 "       |
| — <i>trifoliata</i> . . . . .   | 2 "       |
| <i>Beschorneria yuccoides</i> . . . . .   | 5 "       |
| <i>Bignonia capreolata</i> . . . . .  | 3 "       |
| <i>Blandfordia aurea</i> . . . . .  | 10 "      |
| — <i>Cunninghami</i> . . . . .  | 10 "      |
| — <i>flammea</i> . . . . .  | 10 "      |
| — — <i>hybrida</i> . . . . .  | 10 "      |
| — <i>nobilis</i> . . . . .  | 10 "      |
| — — <i>grandiflora</i> . . . . .  | 10 "      |
| <i>Bonaparteia glauca</i> . . . . .   | 40 à 75 " |
| — <i>gracilis</i> . . . . .   | 5 à 100 " |
| — <i>junceae</i> . . . . .  | 2 à 5 "   |
| — <i>stricta</i> . . . . .  | 20 "      |
| <i>Boronia crenulata</i> . . . . .  | 3 "       |
| — <i>Drummondi</i> . . . . .  | 4 "       |
| — <i>megastigma</i> . . . . .   | 5 "       |
| — <i>serrulata</i> . . . . .  | 4 "       |
| — <i>tetrandra</i> ( <i>microphylla</i> ) . . . . .   | 4 "       |
| — <i>viminea</i> major. . . . .   | 2 "       |
| 23. <i>Bouvardia alba</i> odorata . . . . .   | 3 "       |
| 3. — <i>angustifolia</i> (FLORE, IX, 123) . 1 "   |           |
| 25. — <i>Davidsoni</i> . . . . .  | 2 "       |
| 21. — <i>elegans</i> . . . . .  | 1 50 "    |

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 9. <i>Bouvardia Houtteana</i> . . . . .               | 2 "    |
| 20. — <i>Humboldti corymbiflora</i> . . . . .         | 3 "    |
| 24. — ( <i>hybr.</i> ) <i>Bridal Wreath</i> . . . . . | 2 "    |
| 5. — (—) <i>Hogarth</i> . . . . .                     | 2 "    |
| 13. — (—) <i>Brillant</i> . . . . .                   | 1 "    |
| 6. — (—) <i>Laura</i> . . . . .                       | 1 "    |
| 18. — (—) <i>Linda</i> . . . . .                      | 1 "    |
| 26. — (—) <i>Queen of Roses</i> . . . . .             | 3 "    |
| 2. — (—) <i>rosea salmonea</i> . . . . .              | 1 "    |
| 12. — (—) <i>splendens</i> . . . . .                  | 1 "    |
| 22. — <i>jasminoides</i> . . . . .                    | 2 "    |
| 29. — — <i>longipetala</i> . . . . .                  | 3 "    |
| 30. — <i>leiantha</i> . . . . .                       | 2 "    |
| 16. — <i>longiflora carnea</i> . . . . .              | 1 "    |
| 11. — — <i>flammea</i> . . . . .                      | 3 "    |
| (FLORE, II, juin 10.)                                 |        |
| 7. — <i>Oriana</i> . . . . .                          | 2 "    |
| 31. — <i>umbellata alba</i> . . . . .                 | 3 "    |
| 32. — — <i>carnea</i> . . . . .                       | 3 "    |
| 27. — <i>Vreelandi</i> . . . . .                      | 3 "    |
| <i>Bowiea africana</i> . . . . .                      | 4 "    |
| <i>Brachysema acuminatum</i> . . . . .                | 2 "    |
| — <i>hybridum</i> . . . . .                           | 2 "    |
| — <i>latifolium</i> . . . . .                         | 2 "    |
| — <i>melanopetalum</i> . . . . .                      | 2 "    |
| <i>Bromelia Joinvillei</i> . . . . .                  | 2 "    |
| <i>Brugmansia arborea</i> . . . . .                   | 3 "    |
| — <i>Knighti</i> . . . . .                            | 3 "    |
| — <i>sanguinea</i> (FLORE, XVIII, 101). . 3 "         |        |
| — <i>suaveolens</i> . . . . .                         | 3 "    |
| <i>Buxus citrifolia</i> . . . . .                     | 5 "    |
| <i>Cacalia Kleinia</i> . . . . .                      | 15 "   |

|  |      |
|--|------|
| (FLORE, II, juin 10.)                                      |      |
| 7. — <i>Oriana</i> . . . . .                               | 2 "  |
| 31. — <i>umbellata alba</i> . . . . .                      | 3 "  |
| 32. — — <i>carnea</i> . . . . .                            | 3 "  |
| 27. — <i>Vreelandi</i> . . . . .                           | 3 "  |
| <i>Bowiea africana</i> . . . . .                           | 4 "  |
| <i>Brachysema acuminatum</i> . . . . .                     | 2 "  |
| — <i>hybridum</i> . . . . .                                | 2 "  |
| — <i>latifolium</i> . . . . .                              | 2 "  |
| — <i>melanopetalum</i> . . . . .                           | 2 "  |
| <i>Bromelia Joinvillei</i> . . . . .                       | 2 "  |
| <i>Brugmansia arborea</i> . . . . .                        | 3 "  |
| — <i>Knighti</i> . . . . .                                 | 3 "  |
| — <i>sanguinea</i> (FLORE, XVIII, 101). . 3 "              |      |
| — <i>suaveolens</i> . . . . .                              | 3 "  |
| <i>Buxus citrifolia</i> . . . . .                          | 5 "  |
| <i>Cacalia Kleinia</i> . . . . .                           | 15 " |
| <i>Cactées</i> , voir plus loin.                           |      |
| 23. <i>Calceolaria</i> (ligneuse) <i>Arlequin</i> . . " 50 |      |
| 37. — — <i>Pavoni</i> . . . . .                            | " 50 |



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

|   |      |
|---|------|
| 18. <i>Calceolaria</i> (ligneuse) <i>Triomphe de Versailles</i> . . . . . | " 50 |
| 38. — — <i>violacea</i> ( <i>Jovellana</i> ) . . . 2 à 4 "                |      |
| (FLORE, VIII, 85.)  |      |

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.





CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

## Calcéolaires herbacées.

Le *paquet de graines*, signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : " Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. " (Signé) L. VAN HOUTTE.

## Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre), en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.

Les Calcéolaires herbacées, en jeunes plants, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs le cent.

|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| <i>Callixene polyphylla</i> . . . . .   | 1 "       |
| <i>Camellia</i> . — Le Catalogue général paraîtra en août.  |           |
| <i>Camptosema rubicundum</i> (FL., VII, 153) . . . . .  | 2 "       |
| L'on peut le cultiver en pots successivement plus grands, en buttant de feuilles, et le laisser grimper le long des montants de la serre froide; ce Kennedy y fera merveille. |           |
| 1790. <i>Canarina Campanula</i> (FL., XI, 37) . . . . .   | 2 "       |
| Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges, rubanées de rouge.  |           |
| <i>Cantua bicolor</i> (FLORE, IV, 343) . . . . .  | 4 "       |
| — <i>corymbiflora</i> . . . . .   | 10 "      |
| — <i>dependens</i> (FLORE, VII, 11). . . . .  | 2 "       |
| <i>Cardwellia sublimis</i> , vrai . . . . .   | 15 "      |
| <i>Cassia corymbosa</i> . . . . .   | 2 "       |
| — <i>grandiflora</i> . . . . .  | 2 "       |
| — <i>laevigata</i> . . . . .  | 2 "       |
| — <i>schinifolia</i> . . . . .  | 3 "       |
| <i>Castanea chrysophylla</i> . . . . .  | 10 à 20 " |
| (FLORE, XII, 3.)  |           |

Espèce naine de Californie, toujours verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

|   |      |
|---|------|
| <i>Casuarina equisetifolia</i> . . . . .                  | 2 "  |
| <i>Ceanothus azureus</i> (FLORE, XIII, 171) . . . . .     | 2 "  |
| — <i>Veitchianus</i> . . . . .                            | 2 "  |
| <i>Centaurea candidissima</i> . . . . .                   | 75 " |
| — <i>gymnocarpa</i> . . . . .                             | 50 " |
| <i>Cephalotus follicularis</i> (FLORE, III, 280). . . . . | 3 "  |
| <i>Ceratonia Siliqua</i> . . . . .                        | 2 "  |
| <i>Ceratopetalum gummiiferum</i> . . . . .                | 2 "  |
| <i>Ceratostemma longiflorum</i> . . . . .                 | 3 "  |
| — <i>speciosum</i> . . . . .                              | 15 " |
| <i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .                      | 2 "  |

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| <i>Cheiranthra linearis</i> (FLORE, VIII, 291) . . . . .   | 2 "    |
| <i>Cheiranthus odoratissimus</i> . . . . .   | 2 "    |
| <i>Choisya ternata</i> . . . . .   | 2 "    |
| Parfaitement de pleine terre; charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête. |        |
| <i>Chorizema Lawrenceanum</i> . . . . .  | 2 "    |
| — <i>macrophyllum</i> . . . . .  | 1 "    |
| — <i>splendens</i> . . . . .   | 1 "    |
| — <i>rotundifolium</i> . . . . .   | 2 "    |
| — <i>varium</i> ( <i>Chandleri</i> ) . . . . .   | 2 "    |
| — <i>ilicifolium</i> . . . . .   | 2 "    |

Les *Chorizema*, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont jolis de feuillage et de fleurs.


|  |          |
|--|----------|
| <i>Chlorophytum prodigiosum foliis varieg.</i> . . . . | 2 "      |
| <b>Cinéraires naines. — Graines de surchoix</b>        |          |
| en mélange, le paquet . . . . .                        | 1 50     |
| <i>Cineraria acanthifolia</i> . . . . .                | 50 "     |
| — <i>maritima candidissima</i> . . . . .               | 75 "     |
| les douze. . . . .                                     | 6 "      |
| <i>Cinnamomum brevifolium</i> . . . . .                | 5 "      |
| — <i>pedunculatum foliis variegatis</i> . . . . .      | 12 "     |
| 3. <i>Citrus Aurantium Bigaradia</i> . . . . .         | 3 à 20 " |
| 4. — <i>Daïdaï</i> . . . . .                           | 5 "      |
| 7. — <i>japonica</i> (FLORE, IV, 411b) . . . . .       | 5 "      |
| 5. — <i>leucocarpa</i> . . . . .                       | 5 "      |
| 15. — <i>Mandarine</i> . . . . .                       | 3 "      |
| 6. — <i>Margaritæ</i> . . . . .                        | 5 "      |

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces divers *Citrus*. Voyez dans la FLORE, IV, page 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous les *Citrus*. Il aurait été déjà introduit par FORREUX qui l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine. Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive encore; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation.



|  | Fr. C.  |
|--|---------|
| 2. <i>Citrus taitensis</i> . . . . .                 | 1 à 2 " |
| 13. — <i>trifoliata</i> . . . . .                    | 2 "     |
| <i>Clematis indivisa lobata</i> . . . . .            | 3 "     |
| <i>Cleyera japonica</i> . . . . .                    | 2 "     |
| — — <i>foliis roseo-marginatis</i> . . . . .         | 5 "     |
| <i>Clianthus Dampieri</i> (FLORE, VI, 121) . . . . . | 4 "     |
| — — <i>graines, le paquet</i> . . . . .              | 1 "     |
| — — <i>flore albo, graines, le paquet</i> . . . . .  | 2 50    |
| — <i>puniceus</i> . . . . .                          | 1 "     |
| — — <i>magnificus</i> . . . . .                      | 1 "     |
| <i>Cobæa scandens</i> . . . . .                      | " 50    |
| — — <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .          | 1 "     |
| (FLORE, XIV, 199.)                                   |         |

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| <i>Crowea elliptica</i> . . . . .                                  | 2 "    |
| — <i>macrantha latifolia</i> . . . . .                             | 3 "    |
| — <i>saligna</i> . . . . .   | 2 "    |
| — <i>stricta</i> . . . . .   | 2 "    |
| <i>Cuphea platycentra</i> . . . . .                                | " 50   |
| 1799. <i>Cyclamen coum</i> . . . . .                               | " 75   |
| 1800. — — <i>vernum</i> . . . . .                                  | 1 "    |
| 1803. — <i>hederæfolium album</i> . . . . .                        | 1 50   |
| 1802. — — <i>rubrum</i> . . . . .                                  | " 50   |
| 1804. — ( <i>hybr.</i> ) <i>Atkinsi (ibericum album)</i> . . . . . | 1 50   |
| 1805. — ( — ) <i>carneum</i> . . . . .                             | 2 "    |
| 1806. — ( — ) <i>ibericum</i> . . . . .                            | " 50   |



CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

La petite plante aux petites canettes, à cultiver en serre tempérée, sous cloche. Voyez-en la figure dans la FLORE, III, 280. — *Prix* : 3 francs.

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| <i>Coleonema rubrum</i> . . . . .                        | 2 "    |
| <i>Colletia bictoniensis</i> (FLORE, XIV, 157) . . . . . | 1 "    |
| — <i>horrida</i> . . . . .                               | 2 "    |
| <i>Convolvulus mauritanicus</i> . . . . .                | " 50   |
| (FLORE, XXI, 61.)  |        |

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

|  |         |
|--|---------|
| <i>Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis</i> . . . . . | 1 à 3 " |
|--|---------|

Très-joli feuillage tout blanc, très-ornemental; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

|   |         |
|---|---------|
| <i>Correa cardinalis</i> (FLORE, XI, 143) . . . . . | 2 "     |
| <i>Corynocarpus latifolia</i> . . . . .             | 4 "     |
| <i>Cosbæa coccinea</i> . . . . .                    | 2 à 5 " |
| <i>Cotyledon orbicularis</i> . . . . .              | 2 "     |
| — <i>punctatissima</i> . . . . .                    | 2 "     |
| — <i>teritifolia</i> . . . . .                      | 2 "     |
| <i>Crassula lycopodioides</i> . . . . .             | 1 "     |
| — <i>perfoliata</i> . . . . .                       | 2 "     |


|   | Fr. C.    |
|---|-----------|
| 1808. <i>Cyclamen macrophyllum (africanum)</i> (FLORE, VIII, 249) . . . . . | 1 à 4 "   |
| 1811. — <i>persicum album</i> . . . . .                                     | 1 "       |
| 1812. — — — <i>candidissimum (alep-picum)</i> . . . . .                     | 2 "       |
| 1813. — — <i>roseum</i> . . . . .   | 1 50      |
| 1815. — <i>repandum</i> . . . . .   | 1 "       |
| <i>Cytisus Atleeanus</i> . . . . .  | 2 "       |
| — <i>Everestianus</i> . . . . .   | 4 "       |
| — <i>racemosus</i> . . . . .  | 2 "       |
| — — <i>elegans</i> . . . . .  | 3 "       |
| <i>Dacrydium cupressinum</i> . . . . .                                      | 10 "      |
| — — <i>elatum</i> . . . . .   | .6 à 25 " |
| — <i>Franklini</i> . . . . .  | 5 "       |
| <i>Dammara Browni (ovata)</i> . . . . .                                     | 100 "     |
| — <i>hypoleuca, fort</i> . . . . .  | 75 "      |
| — <i>Moorei</i> . . . . .   | 40 "      |
| — <i>obtusa</i> (FLORE, VII, 274) . . . . .                                 | 50 "      |
| — <i>robusta</i> . . . . .  | 40 "      |



|  | Fr. C.                                 |  | Fr. C.   |
|--|--|--|--|
| <b>Daphne Cneorum</b> . . . . .  | 1 "                                    | 6. <b>Echeveria metallica</b> . . . . .                | 1 à 5 "  |
| — — <b>major</b> . . . . .   | 2 "                                    | 7. — — <b>glauca</b> . . . . .                         | 1 à 3 "  |
| — — <b>variegata</b> . . . . .   | 2 "                                    | 16. — — <b>grandis</b> . . . . .                       | 10 "   |
| — <b>Delphini</b> . . . . .  | 2 "                                    | 25. — — <b>navicularis</b> . . . . .                   | 1 "  |
| — <b>Houtteana</b> . . . . .   | 4 "                                    | 9. — — <b>nuda</b> . . . . .                           | 1 "  |
| — <b>intus rubra</b> . . . . .   | 4 "                                    | 26. — — <b>peruviana</b> . . . . .                     | 1 "  |
| — <b>japonica elegantissima</b> . . . . .  | 6 "                                    | 27. — — <b>Pfersdorffii</b> . . . . .                  | 1 "  |
| — — <b>marginata</b> . . . . .   | 4 "                                    | 28. — — <b>pubescens (coccinea)</b> . . . . .          | 2 "  |
| — <b>Mazeli</b> . . . . .  | 6 "                                    | 3. — — <b>pulverulenta</b> . . . . .                   | 3 à 10 "   |
| — <b>oleoides foliis variegatis</b> . . . . .  | 2 "                                    |  | <i>très-fort</i> . . . . .100 "  |
| <b>Darwinia fimbriata</b> . . . . .  | 4 "                                    |  | (FLORE, XIX, 1.)   |
| <b>Dasylyrion longifolium</b> . . . . .  | 15 "                                   |  | Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace, atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement recouverte d'une pulvéulence blanche comme la neige. Voyez-en le portrait en tête du XIX <sup>e</sup> vol. de la FLORE, et vous acquerrez cette merveille; à préserver de tout arrosage en hiver. |
| <b>Desfontainea Hookeri</b> . . . . .  | 2 à 15 "                               |  |  |
|  | (FLORE, IX, 207.)                      |  |  |
| <b>Dianella dubia</b> . . . . .  | 1 "                                    | 34. — — <b>pumila</b> . . . . .                        | " 75 "   |
| — <b>latifolia</b> . . . . .   | 1 "                                    | 10. — — <b>retusa floribunda splendens</b> . . . . .   | 1 "  |
| <b>Dietes bicolor</b> (FLORE, VII, 273) . . . . .  | 2 "                                    | 8. — — <b>miniata</b> . . . . .                        | 1 "  |
| <i>Iris bicolor, Moræa bicolor.</i> Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.                           |  | 12. — — <b>rosea</b> . . . . .                         | 1 "  |
| <b>Dillwynia cinnabarina</b> . . . . .   | 3 "                                    | 15. — — <b>sanguinea (atropurpurea)</b> . . . . .      | 1 "  |
| — <b>Drummondii</b> . . . . .  | 3 "                                    | 11. — — <b>scaphiphylla</b> . . . . .                  | 2 à 6 "  |
| — <b>glaberrima</b> . . . . .  | 2 "                                    | 13. — — <b>Scheeri</b> . . . . .                       | 2 "  |
| — <b>Henchmanni</b> . . . . .  | 3 "                                    | 29. — — <b>secunda</b> . . . . .                       | " 50 "   |
| <b>Diosma ambigua</b> . . . . .  | 2 "                                    | 18. — — <b>Van Celsi</b> . . . . .                     | 5 "  |
| — <b>capitata</b> . . . . .  | 2 "                                    | 30. — — <b>villosa</b> . . . . .                       | 2 "  |
| — <b>fragrans (Adenandra)</b> . . . . .  | 2 "                                    | <b>Elæagnus macrophylla</b> . . . . .                  | 5 "  |
| — <b>purpurea</b> . . . . .  | 2 "                                    |  | Châle doré du Japon, à grandes feuilles persistantes à revers argentés; presque rustique.  |
| 2557. <b>Doryanthes Palmeri, semis.</b> . . . .  | 5 "                                    | <b>Elæodendron croceum</b> . . . . .                   | 2 "  |
|  | <i>très-forts.</i> . . . . .25 à 100 " | <b>Embothrium lævigatum</b> . . . . .                  | 1 "  |
| Tout nouveau. En voir la figure dans la FLORE, XX, 77.   |  | <b>Enkianthus Hong-Kongensis</b> . . . . .             | 10 "   |
| 1. <b>Dracæna australis</b> . . . . .  | 2 à 25 "                               | <b>Epacris, fort.</b> . . . . .                        | <i>pidce</i> . . . . .3 "  |
| 2. — — <b>Banksi</b> (FLORE) . . . . .   | 3 à 10 "                               | — 12 <i>belles variétés</i> . . . . .                  | 30 "   |
| 6. — — <b>congesta</b> . . . . .   | 1 "                                    | <b>Epigynium leucobotrys</b> . . . . .                 | 8 "  |
| 14. — — <b>indivisa</b> . . . . .  | 2 à 30 "                               | <b>Erica du Cap.</b> . . . . .                         | <i>pidce</i> . . . . .4 "  |
| 43. — — <b>lentiginosa</b> . . . . .   | 40 à 60 "                              | — 12 <i>belles variétés</i> . . . . .                  | 40 "   |
| 15. — — <b>lineata</b> . . . . .   | 2 à 30 "                               | <b>Eriostemon buxifolium, fort.</b> . . . .            | 5 "  |
| 26. — — <b>rubra</b> . . . . .   | 2 "                                    | — <b>cuspidatum</b> . . . . .                          | 4 "  |
| <b>Drimys Winteri (Magnoliacée)</b> . . . . .  | 2 à 5 "                                | — — <b>rubrum</b> . . . . .                            | 3 "  |
| <b>Duranta brachyoda</b> . . . . .   | 2 "                                    | — <b>densifolium</b> . . . . .                         | 3 "  |
| <b>Dyckia princeps</b> . . . . .   | " "                                    | — <b>floribundum</b> . . . . .                         | 4 "  |
| — <b>remotiflora</b> . . . . .   | 5 "                                    | — <b>intermedium</b> (FLORE, V. 443) . . . . .         | 4 "  |
| <b>Eccremocarpus scaber</b> . . . . .  | 2 "                                    | — <b>linifolium</b> . . . . .                          | 4 "  |
|  |  | — <b>myoporoides</b> . . . . .                         | 4 "  |
| Plante grimpante, presque rustique, de toute beauté; floraison extrêmement abondante, une fois la plante bien établie. |  | — <b>neriifolium</b> . . . . .                         | 4 à 10 "   |
| 1. <b>Echeveria abyssinica</b> . . . . .   | 1 "                                    | — <b>ovatum</b> . . . . .                              | 4 "  |
| 2. — — <b>agavoides</b> . . . . .  | 6 à 25 "                               | — <b>pulchellum</b> . . . . .                          | 5 "  |
| 19. — — <b>californica</b> . . . . .   | 2 "                                    | — <b>scabrum</b> . . . . .                             | 4 à 6 "  |
| 20. — — <b>viridis</b> . . . . .   | 2 "                                    | <b>Erythrina. — Voir plus loin aux spé-</b>            |  |
| 21. — — <b>carinata</b> . . . . .  | 4 "                                    |  | <i>cialités.</i>   |
| 40. — — <b>Desmetiana</b> . . . . .  | 10 "                                   | <b>Escallonia caracasana</b> . . . . .                 | 2 "  |
| 22. — — <b>discolor</b> . . . . .  | 2 "                                    | <b>Eucalyptus coriacea</b> . . . . .                   | 1 "  |
| 17. — — <b>farinosa</b> . . . . .  | 3 "                                    | — <b>collosa</b> . . . . .                             | 2 "  |
| 4. — — <b>glauca</b> . . . . .   | 50 "                                   | — <b>Globulus</b> . . . . .                            | 1 "  |
|  | <i>les douze</i> . . . . .5 "          | <b>Eugenia apiculata</b> . . . . .                     | 2 "  |
| Très-recherché; on en forme de charmantes bordures en pleine terre, en été.  |  | — <b>Ugni</b> . . . . .                                | 2 "  |
| 14. — — <b>globosa (rosacea)</b> . . . . .   | 1 à 3 "                                | Petites prunes rouge corail, comestibles.              |  |
| 24. — — <b>hybrida</b> . . . . .   | 5 "                                    | <b>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</b> . . . . . | 15 "   |
| 5. — — <b>lutea grandiflora</b> . . . . .  | 1 "                                    |  |  |



|  | Fr. C.   |
|--|----------|
| <i>Euphorbia Monteiri</i> . . . . .  | 15 "     |
| <i>Eurya latifolia foliis variegatis</i> . . . . .   | 2 à 5 "  |
| <i>Eurybia alpina</i> . . . . .  | 2 "      |
| <i>Fagelia bituminosa</i> . . . . .  | 2 "      |
| <i>Fitz-Roya patagonica</i> . . . . .  | 5 "      |
| (FLORE, VII, 139.)   |          |
| <i>Garrya elliptica</i> . . . . .  | 5 "      |
| Soignez les <i>Garrya</i> aux longues grappes si étranges, à fleurs vertes en longues queues de renard. Un peu arbrétés de nos froids du nord, ces arbustes si bizarres sont déjà rustiques au sud de Paris.   |          |
| — <i>Mac Fadyeni</i> . . . . .   | 2 "      |
| <i>Gasteria nigricans</i> . . . . .  | 3 "      |
| — <i>verrucosa</i> . . . . .   | 4 "      |
| <i>Gelsemium sempervirens</i> . . . . .  | 1 "      |
| <i>Genetyllis tulipifera</i> . . . . .   | 4 à 10 " |
| (FLORE, X, 227.)   |          |
| Arbuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-grandes fleurs crème striolée et rubané de rouge. De la Rivière des Cygnes, en Australie; cet arbuste si aristocratique veut de l'air et des arrosements intelligents.  |          |
| 1837. <i>Globba Rœzli</i> . . . . .  | 3 "      |
| 1836. — <i>saltatoria (Mantisia)</i> . . . . .   | 5 "      |
| Nous avons figuré à la page 41 du XX <sup>e</sup> volume de la FLORE, cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil tenu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet. |          |
| <i>Gnaphalium eximium (Astelma)</i> . . . . .  | 3 "      |
| (FLORE, XXII.)   |          |
| — <i>lanatum</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>les douze</i> . . . . .   | 5 "      |
| — <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>les douze</i> . . . . .   | 5 "      |
| — <i>tomentosum</i> . . . . .  | 1 "      |
| <i>Gnidia pinifolia</i> . . . . .  | 3 "      |
| <i>Gompholobium polymorphum grandiflorum</i> . . . . .   | 5 "      |
| — <i>splendens</i> . . . . .   | 6 "      |
| <i>Gonocalyx pulcher</i> . . . . .   | 2 "      |
| <i>Grevillea alpestris (FLORE, XIV, 149)</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>cuneata</i> . . . . .   | 1 "      |
| — <i>flexuosa</i> . . . . .  | 4 "      |
| — <i>longifolia</i> . . . . .  | 3 à 6 "  |
| — <i>Manglesi</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>robusta</i> . . . . .   | 2 "      |
| <i>Greyia Sutherlandi (FLORE, XVII, 45)</i> . . . . .  | 5 "      |
| Magnifique arbuste plein d'avenir; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant. Déjà comme naturalisé en Provence où il est rustique.   |          |
| <i>Griselinia littoralis</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>macrophylla</i> . . . . .   | 2 "      |
| <i>Gynerium</i> . — <i>Voir plus loin</i> .  |          |
| <i>Hakea cristata</i> . . . . .  | 3 "      |
| — <i>Victoria</i> . . . . .  | 3 "      |
| <i>Hardenbergia macrophylla</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>monophylla foliis variegatis</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>ovata</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>alba</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>lilacina</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>rosea</i> . . . . .   | 2 "      |

|  | Fr. C.   |
|--|----------|
| <i>Haworthia translucens</i> . . . . .   | 5 "      |
| <i>Helichrysum macranthum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>grandiflorum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>humile</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>purpureum</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>roseum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>speciosissimum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>spectabile</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>splendens</i> . . . . .   | 3 "      |
|  L'Établissement livre de belles plantes de toutes ces variétés, brillantes immortelles aux nombreuses fleurs de couleur magenta. |          |
| — <i>proliferum</i> . . . . .  | 4 à 10 " |
| <i>Hibbertia Reidi</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>volubilis foliis purpureis</i> . . . . .  | 2 "      |
| <i>Hovea Celsi</i> . . . . .   | 1 "      |
| Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande; fleurs d'un beau bleu, de longue durée.  |          |
| <i>Hymenocallis adnata princeps</i> . . . . .  | 2 à 5 "  |
| Amaryllidée à odeur suave; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme.  |          |
| — <i>caribæa</i> . . . . .   | 4 "      |
| <i>Ilex cornuta (FLORE, IX, 99)</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>crenata (Fortune)</i> . . . . .   | 1 "      |
| — <i>Dahoon</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>dipyrena</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>furcata</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>grandis</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>japonica, fort</i> . . . . .  | 3 "      |
| — <i>magellanica</i> . . . . .   | 1 "      |
| — <i>Perado</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>prunifolia</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>rigida</i> . . . . .  | 1 "      |
| <i>Illicium anisatum (parviflorum)</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>floridanum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>religiosum</i> . . . . .  | 2 "      |
| <i>Indigofera australis</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>decora</i> . . . . .  | 1 50 "   |
| — <i>Roylei</i> . . . . .  | 1 "      |
| <i>Iochroma coccineum</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>Tonelianum</i> . . . . .  | 4 "      |
| Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.   |          |
| — <i>Warscewiczii</i> . . . . .  | 2 "      |
| <i>Iresine acuminata</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>aureo-variegata</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>Lindenii</i> . . . . .  | 50 "     |
| — <i>Verschaffeltii</i> . . . . .  | 50 "     |
| — <i>aureo-variegata</i> . . . . .   | 50 "     |
| <i>Jasminum gracile</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>grandiflorum</i> . . . . .  | 1 "      |
| — <i>odoratissimum</i> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>Poiteau</i> . . . . .   | 1 50 "   |
| — <i>Reevesii</i> . . . . .  | 1 "      |
| Fleurit tout l'hiver.  |          |
| — <i>tenuifolium</i> . . . . .   | 2 "      |
| 38. <i>Jovellana punctata, fort</i> . . . . .  | 2 à 4 "  |
| (FLORE, VIII, 85.)   |          |
| Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.  |          |



|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| <i>Kadsura japonica</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>foliis variegatis</i> . . . . .   | 3 "        |
| <b>Kennedy</b> <i>audomarensis</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>bimaculata</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>coccinea</i> . . . . .  | 4 "        |
| — <i>eximia</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>Fredwoodi</i> . . . . .   | 3 "        |
| — <i>Licheriana</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>Lindleyana</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>longiracemosa</i> . . . . .   | 3 "        |
| — <i>Marryatti</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>mollis</i> . . . . .  | 4 "        |
| — <i>monophylla rosea</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>nigricans</i> . . . . .   | 4 "        |
| — <i>ovata</i> . . . . .   | 2 "        |
| — — <i>alba</i> . . . . .  | 2 "        |
| — — <i>lilacina</i> . . . . .  | 2 "        |
| — — <i>rosea</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>rotundifolia</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>rubicunda major</i> . . . . .   | 2 "        |
| <b>Kleinia</b> <i>cana</i> . . . . .   | 1 "        |
| — <i>ficoides</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>repens</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>spinulosa</i> . . . . .   | 1 "        |
| <b>Knightia</b> <i>excelsa</i> , <i>fort</i> . . . . .   | 10 à 25 "  |
| 1855. <i>Lachenalia fragrans</i> . . . . .   | 1 25       |
| 1857. — <i>pendula tricolor</i> . . . . .  | 1 50       |
| (FLORE, XVII, 161.)  |            |
| 1858. — <i>quadricolor</i> . . . . .   | 1 50       |
| 1860. — <i>tricolor</i> . . . . .  | 1 25       |
| 1862. — <i>versicolor</i> . . . . .  | 1 50       |
| <b>Lalage</b> <i>tenuifolia</i> . . . . .  | 2 "        |
| <b>Lapageria</b> <i>alba</i> (FLORE, XX, 29) . . . . .   | 50 à 300 " |
| Espèce à fleurs blanches, très-rare.   |            |
| — <i>rosea</i> . . . . .   | .4 à 15 "  |
| <i>extra-fort</i> . . . . .  |            |
| (FLORE, V, 491 et XX, 29.)   |            |
| Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. |            |
| <b>Laurelia</b> <i>aromatica</i> . . . . .   | 2 "        |
| <b>Laurus</b> <i>Camphora</i> , <i>très-fort</i> . . . . .   | .5 à 10 "  |
| C'est le <i>Camphrier</i> . Belles tiges de près d'un mètre, magnifique feuillage! A cultiver à la manière des Lauriers; propre à former des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera.  |            |
| — <i>glandulosa</i> , <i>très-fort</i> . . . . .   | .5 à 10 "  |
| — <i>nobilis</i> , <i>de toutes dimensions et accouplés</i> . . . . .  | 1 à 1200 " |
| <b>Leptodactylon</b> ( <i>Gilia</i> ) <i>californicum</i> . . . . .  | 3 "        |
| (FLORE, XI, 79.)   |            |
| <b>Leucopogon</b> <i>Richei</i> . . . . .  | .3 à 15 "  |
| <b>Libertia</b> <i>ixioides</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>pulchella</i> . . . . .   | 10 "       |
| — <i>tricolor</i> . . . . .  | 2 "        |
| <b>Libocedrus</b> ( <i>Thuia</i> ) <i>chilensis</i> . . . . .  | 2 à 5 "    |
| — — — <i>viridis</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>Deniana</i> . . . . .   | 5 "        |

|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| <b>Libonia</b> <i>floribunda</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>penrhosiensis</i> . . . . .  | 2 "        |
| Les <i>Libonias</i> sont de charmants arbustes fleurissant abondamment pendant l'hiver; leurs clochettes les garnissent de haut en bas.   |            |
| <b>Lierres</b> . — Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. — Voir <i>Hedera</i> aux <i>Arbustes rustiques</i> , Cat. n° 165, page 403.) |            |
| 382. <b>Ligularia</b> <i>cristata</i> . . . . .   | 1 "        |
| 383. — <i>Kämpferi</i> . . . . .  | 1 "        |
| 384. — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . . .  | 2 à 5 "    |
| Plante vivace du Japon; grand feuillage de toute beauté.  |            |
| <b>Ligustrum</b> <i>glabrum foliis striatis</i> . . . . .   | 1 "        |
| — <i>japonicum foliis argenteo-mar-ginatis</i> . . . . .  | 3 "        |
| — — — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .   | 2 "        |
| — — — <i>lineare</i> . . . . .  | 2 "        |
| <b>Linaria</b> <i>triornithophora</i> . . . . .   | 1 "        |
| <b>Linum</b> <i>Crayanum</i> . . . . .  | 2 "        |
| <b>Lithospermum</b> <i>fruticosum</i> . . . . .   | 1 "        |
| Cultivé en petite tête bien taillée, c'est un vrai bijou à fleurs du plus beau bleu.  |            |
| 1865. <b>Littonia</b> <i>modesta</i> (FLORE, IX, 9) . . . . .   | 1 50       |
| Voisine du <i>Gloriosa superba</i> (Methonica): même rhizome.   |            |
| <b>Lobelia</b> <i>erinoides Purity</i> . . . . .  | " 50       |
| Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures.  |            |
| — — <i>True blue</i> . . . . .  | " 50       |
| Bonne variété bleue pour bordures.  |            |
| — <i>pumila grandiflora flore pleno</i> . . . . .   | " 50       |
| Esquisse nouveauté, très-naine; nombreuses fleurs doubles d'un riche bleu très-foncé.   |            |
| <b>Lolium</b> <i>perenne foliis argenteo-varieg.</i> . . . .  | 1 "        |
| <b>Lomatia</b> <i>Bidwilli</i> . . . . .  | .4 à 10 "  |
| — <i>elegantissima</i> . . . . .  | .6 à 15 "  |
| — <i>ferruginea</i> . . . . .   | .2 à 6 "   |
| — <i>heterophylla</i> . . . . .   | .4 à 10 "  |
| — <i>ilicifolia</i> . . . . .   | 3 "        |
| — <i>polyantha</i> . . . . .  | .4 à 10 "  |
| — <i>silaifolia</i> . . . . .   | .3 à 8 "   |
| Les <i>Lomatia</i> de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.  |            |
| <b>Lophospermum</b> <i>coccineum</i> . . . . .  | 1 "        |
| — <i>grandiflorum</i> . . . . .   | 1 50       |
| — <i>Hendersoni</i> . . . . .   | 1 50       |
| — <i>scandens</i> . . . . .   | 1 50       |
| <b>Macadamia</b> <i>termifolia</i> (FLORE, XXII) . . . . .  | .3 à 10 "  |
| Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay).   |            |
| <b>Magnolia</b> <i>Campbelli</i> . . . . .  | .15 à 30 " |
| (FLORE, XII, 189.)  |            |
| — <i>fuscata</i> . . . . .  | .3 à 6 "   |
| Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.   |            |
| — <i>grandiflora</i> . . . . .  | 1-50 à 8 " |
| — <i>exoniensis</i> . . . . .   | .4 à 8 "   |
| Beau feuillage très-décoratif, requérant l'orangerie dans nos parages septentrionaux. Feuilles à revers ferrugineux.  |            |
| <b>Mahonia</b> <i>Ehrenbergi</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>gracilis</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>japonica</i> (FLORE) . . . . .   | 2 "        |
| — <i>Leschenaulti</i> . . . . .   | 5 "        |




|                                     | Fr. C. |
|-------------------------------------|--------|
| <i>Mahonia nepalensis</i> . . . . . | 2 "    |
| — <i>pallida</i> . . . . .          | 3 "    |
| — <i>trifurca</i> . . . . .         | 3 "    |

Les *Mahonias* sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-large dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

|   |     |
|---|-----|
| <i>Mandevillea suaveolens</i> . . . . . | 1 " |
| (FLORE, XI, 139.)                       |     |

*Jasmin du Chili*. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses. Originaire de la latitude de Buénos-Ayres d'où l'introduisit John Tweedie, notre vieux compagnon de voyage à la lisière du Paraguay. Cet arbrisseau est déjà acclimaté dans le midi de la France.

|  |     |
|--|-----|
| <i>Marica cœrulea</i> . . . . .                        | 2 " |
| Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre. |     |



MACADAMIA TERNIFOLIA. — 3 à 10 francs.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 47. <i>Mesembrianthemum agninum</i> . . . . . | 1 "    |
| 48. — <i>albicaule</i> . . . . .              | " 50   |
| 1. — <i>albinotum</i> . . . . .               | 2 "    |
| 49. — <i>aureum</i> . . . . .                 | " 50   |
| 2. — <i>barbatum</i> . . . . .                | 1 "    |
| 51. — <i>bicolorum</i> . . . . .              | " 50   |
| 50. — <i>blandum</i> . . . . .                | " 50   |
| 3. — <i>bulbosum</i> . . . . .                | 1 "    |
| 52. — <i>candens</i> . . . . .                | " 50   |
| 5. — <i>caulescens</i> . . . . .              | 1 "    |
| 53. — <i>coccineum</i> . . . . .              | " 50   |
| 6. — <i>cordifolium</i> . . . . .             | " 50   |
| 7. — <i>variegatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 54. — <i>corniculatum</i> . . . . .           | 2 "    |
| 8. — <i>crassifolium</i> . . . . .            | 1 "    |
| 55. — <i>curviflorum</i> . . . . .            | " 50   |
| 9. — <i>deltoides</i> . . . . .               | 1 "    |
| 11. — <i>echinatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 12. — <i>Ecklonii</i> . . . . .               | " 50   |
| 13. — <i>edule</i> . . . . .                  | 1 "    |
| 14. — <i>elegans</i> . . . . .                | " 50   |
| 15. — <i>falcatum</i> . . . . .               | " 50   |
| 57. — <i>falciforme</i> . . . . .             | " 50   |
| 58. — <i>fastigiatum</i> . . . . .            | " 50   |

|  | Fr. C. |
|--|--------|
| 59. <i>Mesembrianthemum foliosum</i> . . . . . | " 50   |
| 60. — <i>geminiflorum</i> . . . . .            | " 50   |
| 19. — <i>glaucum</i> . . . . .                 | " 50   |
| 61. — <i>Haworthii</i> . . . . .               | " 50   |
| 62. — <i>imbricatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 20. — <i>inclaudens</i> . . . . .              | " 50   |
| 21. — <i>inflexum</i> . . . . .                | " 50   |
| 63. — <i>intonsum</i> . . . . .                | " 50   |
| 64. — <i>laxum</i> . . . . .                   | " 50   |
| 22. — <i>Lehmanni</i> . . . . .                | " 50   |
| 65. — <i>lepidum</i> . . . . .                 | " 50   |
| 66. — <i>lineolatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 23. — <i>lunatum</i> . . . . .                 | " 50   |
| 24. — <i>lupinum</i> . . . . .                 | 2 "    |
| 26. — <i>molle</i> . . . . .                   | 1 "    |
| 69. — <i>moschatum</i> . . . . .               | " 50   |
| 70. — <i>multiceps</i> . . . . .               | 1 "    |
| 87. — <i>multipunctatum</i> . . . . .          | 1 "    |
| 27. — <i>muricatum</i> . . . . .               | 1 "    |
| 29. — <i>perfoliatum</i> . . . . .             | " 50   |
| 31. — <i>rhomboideum</i> . . . . .             | 2 "    |
| 71. — <i>rigidicaule</i> . . . . .             | " 50   |
| 72. — <i>rigidum</i> . . . . .                 | " 50   |
| 73. — <i>sarmentosum</i> . . . . .             | " 50   |
| 74. — <i>Scholli</i> . . . . .                 | " 50   |
| 75. — <i>serrulatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 33. — <i>simplex</i> . . . . .                 | 2 "    |
| 34. — <i>spectabile</i> . . . . .              | " 50   |
| 77. — <i>subincanum</i> . . . . .              | " 50   |
| 78. — <i>subrectum</i> . . . . .               | " 50   |
| 35. — <i>tigrinum</i> . . . . .                | 2 "    |
| 79. — <i>tuberosum</i> . . . . .               | " 50   |
| 80. — <i>umbellatum</i> . . . . .              | " 50   |
| 41. — <i>uncinatum</i> . . . . .               | " 50   |
| 36. — <i>uncinellum</i> . . . . .              | " 50   |
| 82. — <i>unitum</i> . . . . .                  | 2 "    |
| 83. — <i>verruculatum</i> . . . . .            | 1 "    |
| 84. — <i>violaceum</i> . . . . .               | 1 "    |
| 85. — <i>virescens</i> . . . . .               | " 50   |
| 86. — <i>virgatum hamatum</i> . . . . .        | " 50   |

MESEMBRIANTHEMUM.

JE LIVRE A MON CHOIX :

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 12 espèces pour . . . . . | 5 "  |
| 25 — — . . . . .          | 10 " |


|   |         |
|---|---------|
| <i>Metrosideros angustifolia flore albo</i> . . . . . | 3 "     |
| — <i>buxifolia</i> . . . . .                          | 3 "     |
| — <i>florida foliis variegatis</i> . . . . .          | 2 à 5 " |
| — <i>robusta</i> . . . . .                            | 3 à 6 " |
| — <i>rubrifolia</i> . . . . .                         | 2 "     |
| — <i>semperflorens</i> . . . . .                      | 1 "     |

|   |     |
|---|-----|
| <i>Mimulus luteus foliis variegatis</i> . . . . . | 1 " |
| (FLORE, XVIII, 5.)                                |     |

Feuilles tricolores.

|  |     |
|--|-----|
| <i>Mitraria coccinea</i> (FLORE, IV, 385) . . . . .  | 3 " |
| Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloe, au Chili. Nombreuses clochettes vermillonnées. |     |



|   | Fr. C.   |
|---|----------|
| <b>Monanthes polyphylla</b> . . . . .   | 1 "      |
| Joubarbe liliputienne.  |          |
| <b>Monochætum ensiferum</b> . . . . .   | 2 "      |
| — <i>hyb. Lemoinei</i> . . . . .  | 2 "      |
| — <i>sericeum multiflorum</i> . . . . .   | 2 "      |
| <b>Moræa bicolor</b> ( <i>Dietes</i> ) (FLORE, VII, 273). . . . .   | 2 "      |
| — <i>viridifolia</i> . . . . .  | 1 "      |
| <b>Mussaëa Wollastoni</b> . . . . .   | 2 "      |
| <b>Myrtus bullata</b> (FLORE, X, 165) . . . . .   | 2 "      |
| — <i>communis, tête</i> . . . . .   | 5 "      |
| — <i>flore pleno, tête sur tige</i> . 1-50 à 8 "  |          |
| — <i>Franklini</i> . . . . .  | 2 "      |
| <b>Nandina domestica</b> . . . . .  | 3 "      |
| — <i>— purpurea</i> . . . . .   | 5 "      |
| 1. <b>Nerium album maximum</b> . . . . .  | 2 "      |
| 15. — <i>— simplex</i> . . . . .  | 3 "      |
| 6. — <i>atropurpureum flore pleno</i> . . . . .   | 2 "      |
| 16. — <i>— duplex</i> . . . . .   | 2 "      |
| 7. — <i>cardinale</i> . . . . .   | 2 "      |
| 5. — <i>carneum</i> . . . . .   | 2 "      |
| 17. — <i>— semiduplex</i> . . . . .   | 2 "      |
| 8. — <i>Columbianum album plenum</i> . . . . .  | 2 "      |
| 12. — <i>flavum (duplex)</i> . . . . .  | 2 "      |
| 19. — <i>Fonscolombianum</i> . . . . .  | 2 "      |
| 9. — <i>luteum novum</i> . . . . .  | 2 "      |
| 13. — <i>Madoni grandiflorum (duplex)</i> . . . . .   | 2 "      |
| 20. — <i>Oleander</i> . . . . .   | 2 "      |
| 14. — <i>pourpre double</i> . . . . .   | 2 "      |
| 10. — <i>purpureum simplex</i> . . . . .  | 2 "      |
| 18. — <i>— superbum</i> . . . . .   | 2 "      |
| 22. — <i>Ragonoti</i> . . . . .   | 3 "      |
| 3. — <i>rose double</i> . . . . .   | 2 "      |
| 4. — <i>— vif double</i> . . . . .  | 2 "      |
| 2307. <b>Nertera depressa</b> . . . . .   | 50 "     |
| les douze . . . . .   | 4 "      |
| (FLORE, XXI, 39.)   |          |
| <b>Nierembergia frutescens</b> . . . . .  | 50 "     |
| — <i>gracilis</i> . . . . .   | 50 "     |
| — <i>rivularis</i> . . . . .  | 50 "     |
| <b>Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis</b> . . . . .   | 3 "      |
| 971. — <i>Sieboldi</i> . . . . .  | 1 "      |
| 2343. <b>Opuntia Rafinesquiana</b> . . . . .  | 50 "     |
| les douze . . . . .   | 4 "      |
| (FLORE, XXII.)  |          |
| Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante; se mêler de ses aiguillons très-ténus. |          |
| 3. <b>Oranger Bigaradier</b> . . . . .  | 3 à 20 " |
| 7. — <i>du Japon</i> (FLORE, IV, 411b) . . . . .  | 5 "      |
| 4. — <i>— — Daïdai</i> . . . . .  | 5 "      |
| 5. — <i>— — à fruit blanc</i> . . . . .   | 5 "      |
| 6. — <i>— — de Marguerite</i> . . . . .   | 5 "      |
| 15. — <i>Mandarine</i> . . . . .  | 3 "      |
| 2. — <i>de Taïti (Citrus taitensis)</i> . . . . .   | 1 à 2 "  |
| En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.   |          |
|  Je livre des collections d'Orangers<br>(forces et prix par correspondance).   |          |

|  | Fr. C.     |
|--|------------|
| <b>Oreodaphne californicum</b> ( <i>Tetralheca</i> ) . . . . .   | 5 "        |
| Comme un <i>Laurus nobilis</i> .   |            |
| <b>Oreopanax dactylifolia</b> . . . . .  | 12 à 50 "  |
| 2567. <b>Oxalis arborea lutea</b> . . . . .  | 1 "        |
| <b>Pachyphytum bracteosum</b> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>Hookeri</i> . . . . .   | 1 "        |
| Plantes grasses; Crassulées à physionomie des plus bizarres,   |            |
| <b>Parochetus communis</b> (FLORE, XV, 143) . . . . .  | 1 "        |
| Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à la manière des Verveines ou à enguirlander temporairement des vases.  |            |
| 53. <b>Passiflora Buchananii</b> . . . . .   | 2 "        |
| 71. — <i>cærulea</i> . . . . .   | 2 "        |
| 26. — <i>fulgens</i> . . . . .   | 2 "        |
| 39. — <i>Neumanni</i> . . . . .  | 2 "        |
| <b>Perymenium discolor</b> . . . . .   | 1 "        |
| <b>Phanocoma prolifera</b> ( <i>Helichrysum</i> ) . 4 à 10 "   |            |
| <b>Philesia buxifolia, fort.</b> . . . .   | 8 à 15 "   |
| (FLORE, IX, 41.)   |            |
| Diminutif des <i>Lapagerias</i> .  |            |
| <b>Phlox Criterion</b> . . . . .   | 1 "        |
| Très-bel hybride d'orangerie.  |            |
| <b>Phormium Colensoi foliis argenteo-mar-</b><br><b>ginatis</b> . . . . .  | 20 à 150 " |
| — <i>Cookii foliis aureo-variegatis</i> . 15 à 50 "  |            |
| — <i>brevifolium</i> . . . . .   | 15 à 60 "  |
| — <i>tricolor</i> . . . . .  | 50 "       |
| — <i>nigro-marginatum (Saundersi)</i> . 2 à 6 "  |            |
| — <i>tenax</i> . . . . .   | 1 à 2 "    |
| extra-fort . . . . .   | 50 "       |
| — <i>atropurpureum</i> . . . . .   | 40 à 150 " |
| — <i>foliis variegatis</i> . . . . .   | 40 à 250 " |
| — <i>Veitchi</i> . . . . .   | 6 à 40 "   |
| Les <i>Phormiums</i> , ou lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engainantes gladiiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.   |            |
| 1755. <b>Phycella corusca</b> . . . . .  | 3 "        |
| (FLORE, IV, 419.)  |            |
| Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.  |            |
| <b>Phygelius capensis</b> (FLORE, XI, 73). . . . .   | 1 "        |
| C'est pèche que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste souffreteuse. Elle nous arrive du Port-Natal, patrie des <i>Imantophyllum</i> auxquels nous donnons la serre tempérée. Pourquoi n'y accorde-t-on pas une place au <i>Phygelius capensis</i> qui ne mérite pas cet ostracisme? |            |
| <b>Phylca capensis</b> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>magnifica</i> . . . . .   | 2 "        |
| <b>Phyllocladus hypophylla</b> ( <i>Cunninghami</i> ) 75 "   |            |
| (FLORE, XIII, 73.)   |            |
| — <i>rhomboidalis (asplenifolia, Billardieri)</i> . . . . .  | 5 à 10 "   |
| <b>Physianthus albens</b> . . . . .  | 2 "        |
| Attrape-papillons. Les fleurs blanches de cet arbuste brésilien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Voyez-en l'explication dans le XVIII <sup>e</sup> volume de la Flore, page 136. — Les <i>Physianthus albens</i> passent nos étés en plein air.                                       |            |
| <b>Pimelea decussata</b> . . . . .   | 1 "        |
| — <i>elegans</i> . . . . .   | 3 "        |
| — <i>Hendersonii</i> . . . . .   | 3 "        |
| — <i>hispidia</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>mirabilis</i> . . . . .   | 3 "        |



Fr. C.

- Pimelea Neippergiana* . . . . . 4 "  
 — *spectabilis* . . . . . 2 "  
*Pincenectitia*, voir *Beaucarnea*.  
*Pinus palustris (australis)* . . . . . 2 "  
*Pittosporum crassifolium* . . . . . 6 à 15 "

(FLORE, XXI, 13.)

- *macrophyllum foliis variegatis*. 2 à 3 "  
 — *sinense foliis variegatis* . . . . . 2 "

- Pleroma elegans* (FLORE, XV, 61). 2 à 4 "  
 Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violet.

- *macrantha* . . . . . 2 "  
 — — *floribunda* . . . . . 4 "

- Podocarpus acicularis* . . . . . 1 "  
 — *Blumei* . . . . . 15 à 25 "  
 — *Purdieana* . . . . . 4 "

- Podolobium heterophyllum* . . . . . 3 "  
 — *staurophyllum*. . . . . 3 "

- Poinciana Gilliesi* (FLORE, I, 55). . . . . 2 "

Tenez la plante en pot, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, remettez la plante au même lieu, après en avoir rafraîchi la terre et pris un pot plus grand, et vous verrez surgir les boutons à fleurs que le sud a l'habitude de voir. Considérez cet arbuste, qui est du Chili, comme acquis à la France méridionale qui vous en dira des merveilles.

1899. *Polianthes tuberosa foliis varieg.* 5 "  
 La Tubéreuse à feuillage panaché.

- Polygala Dalmatisana* . . . . . 1 à 2 "  
*Portulacaria afra* . . . . . 1 "

1034. *Primula cortusoides amcena grandiflora* . . . . . 50 "

- les douze. . . . . 5 "  
 le cent . . . . . 35 "

Très-grandes fleurs pourpre magenta très-brillant.

(FLORE, XVIII, 163.)

1574. — — — *lilacina* . . . . . 50 "  
 les douze. . . . . 5 "  
 le cent . . . . . 35 "

(FLORE, XIX, 35.)

2022. — — — — *rosalba, fort.* . . . . . 1 "  
 les douze. . . . . 10 "  
 le cent . . . . . 75 "

709. — *denticulata* . . . . . 50 "  
 les douze. . . . . 5 "

1575. — *japonica* (FLORE, XIX, 31) . . . . . 1 "

2357. — — *alba* . . . . . 3 "

2458. — — *carminata* . . . . . 3 "

2359. — — *lilacina* . . . . . 3 "

2360. — — *rosea* . . . . . 3 "

2361. — — *splendida*. . . . . 3 "

Les *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, sont aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.

2569. — *sinensis candidissima plena* . . . . . 3 "

2570. — — *carminata plena*. . . . . 5 "

2571. — — *delicata plena* . . . . . 3 "

2572. — — *filicifolia alba* . . . . . 1 "

2573. — — — *rosea* . . . . . 1 "

2574. — — *flore albo pleno*. . . . . 1 "

2575. — — — *roseo pleno* . . . . . 3 "

2576. — — — *purpurea erecta pleno*. . . . . 5 "

2577. — — — *quadricolor* (FLORE, XXII) 1 "

2578. — — — *Queen of England (fleur pleine)* 5 "

Fr. C.

2579. *Primula sinensis rubra grandiflora*  
 (fleur pleine). . . . . 5 "

2580. — — *The Fairy (fleur pleine)* . . . . . 3 "

- Pronaya elegans*. . . . . 4 "

La plupart d'entre nous n'ont pas connu le *Baron de Pronay*, Magyaré, auquel le baron von Hugel a dédié le joli genre dont il avait découvert le type dans les parages du *Swan River*. Éléant arbuste à fleurs bleu clair.

- Prostanthera Lasianthus* . . . . . 2 "  
 — *nivea* . . . . . 2 "

- Protea acaulis* . . . . . 10 "  
 — *coccinea*. . . . . 10 "

- *mellifera* . . . . . 5 "  
 — *plumosa*. . . . . 10 "

- *speciosa nigra*. . . . . 10 "  
 — — *rubra* . . . . . 8 "

- Pultenaea flava* . . . . . 2 "

2105. *Punica Granatum (Grenadier)*. . . . . 50 "

2111. — — *Comte de Taverna* . . . . . 2 "

2106. — — *flore albo pleno* . . . . . 1 "

2108. — — — *rubro pleno* . . . . . 1 à 50 "

2109. — — — — *prolifera* . . . . . 1 "

2112. — — — *à fruit aigre*. . . . . 1 "

2113. — — — *à gros fruit, de Malte* . . . . . 1 "

2115. — — — *à gros grains blancs*. . . . . 1 "

2114. — — — *de Provence* . . . . . 1 "

2107. — — — *Legrelliae flore pleno* . . . . . 1 "

(FLORE, XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra-doubles.

2116. — — — *monstrueux d'Espagne* . . . . . 1 "

2117. — — — *sans pepins* . . . . . 1 "

- Quercus glabra* . . . . . 2 à 5 "

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (littoral sud et ouest).

- *ilicifolia*. . . . . 3 "  
 — *stricta (japonica)* . . . . . 25 "

- Raphiolepis ovata* . . . . . 1 à 2 "

L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.

508. *Reineckia carnea fol. albo-vittatis*. 1 "  
 les douze. . . . . 10 "

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

- Rhipidodendron distichum majus*. 20 à 200 "

*Aloe* d'une grande rareté et dont l'Établissement est l'un des rares possesseurs.

1266. *Rhodea crinita* . . . . . 25 "

1267. — *japonica macrophylla foliis aureo-marginatis*. . . . . 3 à 25 "

- — — *aureo-striatis*. 20 à 50 "

- Rhodochiton volubile* . . . . . 2 "

- Rhododendron*. — Le *Prix-Courant* paraîtra en août prochain.

- Rhodomyrtus tomentosa* . . . . . 2 "

- Rhynchospermum jasminoides* . . . . . 2 "

- — *foliis albo-variegatis*. . . . . 2 "

- — — *punctatis* . . . . . 2 "

- — — *aureo-variegatis* . . . . . 2 "

1900. *Richardia africana (Calla)* . . . . . 50 "

1901. — *albo-maculata* (—) . . . . . 1 "

(FLORE, XXI, 165.)

- les douze. . . . . 10 "




|  | Fr. C. |
|--|--------|
| <i>Rochea falcata</i> . . . . .  | 1 "    |
| <i>Roella ciliata</i> (FLORE, V, 517) . . . . .  | 3 "    |
| <i>Rozelia regia</i> . . . . .   | 5 "    |
| <i>Rondeletia anomala</i> . . . . .  | 1 "    |
| <i>Rubus australis</i> . . . . .   | 2 "    |
| 8. <i>Sarracenia Drummondii</i> . . . . .  | 25 "   |
| 2. — <i>flava</i> . . . . .  | 5 "    |
| 3. — <i>psittacina</i> (FLORE, XX, 33) . . . . .   | 10 "   |
| les douze . . . . .  | 100 "  |
| Le plus nain et le plus beau des <i>Sarracenias</i> . Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose. Nous venons d'en introduire du pays natal. |        |
| 4. — <i>purpurea</i> (FLORE, X, 247) . . . . .   | 2 "    |
| les douze . . . . .  | 18 "   |
| Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes et veinées de rouge foncé. Parfaitement rustique.  |        |
| 5. — <i>rubra</i> . . . . .  | 5 "    |
| Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleur rouge sang.  |        |
| 6. — <i>variolaris</i> . . . . .   | 8 "    |
| <i>Saxe-Gotha conspicua</i> (FLORE, VII, 83) . . . . .   | 4 "    |
| <i>Saxifraga Fortunei</i> . . . . .  | 1 "    |
| — <i>sarmentosa tricolor</i> (FL., XXI, 125) . . . . .   | 1 "    |
| <i>Scottia brachypetala</i> . . . . .  | 3 "    |
| <i>Scutellaria pulchella purpurea</i> . . . . .  | 2 "    |
| <i>Sedum azoides variegatum</i> . . . . .  | 1 "    |
| — <i>carneum foliis variegatis</i> . . . . .   | 50 "   |
| <i>Sempervivum Bolli</i> . . . . .   | 50 "   |
| — <i>ciliatum</i> . . . . .  | 1 "    |
| — <i>Donkelaari</i> . . . . .  | 1 "    |
| — <i>velutinum</i> . . . . .   | 1 "    |
| <i>Senecio macroglossus</i> (FLORE, XXI, 67) . . . . .   | 2 "    |
| <i>Skimmia fragrans</i> . . . . .  | 3 "    |
| — <i>japonica</i> . . . . .  | 1 "    |
| Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail en panicles.   |        |
| — — — <i>oblata</i> . . . . .  | 1 "    |
| — — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .   | 10 "   |
| <i>Solanum Capsicastrum</i> . . . . .  | 50 "   |
| — <i>foliis variegatis</i> . . . . .   | 1 "    |
| — <i>Ivory</i> . . . . .   | 1 "    |
| <i>Sollya Drummondii</i> . . . . .   | 2 "    |
| — <i>heterophylla</i> . . . . .  | 1 "    |
| <i>Sparmannia africana</i> . . . . .   | 1 "    |
| 27. <i>Stapelia citrina</i> . . . . .  | 3 "    |
| 38. — <i>Decaisneana</i> . . . . .   | 3 "    |
| 5. — <i>deflexa</i> . . . . .  | 2 "    |
| 7. — <i>europaea</i> . . . . .   | 2 "    |
| 10. — <i>grandiflora</i> . . . . .   | 3 "    |
| 40. — <i>hirsuta</i> . . . . .   | 3 "    |
| 29. — <i>hirtella</i> . . . . .  | 3 "    |
| 12. — <i>marmorata</i> . . . . .   | 3 "    |
| 30. — <i>mutabilis</i> . . . . .   | 3 "    |
| 15. — <i>picta</i> . . . . .   | 3 "    |
| 16. — <i>pilosissima</i> . . . . .   | 3 "    |
| 34. — <i>Planti</i> . . . . .  | 3 "    |
| 1. — <i>reticulata</i> . . . . .   | 3 "    |
| 19. — <i>revoluta</i> . . . . .  | 3 "    |
| 21. — <i>Thureti</i> . . . . .   | 3 "    |
| 31. — <i>variegata</i> . . . . .   | 3 "    |

|   | Fr. C.     |
|---|------------|
| 32. <i>Stapelia Woodfordi</i> . . . . .   | 3 "        |
| Ces <i>Stapelias</i> sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les préserver de tout arrosement; nous pouvons les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie où s'épanouissent leurs curieuses fleurs. |            |
| <i>Statice arborea</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>Holfordi</i> . . . . .   | 3 à 6 "    |
| — <i>imbricata</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>macrophylla</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>Stauntonia hexaphylla</i> . . . . .  | 10 "       |
| — <i>latifolia</i> . . . . .  | 5 à 10 "   |
| <i>Stenocarpus Cunninghami</i> ( <i>Agnostus</i> ) (FLORE, III, 189) . . . . .  | 5 à 20 "   |
| — — <i>integrifolius</i> . . . . .  | 4 à 20 "   |
| 1906. <i>Stenomesson Hartwegi</i> . . . . .   | 1 "        |
| les douze . . . . .   | 10 "       |
| 1907. — <i>stramineum</i> . . . . .   | 1 "        |
| les douze . . . . .   | 10 "       |
| <i>Stylidium adnatum</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>suffruticosum</i> . . . . .  | 3 "        |
| <i>Styphelia tubiflora</i> . . . . .  | 3 "        |
| <i>Swainsonia alba</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>Ferrandi atropurpurea</i> . . . . .  | 2 "        |
| — — — <i>nana</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>Grayi</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>Osbornei</i> . . . . .   | 2 "        |
| — <i>Rollissoni</i> . . . . .   | 2 "        |
| Les <i>Swainsonia</i> sont ligneux; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs et des graines qui servent à les perpétuer.  |            |
| 53. <i>Tacsonia Buchanani</i> . . . . .   | 2 "        |
| 60. — <i>eriantha</i> (FLORE, XVIII, 159) . . . . .   | 2 "        |
| 70. — <i>exoniensis</i> . . . . .   | 2 "        |
| 54. — <i>igneae</i> . . . . .   | 2 "        |
| 75. — <i>insignis</i> . . . . .   | 10 "       |
| 55. — <i>manicata</i> . . . . .   | 2 "        |
| 57. — <i>pinnatistipitula</i> . . . . .   | 3 "        |
| 73. — <i>quitensis eriantha</i> . . . . .   | 2 "        |
| 74. — <i>splendens</i> . . . . .  | 3 "        |
| 59. — <i>Van Volxemi</i> . . . . .  | 2 "        |
| Précieuses <i>Passiflores</i> de serre froide, fleurissant abondamment pourvu que le vase qui les contient soit progressivement plus grand et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas marchandés.  |            |
| <i>Tasmannia aromatica</i> . . . . .  | 2 à 5 "    |
| <i>Tecoma australis</i> . . . . .   | 1 "        |
| — <i>capensis</i> . . . . .   | 1 "        |
| — <i>jasminoides</i> . . . . .  | 1 "        |
| — — <i>alba magna</i> . . . . .   | 2 "        |
| — — <i>splendida</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>mirabilis</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>Testudinaria elephantipes</i> ( <i>Tamus</i> ), très-fort . . . . .  | 25 à 100 " |
| <i>Teucrium aureum</i> . . . . .  | 1 "        |
| <i>Thea assamica</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>Bohea</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>cochinchinensis</i> . . . . .  | 3 "        |
| — <i>japonica foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .  | 2 "        |
| — <i>viridis</i> . . . . .  | 2 "        |
| <i>Themistoclesia Coronilla</i> . . . . .   | 10 "       |
| <i>Thibaudia acuminata</i> . . . . .  | 6 "        |
| — <i>vaccinifolia</i> . . . . .   | 3 "        |



|  | Fr. C.   |  | Fr. C.     |
|--|----------|--|------------|
| <b>Torreya bogotensis</b> . . . . .  | 5 à 10 " | 31. <b>Veronica Mad. Henry-Jacotot</b> . . . . .                       | " 50       |
| — <b>grandis</b> . . . . .   | 3 "      | 29. — <b>Mad. Marie Boucharlat</b> . . . . .                           | " 50       |
| — <b>Humboldtiana</b> . . . . .  | 3 à 8 "  | 41. — <b>Mad. Trezel</b> . . . . .                                     | " 50       |
| — <b>Myristica</b> . . . . .   | 3 "      | 33. — <b>multiflora</b> . . . . .                                      | " 50       |
| <b>Tremandra ericæfolia</b> . . . . .  | 3 "      | 46. — <b>Murillo (Lemoine)</b> . . . . .                               | 2 "        |
| — — <b>ciliaris</b> . . . . .  | 4 "      | 30. — <b>rubra splendida (Boucharlat)</b> . . . . .                    | " 50       |
| <b>Trichinium Manglesi</b> . . . . .   | 3 "      | 45. — <b>Socrate (Lemoine)</b> . . . . .                               | 2 "        |
| 1085. <b>Tricyrtis spec. foliis eleganter</b><br><b>striatis (FLORE, XVIII, 1)</b> . . . . . | 2 "      | <b>Viburnum Tinus (Laurus Tinus),</b><br><b>belles têtes</b> . . . . . | 1 à 100 "  |
| Panachure aussi belle que celle de l' <i>Arundo</i> .  |          | <b>Weinmannia trichosperma, fort.</b> . . . .                          | 5 à 20 "   |
| 1910. <b>Tropæolum albiflorum</b> . . . . .  | 25 "     | <b>Witsenia corymbosa</b> . . . . .                                    | 4 à 8 "    |
| (FLORE, III, 241.)   |          | <b>Xanthorrhœa australis</b> . . . . .                                 | 15 à 25 "  |
| Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.   |          | <b>Yucca albo-spica (FL., XVII, 110)</b> . . . . .                     | 3 à 25 "   |
| 1911. — <b>azureum grandiflorum</b> . . . . .  | 3 "      | — <b>aloifolia foliis variegatis, fort</b> . . . . .                   | 5 à 50 "   |
| (FLORE, II, 1846, mai 7.)  |          | — — <b>purpurea (FLORE, XXII)</b> . . . . .                            | 5 "        |
| Capucine à fleurs bleues.  |          | — <b>aspera</b> . . . . .  | 10 à 20 "  |
| 2498. — <b>brachyceras (FLORE, IV, 369)</b> . . . . .  | 2 "      | — <b>baccata</b> . . . . .   | 50 "       |
| — <b>Minnie Warren</b> . . . . .   | 1 "      | — <b>canaliculata</b> . . . . .  | 10 à 30 "  |
| — <b>minus flore pleno</b> . . . . .   | 1 "      | — <b>conspicua</b> . . . . .   | 10 "       |
| 1915. — <b>tricolorum grandiflorum</b> . . . . .   | 2 "      | — <b>Draconis</b> . . . . .  | 5 à 15 "   |
| <b>les douze</b> . . . . .   | 20 "     | — <b>filamentosa foliis variegatis</b> . . . . .                       | " "        |
| <b>Uhdea pyramidata</b> . . . . .  | 1 "      | — <b>gloriosa medio-striata</b> . . . . .                              | " "        |
| <b>Vaccinium erythrinum (FLORE, XI, 81)</b> . . . . .  | 5 "      | — <b>lutescens</b> . . . . .   | 15 "       |
| 1766. <b>Valloia purpurea</b> . . . . .  | 1 "      | — <b>quadricolor, forts</b> . . . . .                                  | 15 à 100 " |
| <b>les douze</b> . . . . .   | 10 "     | — — <b>la couple, très-forts</b> . . . . .                             | 300 "      |
| 42. <b>Veronica Claudine (Willermoz)</b> . . . . .   | " 50     | — <b>recurvata</b> . . . . .   | 2 à 10 "   |
| 47. — <b>Diogène (Lemoine)</b> . . . . .   | 2 "      | — <b>spiralis</b> . . . . .  | 25 "       |
| 48. — <b>Erasmus ( )</b> . . . . .   | 2 "      | — <b>stricta (angustifolia)</b> . . . . .                              | 5 à 100 "  |
| 35. — <b>Gloire de Lorraine</b> . . . . .  | " 50     | — <b>Treculeana</b> . . . . .  | 10 à 250 " |
| 4. — <b>Hendersoni alba (Lejeune)</b> . . . . .  | " 50     | — <b>Whipplei (californica)</b> . . . . .                              | 5 "        |
| 38. — <b>imperialis (Boucharlat)</b> . . . . .   | " 50     | <b>les douze</b> . . . . .   | 50 "       |
| 39. — <b>Lindleyana humilis</b> . . . . .  | " 50     |  |            |





MUSA ENSETE. — Graines garanties de première fraîcheur, tout récemment importées :  
la graine : fr. 1-75; — la douzaine : 18 francs; — le cent : 125 francs.



## SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA

disponibles d'Août en Mars-Avril.

 Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août. 

## CACTÉES.

|  | Fr. C.    |  | Fr. C.    |
|--|-----------|--|-----------|
| 408. <i>Anhalonium prismaticum</i> . . . . .   | 150 "     | 500. <i>Cereus serpentinus albispinus</i> . . . . .  | 5 "       |
| 82. <i>Astrophytum myriostigma</i> . . . . .   | .8 à 25 " | 506. — <i>Spachianus</i> . . . . .                   | 3 à 6 "   |
| 410. <i>Cereus Bertini</i> . . . . .           | 6 "       | 28. — <i>speciosissimus</i> . . . . .                | 2 "       |
| 3. — <i>Bonplandi</i> . . . . .                | 2 "       | 510. — <i>tephracanthus</i> . . . . .                | 3 "       |
| 560. — <i>Bridgesi</i> . . . . .               | 3 à 6 "   | 502. — <i>tetragonus</i> . . . . .                   | 2 "       |
| 4. — <i>cærulescens</i> . . . . .              | 3 "       | 549. — <i>tortuosus</i> . . . . .                    | 2 "       |
| 508. — <i>cæsius</i> . . . . .                 | 4 "       | 542. — <i>triangularis</i> . . . . .                 | 2 "       |
| 511. — <i>Cavendishi</i> . . . . .             | 2 "       | 491. — — <i>pictus</i> . . . . .                     | 3 "       |
| 504. — <i>chalybeus</i> . . . . .              | 3 "       | 30. — <i>tuberosus</i> . . . . .                     | 3 à 5 "   |
| 535. — <i>chiloensis</i> . . . . .             | 2 à 5 "   | 31. — <i>Tweediei (Baumanni)</i> . . . . .           | 3 "       |
| 6. — <i>colubrinus</i> . . . . .               | 3 "       | 32(369). — <i>variabilis</i> . . . . .               | 3 "       |
| 490. — — <i>flavispinus</i> . . . . .          | 3 "       | 514. <i>Disocactus biformis</i> . . . . .            | 3 à 6 "   |
| 8. — <i>Donkelaari</i> . . . . .               | 4 "       | 35. <i>Echinocactus anfractuosus</i> . . . . .       | 6 "       |
| 11. — <i>flagelliformis</i> . . . . .          | 2 "       | 456. — <i>californicus</i> . . . . .                 | 35 "      |
| 12. — <i>flagriformis</i> . . . . .            | 2 "       | 42. — <i>concinus</i> . . . . .                      | 2 à 6 "   |
| 492. — <i>formosus</i> . . . . .               | 2 "       | 398. — <i>coptonogonus</i> . . . . .                 | 25 "      |
| 493. — — <i>monstruosus</i> . . . . .          | 2 à 8 "   | 46. — <i>Cumingi</i> . . . . .                       | .5 à 10 " |
| 14. — <i>geometrizzans</i> . . . . .           | 4 "       | 47. — <i>denudatus</i> . . . . .                     | .6 à 8 "  |
| 16. — <i>grandiflorus</i> . . . . .            | 3 "       | 523. — <i>dichroacanthus</i> . . . . .               | .5 à 15 " |
| 255. — — <i>Maynardi</i> . . . . .             | 3 "       | 48. — <i>Echidne</i> . . . . .                       | 15 à 25 " |
| 487. — <i>Hollianus</i> . . . . .              | 5 "       | 49. — <i>electracanthus</i> . . . . .                | 3 à 5 "   |
| 494. — <i>Jamacaru</i> . . . . .               | 5 "       | 548. — — <i>tetracanthus</i> . . . . .               | 25 "      |
| 495. — — <i>cyaneus</i> . . . . .              | 6 "       | 555. — <i>elongata intertexta</i> . . . . .          | 2 "       |
| 496. — — <i>glaucus</i> . . . . .              | 5 "       | 52. — <i>gibbosus</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 503. — <i>leptophis</i> . . . . .              | 2 "       | 56. — — <i>leucodictus</i> . . . . .                 | 8 "       |
| 18. — <i>Macdonaldi</i> . . . . .              | 2 "       | 57. — — <i>nobilis</i> . . . . .                     | .6 à 10 " |
| 507. — <i>macrogonus</i> . . . . .             | 2 à 6 "   | 58. — — <i>Schlumbergeri</i> . . . . .               | .6 à 10 " |
| 22. — <i>Martianus</i> . . . . .               | 3 "       | 60. — <i>gilvus</i> . . . . .                        | 12 "      |
| 498. — <i>Monvillei</i> . . . . .              | 25 "      | 259. — <i>grandicornis</i> . . . . .                 | 10 "      |
| 562. — <i>nigrispinus</i> . . . . .            | 5 "       | 442. — <i>hexaedrophorus (St Salvador)</i> . . . . . | 20 "      |
| 561. — <i>obtus.</i> . . . . .                 | 3 "       | 455. — <i>horizonthalonius</i> . . . . .             | 30 "      |
| 26. — <i>Ocamponis</i> . . . . .               | 3 "       | 66. — <i>hyptiacanthus</i> . . . . .                 | .5 à 25 " |
| 505. — <i>panopleatus</i> . . . . .            | 12 "      | 67. — — <i>multiflorus</i> . . . . .                 | 35 "      |
| 501. — <i>pentaedrophorus</i> . . . . .        | 6 "       | 441. — <i>Jussieui</i> . . . . .                     | 20 "      |
| 534. — <i>Pepinianus</i> . . . . .             | 12 "      | 521. — <i>Labouretianus</i> . . . . .                | 12 "      |
| 240. — <i>peruvianus monstruosus</i> . . . . . | 3 "       | 446. — <i>lamellosus</i> . . . . .                   | .5 à 10 " |
| 536. — <i>platygonus</i> . . . . .             | 2 "       | 72. — <i>lanceifer</i> . . . . .                     | 6 "       |
| 552. — <i>pterogonus</i> . . . . .             | 3 "       | 74. — <i>leucacanthus</i> . . . . .                  | 6 "       |
| 497. — <i>pugioniferus</i> . . . . .           | 6 "       | 331. — <i>Linki</i> . . . . .                        | 2 "       |
| 486. — <i>rostratus</i> . . . . .              | 2 "       | 459. — <i>lophothele spinosior</i> . . . . .         | 30 "      |
| 509. — <i>rotatus</i> . . . . .                | 6 "       | 451. — <i>macrodiscus</i> . . . . .                  | .3 à 25 " |
| 489. — <i>Seideli</i> . . . . .                | 3 "       | 76. — <i>mamillosus</i> . . . . .                    | 4 "       |
| 499. — <i>serpentinus</i> . . . . .            | 2 "       | 77. — <i>minax</i> . . . . .                         | 12 "      |



|   | Fr.        |  | Fr. C.    |
|---|------------|--|-----------|
| 78. <i>Echinocactus Mirbeli (ornatus)</i> , . . . . .             | 15 à 100 " | 123. <i>Echinopsis Eyriesi</i> . . . . .                 | 1 à 2 "   |
| 80. — <i>Monvillei</i> . . . . .                                  | 4 à 30 "   | 51. — <i>Fauveli</i> . . . . .                           | 1 à 3 "   |
| 263. — <i>Netrelianns</i> . . . . .                               | 8 "        | 468. — <i>formosa spinosior</i> . . . . .                | 10 "      |
| 83. — <i>obvallatus ensiferus</i> . . . . .                       | 8 "        | 469. — <i>formosissima</i> . . . . .                     | 12 à 20 " |
| 447. — <i>Odieri</i> . . . . .                                    | 12 "       | 285. — <i>Huotti</i> . . . . .                           | 2 à 4 "   |
| 85. — <i>Ottonis</i> . . . . .                                    | 1 à 2 "    | 565. — <i>Maximiliana</i> . . . . .                      | 3 "       |
| 453. — — <i>tenuispinus</i> . . . . .                             | 2 "        | 125. — <i>multiplex</i> . . . . .                        | 1 à 2 "   |
| 454. — — <i>tortuosus</i> . . . . .                               | 3 "        | 127. — <i>oxygona</i> . . . . .                          | 2 "       |
| 86. — <i>Ourselianus</i> . . . . .                                | 8 à 40 "   | 133. — <i>Pentlandi</i> . . . . .                        | 2 à 4 "   |
| 452(90). — <i>pentacanthus (phyllacanthus)</i> . . . . .          | 8 à 12 "   | 338. — — <i>elongata</i> . . . . .                       | 5 "       |
| 87. — <i>Pfeifferi (theiacanthus)</i> . . . . .                   | 10 à 75 "  | 339. — — <i>flammea</i> . . . . .                        | 8 "       |
| 525. — <i>platyceras (platyacanthus)</i> . . . . .                | 6 à 10 "   | 340. — — <i>longispina</i> . . . . .                     | 5 à 10 "  |
| 524. — <i>polyraphis niger</i> . . . . .                          | 10 "       | 526. — — <i>ochroleuca</i> . . . . .                     | 5 à 10 "  |
| 91. — <i>porrectus</i> . . . . .                                  | 4 "        | 341. — — <i>roseo-carnea</i> . . . . .                   | 10 "      |
| 450. — <i>pumilus</i> . . . . .                                   | 3 "        | 342. — — <i>tricolor</i> . . . . .                       | 5 "       |
| 538. — <i>recurvus</i> . . . . .                                  | 6 "        | 343. — — <i>vitellina</i> . . . . .                      | 8 "       |
| 93(547). — <i>robustus (agglomeratus)</i> . . . . .               | 6 "        | 529. — <i>rhodacantha</i> . . . . .                      | 15 à 35 " |
| 564. — <i>Seegeri</i> . . . . .                                   | 10 "       | 287. — <i>Rohlandi</i> . . . . .                         | 4 à 6 "   |
| 443. — <i>species nova d'Engelmann</i> . . . . .                  | 6 "        | 288. — <i>Schelhasei</i> . . . . .                       | 2 "       |
| 101. — <i>submamillosus</i> . . . . .                             | 6 "        | 140. — <i>turbinata</i> . . . . .                        | 2 "       |
| 102. — <i>tabularis</i> . . . . .                                 | 3 à 8 "    | 289. — <i>valida (Forbesi)</i> . . . . .                 | 6 "       |
| 105. — <i>Treculianus</i> . . . . .                               | 15 "       | 290. — <i>Verschaffelti</i> . . . . .                    | 5 "       |
| 399. — <i>undulatus</i> . . . . .                                 | 6 à 25 "   | 467. — <i>Wilkensi</i> . . . . .                         | 2 à 5 "   |
| 2. <i>Echinocereus Blanki</i> . . . . .                           | 3 à 4 "    | 141. — <i>Zuccariniana</i> . . . . .                     | 2 "       |
| 5. — <i>candicans</i> . . . . .                                   | 4 "        | 142. — — <i>cristata</i> . . . . .                       | 3 à 20 "  |
| 531. — — <i>robustior</i> . . . . .                               | 5 "        | 462. — — <i>rosea</i> . . . . .                          | 3 "       |
| 532. — — <i>Dumenilianus</i> . . . . .                            | 8 "        | 143. <i>Leuchtenbergia Principis</i> . . . . .           | 30 "      |
| 114(272). — <i>cinerascens (Deppei)</i> . . . . .                 | 2 "        | 33(388). <i>Malacocarpus acutatus (erinaceus)</i> 3 "    |           |
| 476. — <i>Engelmanni</i> . . . . .                                | 4 "        | 45. — <i>corynodes</i> . . . . .                         | 3 "       |
| 478. — <i>enneacanthus</i> . . . . .                              | 4 à 5 "    | 460. — <i>Couranti</i> . . . . .                         | 3 à 5 "   |
| 480. — <i>gladiatus</i> . . . . .                                 | 3 à 10 "   | 461. — <i>Sellowianus</i> . . . . .                      | 3 à 5 "   |
| 273. — <i>glycimorphus</i> . . . . .                              | 6 "        | 145. <i>Mamillaria acanthoplegma</i> . . . . .           | 3 à 6 "   |
| 545. — <i>melaleucos</i> . . . . .                                | 6 "        | 345. — <i>albicans</i> . . . . .                         | 1 à 3 "   |
| 530. — <i>multangularis limensis rufispinus</i> . . . . .         | 6 "        | 293. — <i>angularis</i> . . . . .                        | 1 à 2 "   |
| 116. — <i>multicostatus</i> . . . . .                             | 4 "        | 400(435). — <i>aureiceps (sulphurea)</i> . . . . .       | 5 à 25 "  |
| 481. — <i>papillosus</i> . . . . .                                | 3 à 6 "    | 431. — <i>bicolor cristata</i> . . . . .                 | 8 "       |
| 131. — <i>pectiniferus rufispinus</i> . . . . .                   | 5 à 10 "   | 420. — <i>biglandulosa</i> . . . . .                     | 6 "       |
| 118. — <i>pentalophus</i> . . . . .                               | 2 à 4 "    | 149(437). — <i>Caput Medusæ (Sempervivi)</i> , . . . . . | 3 à 5 "   |
| 471. — — <i>leptacanthus</i> . . . . .                            | 2 "        | 427. — <i>castanoides (Wegeneri)</i> . . . . .           | 4 "       |
| 279(19). — <i>pleiogonus (Leeanus)</i> . . . . .                  | 3 à 5 "    | 428. — — <i>cristata</i> . . . . .                       | 8 "       |
| 390. — <i>polyacanthus</i> . . . . .                              | 6 "        | 551. — <i>cirrhiifera</i> . . . . .                      | 2 à 4 "   |
| 477. — <i>rigidispinus</i> . . . . .                              | 8 "        | 416. — — <i>spinis rufis</i> . . . . .                   | 3 à 5 "   |
| 280. — <i>Rœmeri</i> . . . . .                                    | 3 à 6 "    | 160. — — <i>varietas</i> . . . . .                       | 5 à 8 "   |
| 119. — <i>stramineus</i> . . . . .                                | 4 à 10 "   | 376. — <i>conopsea</i> . . . . .                         | 4 à 10 "  |
| 533. — — <i>de Saltillo</i> . . . . .                             | 8 "        | 297. — <i>cornifera</i> . . . . .                        | 6 à 8 "   |
| 473. — <i>strigosus rufispinus</i> . . . . .                      | 12 "       | 346. — <i>crassispina</i> . . . . .                      | 4 à 6 "   |
| 281. — <i>trichacanthus</i> . . . . .                             | 4 "        | 163. — <i>crocidata</i> . . . . .                        | 4 à 6 "   |
| 120. <i>Echinopsis amœna</i> . . . . .                            | 6 à 8 "    | 372. — <i>crucigera</i> . . . . .                        | 5 à 8 "   |
| 465. — <i>Bridgesi</i> . . . . .                                  | 4 à 6 "    | 164. — <i>decipiens</i> . . . . .                        | 2 "       |
| 543. — <i>cristata (Misleyi) à fleur rouge violacée</i> . . . . . | 4 "        | 165. — <i>declivis</i> . . . . .                         | 6 "       |
| 537. — — — <i>à fleur blanche</i> . . . . .                       | 4 "        | 166. — <i>densa</i> . . . . .                            | 1 "       |
| 244. — <i>cinnabarina</i> . . . . .                               | 8 "        | 168. — — <i>echinata</i> . . . . .                       | 1 "       |
| 283. — <i>Decaisneana</i> . . . . .                               | 2 "        | 558. — <i>depressa</i> . . . . .                         | 2 "       |
| 337. — <i>erythrina</i> . . . . .                                 | 25 "       | 434. — <i>digitalis</i> . . . . .                        | 5 "       |
|   |            | 171. — <i>discolor</i> . . . . .                         | 2 à 4 "   |
|   |            | 515. — — <i>pulchella</i> . . . . .                      | 5 à 10 "  |
|   |            | 300. — <i>echinata</i> . . . . .                         | 2 "       |








## CAMELLIAS

disponibles d'Août en Février-Mars.

 Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août.

## CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fosse de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les *Canna* végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les *Canna* se multiplient de graines ou par la séparation des pieds; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 CANNA en 10 variétés bien distinctes, à mon choix, pour 20 francs.

| Nos  |   | HAUTEUR.   | COULEUR DES FEUILLES. | PIÈCE. | LES 12. |
|------|---|------------|-----------------------|--------|---------|
|      |   | MÈT. CENT. |                       | Fr. C. |         |
| 105. | <i>Canna discolor</i> . . . . .         | 2m00       | pourpre.              | " 50   | 5 "     |
| 178. | — * <i>Annei</i> . . . . .              | 2m60       | glauque.              | " 50   | 5 "     |
| 248. | — <i>caledoniensis</i> . . . . .        | 2m20       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 256. | — <i>involutifolia</i> . . . . .        | 1m90       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 267. | — <i>aurantiaca splendida</i> . . . . . | 2m25       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 268. | — * <i>Liervali</i> . . . . .           | 2m40       | nervures pourpres.    | " 50   | 5 "     |
| 272. | — <i>zebrina nana</i> . . . . .         | 1m40       | pourpre.              | " 50   | 5 "     |
| 274. | — * <i>peruviana</i> . . . . .          | 1m70       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 275. | — <i>spectabilis</i> . . . . .          | 1m50       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 282. | — <i>Louis Gullino</i> . . . . .        | 2m00       | nervures pourpres.    | " 50   | 5 "     |
| 285. | — <i>Maréchal Vaillant</i> . . . . .    | 2m30       | pourpre.              | " 50   | 5 "     |
| 286. | — <i>Député Hénon</i> . . . . .         | 2m20       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 292. | — <i>Docteur Gromier</i> . . . . .      | 1m70       | pourpre.              | " 50   | 5 "     |
| 293. | — <i>Jean Van Dael</i> . . . . .        | 2m00       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 294. | — <i>Anguste Ferrier</i> . . . . .      | 1m70       | pourpre.              | " 50   | 5 "     |
| 296. | — <i>Daniel Hooibrenk</i> . . . . .     | 1m50       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 297. | — <i>Prémices de Nice</i> . . . . .     | 2m50       | vert.                 | " 50   | 5 "     |
| 298. | — <i>Adèle Levalois</i> . . . . .       | 2m20       | vert.                 | " 50   | 5 "     |

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (\*) astérisque.

## AUTRES CANNA.

| Nos  |   | HAUTEUR.   | COULEUR DES FEUILLES. | Fr. C. |
|------|---|------------|-----------------------|--------|
|      |   | MÈT. CENT. |                       |        |
| 299. | <i>Marmorata</i> . . . . .              | 1m10       | marbré pourpre.       | 1 "    |
| 300. | <i>Brenningsi</i> . . . . .             | 1m10       | vert strié jaune.     | 1 "    |
| 301. | <i>Admiration</i> . . . . .             | 2m00       | nervures pourpres.    | 2 "    |
| 302. | <i>Coquet</i> . . . . .                 | 1m40       | pourpre.              | 2 "    |
| 303. | <i>Majestueux</i> . . . . .             | 1m60       | pourpre.              | 2 "    |
| 304. | <i>Surprise</i> . . . . .               | 2m00       | vert.                 | 2 "    |
| 305. | <i>Henri Vilmorin (Huber)</i> . . . . . | 1m30       | vert.                 | 3 "    |



| N <sup>os</sup> |  | HAUTEUR.<br>MÉT. CENT. | COULEUR DES FEUILLES. | Fr. C. |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------|--------|
| 306.            | Ernest Benary ( <i>Huber</i> ) . . . . .             | 1 <sup>m</sup> 00      | vert.                 | 3 "    |
| 308.            | Superbe ( <i>Crozy</i> ) . . . . .                   | 1 <sup>m</sup> 40      | velours pourpre.      | 3 "    |
| 309.            | Président Faivre ( " ) . . . . .                     | 1 <sup>m</sup> 00      | pourpre noir.         | 3 "    |
| 311.            | Victor Lemoine ( " ) . . . . .                       | 1 <sup>m</sup> 20      | vert.                 | 3 "    |
| 312.            | Antoine Garin ( " ) . . . . .                        | 1 <sup>m</sup> 20      | vert.                 | 3 "    |
| 313.            | Liseré d'or ( " ) . . . . .                          | 1 <sup>m</sup> 30      | vert.                 | 3 "    |
| 315.            | Ornement du Grand Rond ( <i>Brassac</i> ) . . . . .  | 1 <sup>m</sup> 10      | pourpre noir.         | 3 "    |
| 316.            | L'or de Toulouse ( " ) . . . . .                     | 1 <sup>m</sup> 30      | vert.                 | 3 "    |
| 317.            | Pierre Dupont ( <i>Crozy</i> ) . . . . .             | 1 <sup>m</sup> 10      | vert.                 | 5 "    |
| 318.            | Alégatière ( " ) . . . . .                           | 1 <sup>m</sup> 20      | pourpre noir.         | 5 "    |
| 319.            | Bonneti excelsa ( " ) . . . . .                      | 1 <sup>m</sup> 30      | nervures pourpres.    | 5 "    |
| 320.            | Original ( " ) . . . . .                             | 1 <sup>m</sup> 10      | vert.                 | 5 "    |
| 321.            | Souvenir de Barillet-Deschamps ( " ) . . . . .       | 1 <sup>m</sup> 70      | pourpre noir.         | 5 "    |
| 322.            | Bihoreli marmorea . . . . .                          | 1 <sup>m</sup> 20      | pourpre noir.         | 5 "    |
| 324.            | species de Pérou . . . . .                           | 1 <sup>m</sup> 70      | vert.                 | 2 "    |
| 325.            | Souvenir de Domin. Collet ( <i>Crozy</i> ) . . . . . | 1 <sup>m</sup> 50      | pourpre noir.         | 5 "    |
| 326.            | zebrina elegantissima . . . . .                      | 1 <sup>m</sup> 60      | pourpre.              | 1 "    |
| 327.            | Hostei ( <i>Huber</i> ) . . . . .                    | 1 <sup>m</sup> 50      | pourpre.              | 1 "    |
| 328.            | purpurea hybrida . . . . .                           | 1 <sup>m</sup> 50      | nervures pourpres.    | 1 "    |
| 329.            | zebrina superba . . . . .                            | 1 <sup>m</sup> 40      | pourpre.              | 1 "    |

## CANNA LILIIFLORA.

(FLORE, X, 211.)

20 francs.


A placer en serre chaude, dans laquelle il développera sa végétation gigantesque (2 1/2 à 3 mètres) et où il montrera son beau feuillage et ses fleurs blanches nuancées de jaune clair, de rose tendre et de vert.

## CENTAUREA CANDIDISSIMA.

*Pièce* : 75 centimes.

Feuillage tout blanc, propre à être alterné avec celui d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet.

## Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

 Voir notre dernier Catalogue de plantes vivaces, N° 164, page 345.

## CINÉRAIRES D'ÉLITE.

### GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, le paquet . . . . . fr. 1 50

## CINERARIA MARITIMA.

*Pièce* : 50 centimes. — *La douzaine* : 4 francs.

Feuillage tout blanc; plantes à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

## CINERARIA MARITIMA CANDIDISSIMA.

*Pièce* : 75 centimes. — *La douzaine* : 6 francs.

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente.



## COBÆA SCANDENS Cav.

|   |          |
|---|----------|
| Cobæa scandens. . . . .                             | fr. „ 50 |
| — foliis albo-marginatis (Flore, XIV, 199). . . . . | „ 1 „    |

## COLEUS.

Les Coleus sont tout spécialement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent de tout ce qui était connu avant eux par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement ; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur ! — Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

50 centimes pièce. — 5 fr. la douzaine. — 10 fr. les vingt-cinq. — 30 fr. le cent.

- |   |   |
|---|---|
| 90. Alfred Bellot.                      | 30. Her Majesty.                          |
| 70. Ambassador.                         | 99. Lady Burrel.                          |
| 94. Bambergi.                           | 79. Luminous.                             |
| 92. Barilleti ( <i>Morlet</i> ).        | 100. Maleti.                              |
| 5. Bausei.                              | 34. Masterpiece.                          |
| 6. Beauty.                              | 35. Mastersi.                             |
| 67. — of St John's Wood.                | 80. Memorial.                             |
| 69. — of Wilmore.                       | 36. Model.                                |
| 8. Berkeleyi.                           | 101. Mondani.                             |
| 91. Bicolor.                            | 37. Moorei.                               |
| 72. Brilliant.                          | 102. Morleti.                             |
| 93. Bruanti.                            | 38. Murrayi.                              |
| 10. Candollei.                          | 103. Neumanni ( <i>Morlet</i> ).          |
| 95. Chantini.                           | 41. Perfection.                           |
| 12. Charm.                              | 47. Prince Léopold.                       |
| 13. Clarkei.                            | 48. — of Wales.                           |
| 96. Cloth of Gold.                      | 43. Princess Louise ( <i>Henderson</i> ). |
| 73. Commandor.                          | 44. — Royal.                              |
| 97. Comte de Circour ( <i>Morlet</i> ). | 49. Provost.                              |
| 15. Crimson Velvet.                     | 51. Reevesi.                              |
| 111. Diadem.                            | 52. Refulgens.                            |
| 75. Dictator.                           | 56. Saundersi.                            |
| 16. Dixi.                               | 58. Spangle.                              |
| 17. Duke of Edinburgh.                  | 108. Sprindleri.                          |
| 18. Elector.                            | 110. Sunrise ( <i>Bull</i> ).             |
| 20. Empress.                            | 60. Telfordi aureus.                      |
| 85. Enterpe ( <i>Van Houtte</i> ).      | 83. Thomasi.                              |
| 98. Fons Blandi.                        | 89. Uranie.                               |
| 22. Gaiety.                             | 62. Van Houttei.                          |
| 25. Gibsoni.                            | 64. Verschaffelti.                        |
| 28. Hendersoni.                         | 109. Vicomte Aguado.                      |
| 29. Hero.                               |   |


## COLEUS NOUVEAUX.

Pièce : 1 franc.

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 148. Caméléon.      | 149. Duchess of Edinburgh.      |
| 115. Charles XII.   | 120. François 1 <sup>er</sup> . |
| 118. Charles-Quint. | 121. Napoléon 1 <sup>er</sup> . |
| 119. Charlemagne.   |                                 |



## CRASSULA COCCINEA.

 La FLORE en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double), à la page 49 de son XV<sup>e</sup> volume.

Pièce : 1 franc. — Les 6 variétés : 5 francs.

19. Boëldieu.  
17. Dr. E. Regel.  
16. Dr. Naudin.  
26. Fr. Desbois.  
30. Mad. Céleste Wynants.

29. Mad. Desbordes-Valmore.

## CRASSULA, espèces.

Crassula odoratissima. . . . . 1 franc.  
— repens. . . . . 50 cent.

## DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

## Livrables en boutures en mai.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Au choix de l'amateur, <i>pièce</i> | 1 franc. |
| — — les douze                       | 10 "     |
| — — les vingt-cinq                  | 18 "     |
| — — les cinquante                   | 35 "     |
| A mon choix, les douze              | 8 "      |
| — les vingt-cinq                    | 14 "     |
| — les cinquante                     | 25 "     |

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce : 1 fr. — 12 variétés : 10 fr. — 25 variétés : 18 fr. — 50 variétés : 35 fr.

En mélange. — Les 12 tubercules : 6 francs. — Les 25 tubercules : 10 francs. —  
Les 50 tubercules : 18 francs.

G. signifie élevé. — M. de taille moyenne. — P. nain. — L. Lilliput.

54. The Pet (Turner), fleur grande, marron foncé légèrement pointé blanc. — G.  
80. Latona (Courchat), blanc paille. — G.  
105. Criterion (Edwards), rose lilacé. — M.  
123. Bessie (Turner), carmin foncé. — M.  
313. Mont Vésuve (Demay), écarlate vif. — M.  
673. La Gitana (Miellez), fleur grande, bien double, rouge sang. — M.  
777. Le défi (Miquet), jaune nankin ombré et strié rouge. — G.  
815. Proserpine (Salter), rouge laque. — G.  
908. Conspicua (Guénau), jaune primevère pointé carmin. — G.  
941. Pauline Mardner (Mardner), rose lilacé pointé blanc. — G.  
1008. Thérèse Huber, blanc bordé pourpre foncé. — M.  
1015. Caroline Pichler, blanc pur. — P.  
1130. Faust (Poincet), jaune paille lavé et nuancé pourpre. — G.  
1139. Iphigénie (V.), blanc carné strié carmin et picoté cerise. — G.  
1150. Madame Ebéline (B.), blanc nuancé rose vif. — M.  
1172. Princess Alice (Turner), chair bordé pourpre foncé. — P.  
1183. Stolze Schneerose (Sieckmann), blanc de neige, petite fleur. — G.  
1198. Deutsche Tricolor (Sieckmann), rouge capucine bordé jaune, petite fleur. — G.  
1211. Victor Duflet (Duflet), fleur grande, bien double, violet pourpre. — M.  
1220. Incomparable (Keynes), fond jaune, sommets des pétales violets. — G.  
1226. Netty Buckell (Keynes), rose très-clair ombré rose plus foncé. — M.  
1235. Flora Wyatt (Keynes), orange strié rouge. — G.



1242. Adèle (*D. R.*), fleur moyenne, rose clair, centre vert. — G.
1269. Emile Mézard (*Hautmulle*), rouge foncé pointé jaune d'or. — G.
1272. Ferdinand Courcelle (*C.*), fleur grande, pourpre velouté marron, extra. — P.
1274. Geita (*L.*), fleur grande, rose clair nuancé et bordé jaune paille. — G.
1278. Golden Bedder (*Keynes*), fleur moyenne, jaune vif, variété très-florifère. — M.
1292. Léonidas (*V.*), bronze doré, revers écarlate, centre orange foncé. — G.
1305. Madem. J. Freteau de Pény (*V.*), fleur grande, carné pointé violet, bonne forme. — G.
1313. Laurio, fleur grande, rouge laque. — G.
1327. Président Brongniart (*L.*), jaune mat bordé jaune d'or; variété très-élevée. — TG.
1331. Scapin (*R.*), fleur grande, jaune très-clair. — G.
1343. Yellow Boy (*Fellowes*), jaune foncé. — M.
1361. Caroline Taste, fleur grande, pourpre marron foncé. — G.
1369. Scaramouche, fleur grande, cramoisi pointé blanc. — M.
1372. M. Martin, fleur grande, jaune vif légèrement pointé rouge, extra. — P.
1374. Don Juan (*V. de Resseg.*), fleur grande, orange doré. — P.
1376. Palma Castellán, fleur grande, ardoisé, couleur distinguée. — M.
1386. Horace, fleur grande, rouge sang, extra-double. — M.
1387. Mad. Baze, fleur moyenne, pourpre noir très-foncé. — P.
1388. Mad. Brossart, fleur grande, rose nuancé pourpre clair. — M.
1390. Van Dyck, fleur grande, rouge laque strié, extra. — G.
1396. La Perle, fleur grande, blanc de lait. — G.
1397. Maria, fleur grande, pourpre fortement bordé blanc. — P.
1403. Vaterland rose, fleur grande, rose vif, bien double. — P.
1405. Gloire des Amandiers, fleur grande, jaune strié, ligné et marbré pourpre. — M.
1406. Dinorah, fleur grande, rose très-vif nuancé rose tendre. — P.
1407. Iris, fleur grande, ocre pointé jaune. — P.
1409. Crinoline (*Turner*), blanc bordé pourpre. — M.
1410. Jean Bart, fleur moyenne, brique orangé fortement bordé blanc. — G.
1412. Charivari, fleur grande, rouge pourpre marbré et picoté jaune. — M.
1420. Isabelle, fleur moyenne, fond jaune, sommets des pétales isabelle. — G.
1423. Rose de mai, fleur moyenne, rose très-tendre. — G.
1487. M. Arthur de Warelles (*Delesalle*), fond buffe nuancé rose, strié et ligné marron foncé, fleur moyenne, forme de toute perfection, coloris nouveau. — G.
1489. M. Grau-Despature (*Grau-Despature*), fleur très-grande, rose vif à reflet lilas foncé, tenue parfaite. — T. G.
1490. Triomphe de l'Exposition de Tourcoing (*A. Holbecque*), fleur grande, bombée et tuyautée, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — G.
1491. Vice-Président J. Grolez (*A. Holbecque*), fleur grande, bombée et tuyautée, rose lilas pointillé et rubané pourpre. — M.
1493. Auber (*Ch.*), marron moiré pointé blanc. — M.
1494. Vanguard (*Wheeler*), marron très-foncé. — M.
1496. M<sup>e</sup> Dorling (*Turner*), crème pointé pourpre, extra. — G.
1497. Marie Fuger, safran nuancé rose vif, extra. — G.
1500. Lord Napier (*Keynes*), pourpre brillant. — G.
1526. Princesse de Ligne, blanc strié violet et noir. — M.
1527. Stanislas Tétard, jaune paille nuancé. — M.
1528. Docteur Faucher, orange saumoné nuancé rose. — M.
1533. Gem, pourpre marron foncé. M.
1534. Glory (*Legge*), blanc strié rose et carmin pourpre, extra. — P.
1535. Jacquic (*Saison*), cramoisi velouté, extra. — M.
1536. L'Africaine (*Fellowes*), marron foncé nuancé lie de vin. — M.
1537. M. Pierrot, jaune très-vif et très-frais. — G.
1540. Little Kate, chamois nuancé orange, extra. — M.
1541. Sonderling von Küstritz (*Sieckmann*), jaune clair bordé carmin, très-tuyauté, extra. — M.
1542. Edith (*Voisenon*), blanc pur, très-double. — M.
1543. Edith de Lastic (*Le Huidoux*), rose panaché et strié pourpre, extra. — M.
1546. Bird of Passage (*Church*), blanc bordé rose foncé, extra. — M.
1547. Impératrice Eugénie (*Aldebert*), fleur moyenne, bombée, lilas très-clair nuancé blanc, extra. — M.



1548. *Mad. de St-Paul (Voisenon)*, rose violet, variété très-florifère. — M.  
 1549. *M. Graindorge (Graindorge)*, crème nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé, extra. — M.  
 1552. *Triomphe de l'Exposition de Tournay*, écarlate vif, très-brillant.  
 1553. *Bauduin (Le Huidoux)*, blanc bordé rose carmin, extra. — M.  
 1554. *Bessie Wyatt (Keynes)*, jaune ocre pointé violet, extra. — M.  
 1555. *M. Lecerf (Couvreur)*, rose feu lilacé, extra. — M.  
 1556. *Gloire de Paris*, fleur moyenne, écarlate vif. — M.  
 1559. *Glory (Legge)*, fleur moyenne, lilas moucheté et rubané pourpre, extra. — P.  
 1560. *Franck Tiffin*, fleur moyenne, fond jaune strié et ligné carmin, extra. — M.  
 1562. *Brunette*, fleur moyenne, fond crème fortement bordé cramoisi, extra. — G.  
 1563. *Comtesse de Sinety (Anceau)*, buffle et orange nuancé lilas, extra. — P.  
 1564. *Mad. Rougier (Anceau)*, rose centfeuilles éclairé blanc et nuancé lilas, extra. — M.  
 1565. *Clémence Isaure (Anceau)*, jaune légèrement pointé lilas, fleur énorme, extra. — G.  
 1568. *Clara (Maresch)*, fleur belle, lilas bordé blanc. — P.  
 1569. *Harbenger (Fellones)*, écarlate superbe. — P.  
 1571. *Henriette (Rich.)*, fleur belle, blanc rosé marbré et strié amarante et cramoisi. — M.  
 1588. *Pointe de la Chapelle (L. D.)*, cerise vif rayé et pointé blanc, extra. — M.  
 1589. *Mad. Charles Leperdriel (L. D.)*, fleur belle, jaune tendre foncé et lavé carmin. — M.  
 1590. *Firefly*, écarlate orange. — M.  
 1592. *Alice (Turner)*, pêche lilacé. — M.  
 1593. *Louisa Haussmann*, blanc glacé lilas. — M.  
 1594. *Joy (Rawlings)*, violet pointé blanc, extra. — M.

## DAHLIAS. — Nouveautés de 1875.

*Pièce : 3 francs.*

1597. *Mad. Louis Creuzé (Creuzé)*, fleur grande, admirable, chamois lamé rouge, revers des pétales nuancé isabelle, hors ligne. — M.  
 1598. *Dr George Creuzé (Creuzé)*, fleur grande, admirable, jaune canari bordé blanc pur. — M.  
 1599. *Sancta Maria (Creuzé)*, fleur grande, blanc pur, de très-belle forme. — M.  
 1601. *Thomas Goodwin (Goodwin)*, marron très-foncé, forme parfaite. — M.  
 1602. *Miss Bateman (Turner)*, jaune nuancé rouge, parfois légèrement picoté. — M.  
 1603. *William Keynes (Keynes)*, orange, bonne forme, extra. — M.  
 1604. *Purity (Fellones)*, orange safrané nuancé cramoisi. — M.  
 1605. *Jennie (Sainsbury)*, blanc pur tatoué et bordé rose pourpre, hors ligne. — M.  
 1606. *Maid of Essex (Rawlings)*, fond blanc de lait, bordé et picoté pourpre carmin. — M.  
 1607. *Lord Hawke (Turner)*, jaune d'or picoté rouge, forme extra. — M.  
 1608. *Duke of Edinburgh (Fellones)*, jaune foncé, hors ligne. — M.  
 1610. *Marquis of Lorne (Keynes)*, rose strié blanc, carmin et pourpre. — M.  
 1611. *Crimson King (Keynes)*, beau cramoisi, belle forme. — M.  
 1612. *Toison d'or (Turner)*, riche jaune d'or, parfait de forme et très-constant, extra. — M.  
 1613. *Miss Turner (Keynes)*, fond lilas pâle, fortement bordé carmin pourpre. — M.  
 1614. *John Standish (Turner)*, rouge écarlate brillant, très-constant et de très-belle forme. — M.  
 1615. *Mrs. Saunders (Turner)*, jaune clair lavé et pointé blanc, extra. — G.  
 1616. *Emily Williams (Keynes)*, fond jaune bronzé bordé et piqué vermillon, hors ligne. — M.  
 1617. *Mrs. Boston (May)*, lilas très-beau, variété très-florifère. — M.  
 1619. *Molly (Turner)*, lilas foncé bordé et tacheté pourpre. — M.  
 1620. *Mrs. Fordham (Turner)*, rose lilacé nuancé bleuâtre, pointé violet. — M.  
 1621. *Mr. Sinclair (Keynes)*, rose tiqueté pourpre, fortement bordé carmin. — M.  
 1623. *Ovid (Turner)*, riche couleur puce, plus vif au centre, forme parfaite. — G.  
 1624. *James Service (Keynes)*, cramoisi foncé, revers des pétales pointé blanc. — G.  
 1626. *Mr. Dix (Hobbs)*, rouge écarlate. — M.  
 1627. *Memorial (Eckford)*, rose pâle nuancé lilas, centre relevé, de forme extra. — M.  
 1628. *Rev. J. B. Camm (Keynes)*, jaune fortement flammé rouge. — M.  
 1629. *Richard Headly (Fellones)*, violet pourpre bordé lilas, de très-belle forme. — M.  
 1630. *King of Primroses (Rawlings)*, fleur moyenne, jaune primevère, très-double. — M.  
 1631. *William Pringle Laird (Keynes)*, rose vif nuancé lilas et strié carmin, extra. — M.



1633. Jessie Gill (*Keynes*), jaune d'or flammé pourpre. — M.  
 1635. Sarah Read (*Keynes*), jaune clair légèrement bordé pourpre. — M.  
 1636. Thomas White (*Keynes*), marron velouté très-foncé, de forme parfaite, extra. — M.  
 1637. Crown Prince (*Eckford*), pourpre marron velouté. — M.  
 1639. Kate Haslam (*Fellowes*), pêche pâle, de belle forme, extra. — M.  
 1640. Marchioness of Lorne (*Keynes*), orange fortement bordé pourpre. — M.  
 1641. Cremorne (*Eckford*), jaune fortement bordé cramoisi, de forme extra. — M.  
 1642. Mrs Austin (*Keynes*), jaune bordé rouge, très-double, fleur d'un nouveau genre. — P.  
 1643. Duke of Cambridge (*Fellowes*), jaune safran pointé et nuancé carmin. — M.  
 1644. Laura Haslam (*Fellowes*), jaune pointé blanc. — M.  
 1645. Herbert Turner (*Turner*), blanc de lait nuancé lilas. — M.  
 1651. Florence Pontin (*Turner*), lilas foncé bordé amarante, très-double. — M.  
 1652. Prince Arthur (*Fellowes*), beau jaune clair, de forme parfaite. — M.  
 1653. Walter Reid (*Eckford*), pourpre nuancé magenta, très-beau. — M.

## DAHLIAS. — Nouveautés de 1876.

*En boutures, pièce : 5 francs.*

1654. Mrs Harris (*Harris*), blanc de lait légèrement bordé lilas. — P.  
 1655. Star of the Morning (*Keynes*), orange safran, très-double. — P.  
 1656. Rev. Dr Moffat (*Keynes*), pourpre marron presque noir, hors ligne. — M.  
 1657. Henry Walton (*Keynes*), jaune fortement bordé vermillon, extra. — M.  
 1658. Countess of Pembroke (*Keynes*), jaune très-clair, légèrement bordé violet pourpre. — P.  
 1659. John Mac Pherson (*Keynes*), riche violet pourpre, variété très-florifère, de belle forme. — M.  
 1660. Mrs Charles Kimberley (*Keynes*), lilas très-vif strié et nuancé rose. — M.  
 1661. Picotee (*Keynes*), jaune d'or parfaitement bordé cramoisi brillant, de forme extra. — P.  
 1662. George Goodhall (*Keynes*), écarlate nuancé orange sur le bord des pétales.  
 1663. John Cocker (*Keynes*), presque noir, le plus foncé de tous les Dahlias, de forme parfaite. — M.  
 1664. Royal Queen (*Eckford*), fond crème fortement bordé pourpre cramoisi, fleur bombée, variété très-florifère, hors ligne. — M.  
 1665. Sarah Mac Mullen (*Rawlings*), rose mauve tendre, légèrement pointé jaune sur le bord des pétales. — M.  
 1666. Rival Harris, rose pourpre violacé, variété très-florifère. — M.  
 1667. Queen's Messenger (*Eckford*), beau pourpre vif, extra. — M.  
 1668. Julia Davis (*Keynes*), jaune magnifique, variété de grand effet, très-florifère. — M.  
 1669. Mrs Stancomb (*Keynes*), jaune canari légèrement pointé carmin. — M.  
 1670. Her Majesty (*Keynes*), blanc de lait largement bordé et nuancé pourpre. — M.  
 1671. Edward Purchase (*Keynes*), beau cramoisi brillant, de forme extra. — M.  
 1672. Mrs Lewington (*Keynes*), rose pourpre clair, de grand effet, coloris nouveau, extra. — M.  
 1673. Negro Boy (*Keynes*), noirâtre nuancé marron, de belle forme. — M.  
 1675. Maggie Smith (*Keynes*), lilas lavé rose, variété très-florifère. — M.  
 1676. Miss Dennis (*Rawlings*), blanc pointé lilas. — M.  
 1677. Willie Eckford (*Eckford*), pourpre foncé très-beau, extra. — M.  
 1679. Mrs Charles Smith (*Keynes*), cramoisi fortement bordé blanc. — M.  
 1680. Miss Lilly Large (*Keynes*), cramoisi tout strié et tacheté orange et jaune. — M.  
 1681. Maria Gerring (*Eckford*), blanc fortement strié pourpre foncé. — M.  
 1682. Beauty of Wiltz (*Keynes*), cramoisi brillant fortement marbré orange et rouge. — M.  
 1683. Miss Large (*Keynes*), lilas foncé lavé rose tendre. — M.  
 1684. John Lamont (*Keynes*), marron strié noirâtre, coloris nouveau, de belle grande forme. — M.  
 1686. Rose Flake (*Keynes*), beau blanc strié cramoisi foncé. — M.  
 1687. Parrot (*Keynes*), jaune cramoisi fortement strié et marbré écarlate. — P.  
 1688. Gil Blas (*Coppins*), cramoisi et pourpre sur fond jaunâtre. — M.  
 1689. Letty Coles (*Keynes*), rose pâle fortement strié et marbré marron. — M.  
 1691. Alexander Roger (*Fellowes*), jaune cuir, extra-belle variété. — M.  
 1692. Delicata (*Fellowes*), blanc de crème lavé lilas, belle variété. — M.  
 1693. Fire King (*Fellowes*), jaune largement bordé rouge, extra. — M.



1695. **Rob Roy** (*Fellowes*), orange pâle nuancé isabelle. — P.  
 1696. **Turco** (*Sainsbury*), orange pâle tacheté rouge. — M.  
 1697. **Empress of Austria** (*Turner*), jaune strié cramoiis et pointé lilas, extra. — M.  
 1698. **Magic** (*Turner*), pourpre tacheté blanc, de forme extra. — P.

## DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

Ces DAHLIAS sont complètement distincts de ceux à grandes fleurs; ils se couvrent d'une quantité de charmantes petites fleurs du plus gracieux effet.

*Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.*

### Livrables en boutures en mai.

|   |         |
|---|---------|
| Au choix de l'amateur, <i>pièce</i> . . . . . | fr. 1 " |
| — — — <i>les douze</i> . . . . .              | " 10 "  |
| — — — <i>les vingt-cinq</i> . . . . .         | " 18 "  |
| — — — <i>les cinquante</i> . . . . .          | " 35 "  |
| A mon choix, <i>les douze</i> . . . . .       | " 8 "   |
| — — — <i>les vingt-cinq</i> . . . . .         | " 14 "  |
| — — — <i>les cinquante</i> . . . . .          | " 25 "  |

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à mon choix.

*Pièce* : 1 fr. — 12 variétés : 10 fr. — 25 variétés : 18 fr. — 50 variétés : 35 fr.

### (N. nains. — L. lilliputiens).

1271. **Flambeau** (*Turner*), L., jaune de chrome bordé laque écarlate, extra. — P.  
 1290. **Leah** (*Turner*), L., orange doré, centre blanc. — P.  
 1330. **Sans pareil** (*G.*), L., rouge saumon, variété très-florifère. — M.  
 1446. **Treuliebchen** (*Deegen*), L., rose à pointes carminées. — N.  
 1447. **Julius Hammer** (*Deegen*), L., jaune d'or pointé écarlate cramoiis. — N.  
 1448. **Nicolaus Lenau** (*Deegen*), L., rose à bouts rose vif, variété très-florifère. — N.  
 1449. **Deutscher Turnergruss** (*Deegen*), N., rouge sang à pointes blanches, fleur moyenne. — N.  
 1451. **Deutscher Zinnoberprinz** (*Deegen*), L., cinabre clair, variété florifère. — N.  
 1452. **Deutscher Goldmeteor** (*Deegen*), N., jaune foncé bordé écarlate orange, grande fleur. — N.  
 1455. **Dürr's Liebling** (*Deegen*), abricot rougeâtre pointé rose tendre, grande fleur. — N.  
 1456. **August von Kotzebue** (*Deegen*), ocre clair, variété très-florifère, de bonne tenue, fleur moyenne. — N.  
 1457. **Prachtröschen** (*Deegen*), L., carmin cinabre pointé blanc. — N.  
 1459. **Eduard Möricke** (*Deegen*), jaune d'or pointé écarlate, ou saumon clair bordé jaune d'or et écarlate. — N.  
 1461. **Joh. Szepesgy** (*Deegen*), citron foncé, fleur moyenne, bien faite. — N.  
 1463. **Pastor Trillhose** (*Deegen*), pourpre foncé finement bordé carmin, parfois pointé blanc. — N.  
 1464. **Prinzessin von Preussen** (*Deegen*), L., jaune d'or à bords cuivrés, ou isabelle pointé jaune d'or. — N.  
 1465. **Krug von Nidda** (*Deegen*), N., blanc de lait richement strié cramoiis, fleur grande. — N.  
 1466. **Leibnitz** (*Deegen*), jaune largement bordé orange. — M.  
 1467. **George Röbel** (*Deegen*), L., cramoiis foncé, variété florifère et précoce. — N.  
 1468. **Deutscher Turban** (*Deegen*), rouge sang, fleur grande, bien faite. — N.  
 1470. **C. Wilken** (*Deegen*), cerise velouté ombré violet clair et pointé blanc pur. — N.  
 1473. **Dr Strousberg** (*Deegen*), chamoiis bordé jaune verdâtre, grande fleur. — N.  
 1476. **George Funke** (*Deegen*), rose laque bordé chamoiis, fleur moyenne. — N.  
 1477. **Glühwürmchen** (*Deegen*), L., écarlate feu, variété très-florifère. — N.  
 1478. **Citronvogel** (*Deegen*), citron brillant, fleur moyenne, variété très-florifère. — N.  
 1481. **Klein Liebchen mein** (*Deegen*), L., blanc bordé pourpre violet, variété des plus mignonnes. — N.



1482. Kleines Silberröschen (*Deegen*), L., lilas argenté souvent pointé blanc. — N.  
 1483. Charte d'or (*Deegen*), L., citron vif. — N.  
 1485. Éclat (*Deegen*), lilas violacé pointé blanc, grande fleur. — N.  
 1502. Alice Gair, blanc bordé violet, extra. — M.  
 1505. The Infant (*Henderson*), L., cramoi si velouté pointé blanc, belle variété. — G.  
 1506. Zierde von Köstritz (*Sieckmann*), L., jaune canari bordé carmin, extra. — N.  
 1507. Lilluputprinz (*Sieckmann*), L., grenat foncé, extra. — M.  
 1508. Kleine Rubencentifolia (*Sieckmann*), violet rubis éclatant, extra. — M.  
 1509. Kleiuod van Köstritz (*Sieckmann*), L., cramoi si brillant, extra. — M.  
 1510. Linda (*Henderson*), L., jaune orange bordé capucine rougeâtre, extra. — N.  
 1512. Mathias Claudius (*Deegen*), L., beau lilas à revers bleuâtre, belle variété. — M.  
 1513. Alabasterrose (*Deegen*), L., blanc pur, extra. — M.  
 1514. Scadow (*Deegen*), L., rose foncé, extra. — M.  
 1518. Hulda (*Deegen*), L., cerise pourpre foncé pointé rose et blanc, extra. — N.  
 1519. Deutsches Rannukelröschen (*Sieckmann*), L., marron presque noir, extra-double. — G.  
 1520. Garteninspector Tireoud (*Sieckmann*), L., carmin violet à reflet blanc, extra. — M.  
 1522. Sapho (*Henderson*), L., cramoi si nuancé marron, extra. — M.  
 1523. Deutsche Schneekönigin (*Sieckmann*), L., blanc pur. — M.  
 1525. Handelsgärtner Klaus (*Sieckmann*), L., rouge brillant. — M.  
 1532. Wacht am Rhein (*Sieckmann*), pourpre foncé nuancé violet. — N.  
 1538. Donald Beaton, pourpre violacé, extra.  
 1545. Gloire de France (*Henderson*), violet carmin, fleur énorme, extra, variété très-naine. — T. P.  
 1558. Princesse Charlotte, L., rose amarante vif pointé blanc. — M.  
 1566. Guenoux de Voisenon (G.), écarlate vif. — M.  
 1570. Lady W<sup>m</sup> Paulett (*Keynes*), fleur éclairée pointée lilas, extra. — M.  
 1572. Little Mary (*Henderson*), L., rose cramoi si, belle variété. — G.  
 1573. Emotion (*Henderson*), L., cramoi si brillant pointé blanc, belle variété. — M.  
 1574. Dr Webb (*Henderson*), L., riche écarlate, extra. — N.  
 1578. Sacramento, L., or et maïs, riche coloris, extra. — M.  
 1579. Louis Ulbach (*Deegen*), L., crème rosé, revers bordé violacé, extra. — G.  
 1580. Général Graf von Moltke (*Deegen*), L., marron pourpre reflété violet, belle variété. — G.  
 1582. Blanda (*Deegen*), L., blanc pur. — G.  
 1586. Xénophon, L., rouge cramoi si. — N.

## DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS. — Nouveautés de 1875.

*En boutures, pièce : 3 francs.*

1596. Marguerite (*Bruant*), variété très-naine, fleur grande, très-bien faite, blanc pur. — T. N.  
 1700. Décoration, blanc fortement nuancé et bordé rose. — N.  
 1702. German Daisy, L., rose vif nuancé lilas, variété très-florifère. — N.  
 1703. Hero, écarlate brillant à bouton vert au centre. — N.  
 1704. Le nain, cramoi si velouté, variété très-naine. — T. N.  
 1705. Little Arthur, L., amarante cramoi si. — N.  
 1706. Little Child, L., rose fortement bordé carmin vif. — N.  
 1707. Little Najade, L., carmin pâle bordé cramoi si violet. — N.  
 1708. Panorama, abricot pointé carmin, variété très-belle et très-florifère. — N.  
 1709. Pearl, blanc pur, variété très-florifère, extra. — N.  
 1711. Rising Sun, riche écarlate, de forme extra, variété très-naine. — N.  
 1713. Velvet Gem, L., cramoi si marbré blanc. — N.  
 1714. Voltaire, L., jaune d'or, parfois à pétales blancs, de belle forme. — N.  
 1716. Espérance, L., fond crème lavé orange carmin, très-double. — N.  
 1717. Fairy Prince, L., isabelle pointé jaune. — N.  
 1718. Hindoo, L., brillant rouge orangé à centre écarlate, variété très-florifère, forme de Renoncule. — N.  
 1719. Junon, L., orange rouge, pétales coupés, variété très-distinguée. — M.  
 1720. Keepsake, L., cramoi si clair. — M.  
 1721. Vénus, L., rose brillant nuancé et pointé pourpre. — N.



## 1557. DAHLIA COLIBRI.

Par sa petite taille, ce joli Dahlia, qui ne s'élève qu'à 50 centimètres de hauteur, n'a besoin d'aucun tuteur. Ses tiges semblent être des fils de fer : buisson d'où sortent de petites fleurs écarlates ayant au centre un tout petit bouton vert.

*Pièce* : 50 centimes. — *Les vingt-cinq* : 10 francs.

## DAHLIAS EN ARBRE.

*Pièce* : 1 franc. — *Les douze* : 9 francs.

1080. *Arborea*. Espèce très-vigoureuse, port très-ornemental.

78. *Imperialis*. Espèce mexicaine très-ornementale, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses. Ces deux espèces atteignent une hauteur de 2 mètres.

## DAHLIA VERT.

1595. *Dahlia vert* (*Steckmann*). — *Pièce* : 1 franc.

Ce nouveau Dahlia, dont nous avons donné la figure à la page 111 du XIX<sup>e</sup> volume de la FLORE, est à fleurs pleines et toutes vertes, d'un vert aussi vert que le sont celles du *Rosier Bengale à fleurs vertes*.

## DIANTHUS.

## ŒILLETS.

*Dianthus Caryophyllus.*

Œillets flamands, disponibles de novembre en mars.

|  |     |    |   |
|--|-----|----|---|
| 1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> .    | fr. | 80 | " |
| — <i>les vingt-cinq</i> .                  | "   | 25 | " |
| Graines, — <i>le paquet de 100 graines</i> | "   | 3  | " |

Œillets de Bohême, disponibles de novembre en mars.

|  |     |    |   |
|--|-----|----|---|
| 1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> .    | fr. | 80 | " |
| — <i>les vingt-cinq</i> .                  | "   | 25 | " |
| Graines, — <i>le paquet de 100 graines</i> | "   | 2  | " |

Œillets remontants, disponibles de novembre en mars.

|   |     |      |   |
|---|-----|------|---|
| 1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> .                         | fr. | 80   | " |
| — <i>les vingt-cinq</i> .                                       | "   | 25   | " |
| Variétés en mélange, <i>les vingt-cinq</i> .                    | "   | 10   | " |
| — <i>les cinquante</i> .  | "   | 15   | " |
| Graines, 1 <sup>er</sup> choix, <i>le paquet de 100 graines</i> | "   | 2 50 | " |

242. *Prince d'Orange*. Beau jaune finement strié rouge vif. . . . . *pièce* . . . fr. 3 "

2120. *Souvenir de la Malmaison* (FLORE, XII, 131). 35 centimètres de circonférence.

Blanc refleté incarnat fort tendre, de 1<sup>er</sup> ordre . . . . . *pièce* . . . " 1 "

2121. *Couronne impériale* . . . . . *pièce* . . . " 1 "



## Œillets mignardises.

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| 6. | Tapis brun, <i>pièce</i> .              | fr. | 50 |
| —  | — <i>les douze</i> .                    | "   | 5  |
| 5. | — noir, <i>pièce</i> .                  | "   | 50 |
| —  | — <i>les douze</i> .                    | "   | 5  |
| 7. | — rouge, grandes fleurs, <i>pièce</i> . | "   | 75 |

## Dianthus barbatus.

## Œillets de poète.

|   |     |    |   |
|---|-----|----|---|
| Bouquets parfaits, disponibles de septembre en mars, <i>le cent</i> . | fr. | 20 | " |
| — — — — — <i>les vingt-cinq</i> .                                     | "   | 6  | " |
| Graines en mélange, 25 grammes.                                       | "   | 1  | " |

## ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

72. Barillet-Deschamps.

Rouge foncé; fleurit à 30 centimètres de hauteur.

51. \*Bellangeri.

62. \*Boothi.

68. \*conspicua.

52. Cottyana.

53. \*Crista galli.

54. floribunda.

56. \*fulgens.

73. Impératrice Eugénie.

Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli*.

71. Madame Bellanger.

59. \*marginata.

60. \*Marie Bellanger.


70. ornata.

74. Président Belle.

69. \*profusa.

67. \*ruberrima.


*Belles plantes : 1 à 3 francs pièce, suivant la force.*

 Les variétés en fortes souches, à 5 francs pièce, sont désignées par un astérisque (\*).

## FUCHSIAS.

## Variétés d'élite.

*Pièce : 75 centimes. — La douzaine : 6 francs.*

 Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont à fleurs doubles.

457. \*Christian IX (*L'huillier*).

470. Queen of Beauty (*Williams*).

475. Constellation (*Banks*).

476. Don Giovanni ( *n* ).

480. Lucrezia Borgia ( *n* ).

489. Paul et Virginie (*Lemoine*).

490. Aurora (*W. Bull*).

495. Reviver ( *n* ).

497. Lady Heylesbury ( *n* ).

500. Marvellous (*E. G. Henderson*).

509. Acidalie (*Henri Demay*).

510. Bellone ( *n* ).

511. Aurora superba ( *n* ).

516. Erecta (*Williams*).

522. \*Consolation (*E. G. Henderson*).

524. Father Ignatius (*E. G. Henderson*).

539. \*François Desbois (*Coene*).

542. \*Victorien Sardou (*Lemoine*).

543. Élégance (*Bull*).

545. \*Nonpareil ( *n* ).

546. \*Warrior ( *n* ).

551. Harry George Henderson (*Henderson*).

552. Lady Dumbello ( *n* ).

553. Lizzie Hexam ( *n* ).

554. Beauty's Bloom ( *n* ).

560. \*M. Drevet (*Boucharlat*).

561. \*Globosa multiflora ( *n* ).

569. \*Erzherzogin Maria Theresia (*Tordy*).

572. \*Swan ( *n* ).

573. \*Gigantea ( *n* ).



- |   |   |
|---|---|
| 574. *Goliath ( <i>Tworzy</i> ).                | 635. *Remor ( <i>Coene</i> ).                   |
| 576. Cherub ( <i>Bull</i> ).                    | 636. *Avalanche ( <i>Henderson</i> ).           |
| 584. Duchesse de Gérolstein ( <i>Lemoine</i> ). | 638. *Tower of London ( <i>n</i> ).             |
| 588. Amalthée ( <i>H. Demay</i> ).              | 640. Weeping Beauty ( <i>n</i> ).               |
| 590. *Hermosa ( <i>n</i> ).                     | 641. Concile ( <i>Lemoine</i> ).                |
| 591. *Magicien ( <i>n</i> ).                    | 645. *Dreadnought ( <i>Felton</i> ).            |
| 593. Mad. J. Menoreau ( <i>Lemoine</i> ).       | 647. *Général ( <i>n</i> ).                     |
| 599. Master Longfield ( <i>Henderson</i> ).     | 648. *George Felton ( <i>n</i> ).               |
| 600. Snowdrop ( <i>n</i> ).                     | 649. *Majestic ( <i>n</i> ).                    |
| 603. Phenomenal ( <i>Banks</i> ).               | 652. *Royal Prince ( <i>n</i> ).                |
| 607. Beauty of Sholden ( <i>n</i> ).            | 654. *Formosa ( <i>Williams</i> ).              |
| 608. King of the Fuchsias ( <i>n</i> ).         | 656. Striata perfecta ( <i>n</i> ).             |
| 609. Lord Derby ( <i>n</i> ).                   | 670. *Rhum von Russelsheim ( <i>Weinrich</i> ). |
| 613. Giralda ( <i>H. Demay</i> ).               | 681. *Schneepyramide ( <i>Tworzy</i> ).         |
| 615. *Turenne ( <i>n</i> ).                     | 684. Standard ( <i>Bull</i> ).                  |
| 617. *M. Fillion ( <i>Crousse</i> ).            | 687. *Harry Williams ( <i>Williams</i> ).       |
| 618. Lamartine ( <i>Lemoine</i> ).              | 725. *Carl Kahl ( <i>Hock et Co</i> ).          |
| 622. *Montrose ( <i>Bull</i> ).                 | 731. Golden Mantle ( <i>Bull</i> ).             |
| 623. Tinted Venus ( <i>n</i> ).                 | 736. Germania ( <i>Grüber</i> ).                |
| 625. *Troubadour ( <i>n</i> ).                  | 741. *Emperor of Brazil ( <i>Williams</i> ).    |
| 626. *Conqueror ( <i>Felton</i> ).              | 742. *Prince Léopold ( <i>n</i> ).              |
| 629. Jolly ( <i>n</i> ).                        | 744. Sunray ( <i>Th. Milner</i> ).              |
| 630. Lady Saly ( <i>n</i> ).                    | 750. Duke of Edinburgh ( <i>Henderson</i> ).    |
| 631. *Lord Calthorpe ( <i>n</i> ).              | 751. Guardsman ( <i>n</i> ).                    |
| 633. *Misai ( <i>Coene</i> ).                   | 754. Mauve Queen ( <i>n</i> ).                  |
| 634. *Tatlo ( <i>n</i> ).                       | 756. George Brunning ( <i>n</i> ).              |

## FUCHSIAS DE 1874 ET 1875.

Pièce : fr. 1-50.

- |  |   |
|--|---|
| 771. *Dom Pedro ( <i>Tworzy</i> ).     | 788. *Commandant Taillant ( <i>Lemoine</i> ). |
| 773. *Europa ( <i>n</i> ).             | 789. Député Teutsch ( <i>n</i> ).             |
| 776. *Gallilæi ( <i>n</i> ).           | 790. *M. Lauth ( <i>n</i> ).                  |
| 777. *Graf Andrassy ( <i>n</i> ).      | 791. *C. Weiprecht ( <i>Tworzy</i> ).         |
| 780. *Mad. Lemoine ( <i>n</i> ).       | 792. *Amazone ( <i>n</i> ).                   |
| 783. *Selam ( <i>n</i> ).              | 793. *Elfe ( <i>n</i> ).                      |
| 784. *Terpsichore ( <i>n</i> ).        | 797. *Dr Jaquin ( <i>n</i> ).                 |
| 787. *François Coene ( <i>Coene</i> ). |   |

## FUCHSIAS. — Dernières nouveautés (1876).

Pièce : 4 francs.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 798. Agnès Sorel ( <i>Lemoine</i> ).                     | 808. Highland Chief ( <i>Bull</i> ). |
| 799. Boliviana ( <i>Roetzl</i> ).                        | 809. Calypso ( <i>n</i> ).           |
| 800. fulgens foliis albo-marginatis ( <i>Gerbeaux</i> ). | 811. Admiration ( <i>n</i> ).        |
| 801. Jeanne d'Arc ( <i>Lemoine</i> ).                    | 812. Baroness ( <i>n</i> ).          |
| 802. Monstrueux ( <i>n</i> ).                            | 813. Nysa ( <i>n</i> ).              |
| 805. Cordifolia ( <i>n</i> ).                            | 814. Hatteras ( <i>Lemoine</i> ).    |
| 806. Dominiana ( <i>n</i> ).                             | 815. Illustration ( <i>n</i> ).      |
| 807. George Frederick ( <i>Bull</i> ).                   | 816. *La Jungfrau ( <i>n</i> ).      |

## FUCHSIAS ANCIENS.

Pièce : 50 centimes.

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 196. Rose de Castille.   | 786. Arborescens syringæflora. |
| 197. Serratifolia.       | (FLORE, IV, 416-17.)           |
| 198. Fulgens multiflora. | 804. foliis argenteis.         |
| 219. Corymbiflora.       |                                |



## GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 4 variétés, le cent . . . . . 25 francs.

|   | Fr. C. |                                    | Fr. C. |
|---|--------|------------------------------------|--------|
| 1. Splendens . . . . .                    | " 50   | 4. Splendens grandiflora . . . . . | " 50   |
| 2. — aurantiaca . . . . .                 | " 50   | 6. — <i>Souci</i> . . . . .        | " 50   |
| 3. — foliis argenteo-marginatis . . . . . | " 50   |                                    |        |

## GNAPHALIUM LANATUM.

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs. — Le cent : 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeilles.

## GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

Le même que le précédent, mais à feuilles bordées jaune.

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs.

## HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes. — Dix variétés : 3 francs.

|  |   |
|--|---|
| 9. Triomphe de Liège.                      | 53. Reine des violettes.                    |
| 31. Gloire des massifs ( <i>Lemoine</i> ). | 60. Souvenir de Léopold ( <i>Crousse</i> ). |
| 37. Mulâtre ( <i>Demay</i> ).              | 68. Dr Livingstone ( <i>John Keynes</i> ).  |
| 49. Mad. Michel ( <i>Scheurer</i> ).       | 71. La Favorite ( <i>Crousse</i> ).         |
| 51. Mad. Boulanger ( <i>Boulanger</i> ).   |   |

## VARIÉTÉS NOUVELLES.

Pièce : 1 franc.

|   |  |
|---|--|
| 72. Bouquet parfumé ( <i>Crousse</i> ). | 79. Souvenir de Barillet ( <i>Crousse</i> ). |
| 73. Daphné ( n ).                       | 80. Marie Boppe ( <i>Rendatler</i> ).        |
| 74. Iris ( n ).                         | 81. Othello ( n ).                           |
| 75. Progrès ( n ).                      | 82. Héloïse Delesalle ( n ).                 |
| 76. Leucothoë ( n ).                    | 83. Souvenir de Rendatler ( n ).             |
| 77. Mad. Julien ( n ).                  | 84. Gloire des parterres. ( n ).             |

## LANTANA.

12 variétés avec noms, au choix de l'Établissement : 6 francs.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

|  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 43. Alba violacea ( <i>Rougier</i> ) . . . . .   | 2 "    | 76. Caméléon ( <i>Ferrand</i> ) . . . . .          | " 50   |
| 75. Albo-lutea grandiflora . . . . .   | " 50   | 53. Cauvin ( <i>Cauvin</i> ) . . . . .             | " 50   |
| 38. Amœna ( <i>H. Demay</i> ) . . . . .  | " 50   | 77. Colibri ( <i>Hans</i> ) . . . . .              | " 50   |
| 93. Argus ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .   | 2 "    | 60. Dame d'honneur ( <i>F. Ferrand</i> ) . . . . . | " 50   |
| Variété naine, jolie, s'étalant sur le sol et se couvrant de fleurs jaune clair tournant au rose cuivré. |        | 3. Delicatissima ( <i>Chauvière</i> ) . . . . .    | " 50   |



- |   | Fr. C. |
|---|--------|
| 103. Étoile ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .                      | 2 "    |
| Fleurs de 15 millimètres de largeur, rose clair à fond cha-   |        |
| mois safrané passant au rose vif, centre rose pourpre; magni- |        |
| fique variété.  |        |
| 80. Étoile de Provence . . . . .                              | " 50   |
| 51. Fabiola ( <i>Rendatler</i> ) . . . . .                    | " 50   |
| 82. Favourite ( <i>Henderson</i> ) . . . . .                  | " 50   |
| 83. Gloire des marchés ( <i>Nivert</i> ) . . . . .            | " 50   |
| 84. Goeschke . . . . .  | " 50   |
| 108. Héroïne ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .                     | 1 "    |
| Fleurs larges, jaune rouille passant au chocolat.             |        |

- |   | Fr. C. |
|---|--------|
| 67. Mad. Baltet ( <i>Henry-Jacotot</i> ) . . . . .          | " 50   |
| 87. Mad. Rougier . . . . .                                  | " 50   |
| 88. Mine d'or ( <i>Rendatler</i> ) . . . . .                | " 50   |
| 45. Miracle ( <i>Smith</i> ) . . . . .                      | " 50   |
| 113. Multiflore ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .                | 2 "    |
| Plante de 35 centimètres de hauteur, jaune canari.          |        |
| 53. Nec plus ultra ( <i>Rendatler</i> ) . . . . .           | " 50   |
| 90. Roi des rouges . . . . .                                | " 50   |
| 121. Soleil levant . . . . .                                | 2 "    |
| Variété naine, à végétation compacte, à large feuillage, à  |        |
| fleurs grandes, en larges bouquets, jaune doré bordé blanc, |        |
| passant au beau rose vif.                                   |        |

## LANTANA NOUVEAUX.

*Pièce : 3 francs.*

124. **Aurore boréale** (*Lemoine*). Plante buissonnante, naine, fleurs jaune de chrome fixe.
122. **Bouquet blanc** (*Lemoine*). Plante de 30 cent., se couvrant de fleurs paille, passant au blanc.
125. **Janus** (*Lemoine*). Demi-nain, fleurs jaune foncé, tournant au rose pourpre.
126. **La neige** (*Lemoine*). Buisson touffu, large et haut de 40 cent., se recouvrant complètement de fleurs de moyenne largeur du blanc le plus pur, à peine jaunâtre en s'ouvrant; cette variété laisse un écart sensible entre elle et les quelques variétés blanches cultivées.
127. **M. Schmidt** (*Lemoine*). Variété obtenue de celle nommée *Louis Benoit*, si riche de fleurs et de coloris; celle-ci s'en éloigne par un coloris plus chaud, plus étincelant, d'un jaune brillant passant au vermillon pourpré; la plante s'étale sur le sol à la façon des *Petunia*.
123. **Rayon de Soleil** (*Lemoine*). Fleurs de 15 millim., jaune très-foncé, tournant au rose violacé.
128. **Toison d'or** (*Lemoine*). Plante demi-naine, d'une moyenne vigueur, fleurs très-nombreuses, moyennes, jaune de chrome foncé ne variant pas; excellente pour bordures et pour groupes.

## LOBELIA D'ÉLITE.

*Pièce : 50 centimes.*

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 17. <i>Violacea</i> .           | 147. <i>Mulberry</i> .                    |
| 83. <i>M. Saul</i> .            | 170. <i>Marvel</i> .                      |
| 110. <i>Purpurea regia</i> .    | 181. <i>Sir Robert Napier</i> : fr. 1-50. |
| 132. <i>Syphilitica rosea</i> . | 187. <i>Ingénieur Leroy</i> .             |
| 135. <i>Queen Victoria</i> .    | 191. <i>Rosea</i> .                       |

## LOBELIA ERINOIDES.

Trois belles variétés pour bordures.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <i>Lobelia erinoides Purity</i> . . . . . | } <i>pièce : 50 centimes.</i><br>} <i>le cent : 20 francs.</i> | <i>Lobelia pumila grandiflora plena</i> . |
| Blanc pur.                                |  | <i>pièce : 50 centimes.</i>               |
| — — <i>True blue</i> . . . . .            |  | <i>les douze : 5 francs.</i>              |
| Bleu foncé.                               |  |   |

## NIEREMBERGIA RIVULARIS.

*Pièce : 50 centimes.*

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.



# CEILLETS.

Voir **Dianthus**, page 190.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

### A CINQ MACULES.

*Pièce* : 1 franc. — *Les douze* : 10 francs.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Beauté parfaite ( <i>H. Demay</i> ).           | 98. Diamant.                                    |
| 2. Criterion ( <i>n</i> ).                        | 101. A. Delobel.                                |
| 3. Etincelant ( <i>n</i> ).                       | 103. Endymion.                                  |
| 4. Uranie ( <i>n</i> ).                           | 105. Eugénie Duval ( <i>Duval</i> ).            |
| 6. La neige ( <i>Boucharlat</i> ).                | 107. Florian ( <i>n</i> ).                      |
| 8. Prince noir ( <i>n</i> ).                      | 108. Gloire du Petit Bicêtre ( <i>n</i> ).      |
| 11. Adonis ( <i>Duval</i> ).                      | 109. Impératrice Eugénie ( <i>Boucharlat</i> ). |
| 17. Elvire ( <i>Malet</i> ).                      | 110. Inimitable ( <i>H. Demay</i> ).            |
| 21. Jeanne d'Arc ( <i>Malet</i> ).                | 115. Mad. Heyne.                                |
| 24. Mad. André Dreux ( <i>Duval</i> ).            | 116. — Coursier.                                |
| 25. Thibaut ( <i>Malet</i> ).                     | 117. — de Frileuse.                             |
| 27. Marquise de la Ferté ( <i>n</i> ).            | 123. M. Guidon.                                 |
| 28. Marquis de Toulangeon ( <i>Duval</i> ).       | 124. M. Legouvé.                                |
| 29. M. Ad. Weick ( <i>Malet</i> ).                | 128. Nestor.                                    |
| 30. M. De Lucy ( <i>n</i> ).                      | 129. Oriflamme ( <i>H. Demay</i> ).             |
| 31. M. Mazel ( <i>n</i> ).                        | 130. Octavie Demay ( <i>n</i> ).                |
| 32. M. Rendatler ( <i>Duval</i> ).                | 131. Pline.                                     |
| 33. Prince de la Moskowa ( <i>n</i> ).            | 132. Pescatore.                                 |
| 34. Raphaël ( <i>Malet</i> ).                     | 139. Vicomtesse de Belleval.                    |
| 36. Roseum ( <i>Duval</i> ).                      | 144. Brigantine.                                |
| 33. Victorine Pinguard ( <i>Malet</i> ).          | 145. Black Prince ( <i>Carter</i> ).            |
| 39. Vercingétorix ( <i>Duval</i> ).               | 146. Bonnie Charlie.                            |
| 43. Jean Sisley ( <i>Boucharlat</i> ).            | 148. Charlemagne.                               |
| 45. M. Malet (diadematum) ( <i>n</i> ).           | 149. Claribel.                                  |
| 46. Mad. Thibaut ( <i>n</i> ).                    | 150. Corsair.                                   |
| 53. Incomparable ( <i>n</i> ).                    | 151. Duke of Edinburgh.                         |
| 56. Auguste Pühl ( <i>Twrdy</i> ).                | 153. Emperor.                                   |
| 68. Marie Delepoulle ( <i>Delesalle</i> ).        | 154. Exemplar.                                  |
| 69. Prés. Schlachter ( <i>Aldebert</i> ).         | 157. Heirolm.                                   |
| 70. Regrets d'Aldebert ( <i>n</i> ).              | 159. Iron Duke.                                 |
| 72. Grande-Duchesse de Bade ( <i>Wetzel</i> ).    | 160. Lady of the Lake.                          |
| 73. Mademoiselle Hélène ( <i>n</i> ).             | 165. Pasha.                                     |
| 74. Pénélope ( <i>Delesalle</i> ).                | 166. Plantagenet.                               |
| 75. Georges Sand ( <i>Lemoine</i> ).              | 167. M. Plassam.                                |
| 76. Victor Lemoine ( <i>Malet</i> ).              | 168. Pollie.                                    |
| 80. Mad. Mery de Montigny ( <i>J. Aldebert</i> ). | 169. Pretender.                                 |
| 82. Président Demoulin ( <i>n</i> ).              | 170. Queen Bess.                                |
| 83. Léonidas ( <i>n</i> ).                        | 172. Sunbeam.                                   |
| 84. François Wauters ( <i>n</i> ).                | 173. Sunshine.                                  |
| 85. Eugénie De la Marre ( <i>Chaté</i> ).         | 174. Sultana.                                   |
| 87. Stéphanie ( <i>n</i> ).                       | 175. Velutina.                                  |
| 89. Admiration ( <i>Boucharlat</i> ).             | 176. Warrior.                                   |
| 90. Anacréon ( <i>H. Demay</i> ).                 | 202. Beauty of Kingston.                        |
| 93. Colonel Foissy.                               | 203. Prince of Pelargoniums.                    |
| 95. Clorinde.                                     | 204. Princess Hortense.                         |
| 96. Colette de Marsenia.                          | 205. Prince Arthur ( <i>D.</i> ).               |
| 97. Calypso ( <i>Malet</i> ).                     |   |



## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

## A CINQ MACULES.

## NOUVEAUTÉS DE 1874, à 2 fr. pièce.

- |   |  |
|---|--|
| 206. Étendard de France ( <i>Delesalle</i> ).     | 218. Triomphe de St-Mandé ( <i>Châte</i> ).    |
| 207. Madame de Clercq ( n ).                      | 219. Alcibiade ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ). |
| 209. M. Félix Collin ( <i>L'huillier</i> ).       | 220. Bayard ( n ).                             |
| 210. M. Robinson Woolfield ( <i>Boucharlat</i> ). | 221. Colbert ( n ).                            |
| 211. Madame Max Nisson ( n ).                     | 222. Desaugiers ( n ).                         |
| 212. Marie Huin ( <i>Rendatler</i> ).             | 223. Memnon ( n ).                             |
| 213. Elisa Magny ( <i>Baudry et Hamel</i> ).      | 224. Pompée ( n ).                             |
| 214. Hilaire ( n ).                               | 226. Vaucanson ( n ).                          |
| 215. L. Bremond ( n ).                            | 232. Le nègre ( <i>Delesalle</i> ).            |
| 216. M. Guilmot ( n ).                            | 233. M. Jules Dumont ( n ).                    |
| 217. M. Henri Marquis ( n ).                      |  |

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

## A CINQ MACULES.

## NOUVEAUTÉS DE 1875, à 4 fr. pièce.

234. **Mad. Rœmpler** (*Delesalle*), rose saumoné maculé noir sur les cinq pétales, éclairé feu, forme parfaite, variété naine et florifère.
235. **Mad. Laurent Delesalle** (*Delesalle*), fleur des plus grandes, de forme parfaite, rose orange, grand centre lilas violacé bordé de la même nuance, les pétales supérieurs maculés acajou.
236. **Mad. Auguste Sirant** (*Delesalle*), très-grande fleur de forme parfaite, lilas mauve, grand centre blanc, variété extra.
237. **Henriette Delepoulle** (*Delesalle*), fortes ombelles d'un beau rose cerise, pétales supérieurs maculés marron, centre et bord des pétales blanc pur, variété vigoureuse et très-florifère.
238. **Grand Monarch** (*Foster*).
239. **Henri Bailey** (*Turner*).
240. **Falcon** (*Foster*).
241. **Duchess of Cambridge** (*Foster*).
264. **Mad. de Gasparin** (*Lemoine*), blanc de neige pur, maculé ou strié gorge de pigeon.
265. **Signor E. Montabone** (*Lemoine*), fleur grande, très-ondulée, rose riche, large centre blanc, pétales supérieurs maculés marron, pétales inférieurs veinés.
266. **Malvæflorum** (*Lemoine*), fleur grande, en forme de mauve, beau mauve lilacé, à cinq légères macules rose vif, ombelles très-larges, très-belles.
267. **Gloria patriæ** (*Lemoine*), blanc, macules marron clair, forme parfaite, d'un grand mérite.
268. **Chancellor** (*Lemoine*), grandes ombelles, rose vineux marbré, macules pourpre noir, fleur en entonnoir.
269. **Capitaine Cook** (*Lemoine*), grandes ombelles, riche carmin orangé, centre blanc lilacé, pétales supérieurs légèrement maculés, variété extra.
270. **Istmo di Suez** (*G. Mangilla*), fleur de grand effet, orange feu à centre rose, pétales supérieurs maculés marron feu, entouré d'orange feu.
271. **Copernic** (*Thibaut et Keteleer*), blanc carné, pétales supérieurs maculés carmin pourpre, pétales inférieurs maculés et réticulés cramoisi.
272. **Graziella** (*Thibaut et Keteleer*), carmin vif, centre et bord des pétales blanc, pétales supérieurs légèrement maculés marron.
273. **Rabelais** (*Thibaut et Keteleer*), blanc violacé, pétales réticulés violet foncé, macules pourpres.
274. **Jean Bart** (*H. Demay*), pourpre vermillon, centre blanc, pétales supérieurs maculés marron velouté et liserés blanc.
275. **Nérée** (*H. Demay*), marron velouté, pétales supérieurs noir velouté, centre blanc.
276. **Mad. Vibert** (*Châte*), cinq riches macules marron noir bordé feu, toute la fleur largement liserée rose.



## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

### A CINQ MACULES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE 1876, à 10 fr. pièce.

278. **Hortense Delobel** (*Delesalle*), fleur grande, légèrement ondulée, violet nuancé amarante, macules noires, centre et bord de la fleur nuancés blanc, beau coloris très-frais.  
 279. **Madame Leclercq** (*Delesalle*), fleur ondulée, rose violacé très-frais, centre et bord des pétales blanc pur.  
 280. **Lysandre** (*Delesalle*), fleur très-grande, les cinq pétales maculés noir, nuancés feu et bordés blanc carné rose.  
 281. **M. Duhamel** (*Delesalle*), fleur grande, bien faite, rose chamois, larges macules noirâtres lignées cramoisi.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

### A CINQ MACULES.

|   | Fr. C. |  | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 42. Prince of Novelties ( <i>Henderson</i> ) . . . . .      | 2 "    | 262. Mad. Evrard ( <i>Evrard</i> ) . . . . .   | 3 "    |
| 54. Ville de Caen ( <i>Evrard</i> ) . . . . .               | 2 "    | Perfection du Pelarg. <i>Ville de Caen</i> ; fleurs moins grandes, mais mieux faites, coloris plus vif, bordé blanc.                           |        |
| 78. Théophraste ( <i>Delesalle</i> ) . . . . .              | 2 "    | 263. M. Ch. Zeller ( <i>Spitzer</i> ) . . . . .  | 3 "    |
| 231. Queen Victoria ( <i>W<sup>m</sup> Bull</i> ) . . . . . | 5 "    | Double dans le genre du Pelarg. <i>Prince of Novelties</i> , cramoisi feu bordé rose, à cinq larges macules noirâtres, variété très-distincte. |        |

C'est la plus brillante des variétés à grandes fleurs pleines qui ait jamais été gagnée.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce : 75 centimes.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 5. Eléonore Petit ( <i>Mézard</i> ).       | 52. Gloire de Crimée ( <i>Duf.</i> ). |
| 51. Gloire de Paris ( <i>Guillardat</i> ). | 277. Benoiton ( <i>Lemoine</i> ).     |

## PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

 Tout ce qui n'est pas **supérieur** a été supprimé.

N. B. L'Établissement achète tout ce qui paraît en fait de nouveautés ; mais il n'en conserve que l'élite, et détruit le reste comme indigne d'être offert à sa clientèle.

### PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 75 centimes. — Douze variétés : 6 francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.  
 112. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).  
 119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales supérieurs maculés blanc, variété naine très-précieuse pour massifs, de 1<sup>er</sup> ordre.  
 135. **Président Réveil** (*Nardy frères*). Variété de 1<sup>er</sup> ordre, très-naine, se ramifiant bien, floraison des plus abondantes, grande fleur écarlate velouté, centre blanc.  
 205. **Monitor** (*Beaton*). Nosegay ; rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds, variété très-naine.  
 207. **Beauté de Suresne** (*Varingue*). Rose vif maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.  
 214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orangé, centre blanc, très-belle variété.  
 220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur, très-belle.  
 226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orangé bordé blanc.  
 246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.  
 259. **Antoni** (*Plaisançon*). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.



267. M<sup>me</sup> Marie Van Houtte (*Lemoine*). Très-large centre blanc entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
280. Gloire des rouges (*H. Delesalle*). Écarlate vif.
284. Peeress (*Bull*). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
287. Gloire de Douai (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé refleté feu, centre blanc pur, coloris éblouissant, fortes ombelles en boule.
301. King of Whites (*Henderson*). Blanc pur.
303. Dr Newham (*Henderson*). Très-belle variété, très-distincte, beau bouquet et bon port, fleurs rose carminé clair, zone des feuilles bronzée, large.
304. Pink Stella (*Henderson*). Nosegay; rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
307. Gloire des Nosegays (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
310. Rose d'Amour (*Boucharlat*). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
316. D<sup>e</sup> Ricci (*Plaisançon*). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
338. Sambo (*Dornie and Laird*). Bouquets énormes, écarlate foncé, coloris le plus vif existant.
340. Harry Hiover (*Mézard jeune*). Nosegay; vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
343. Sambico (*Desbois*). Saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. Mad. Beeckman (*Desbois*). Nosegay; rose amarante violacé, pétales supérieurs maculés cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
348. Striatum (*Jarlot*). Saumon vif strié blanc, énorme ombelle.
349. Surpasse beauté de Suresnes (*Cassier*). Bouquets énormes, fleurs très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
362. Magenta (*Boulanger*). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. Nicolas Boulanger (*Boulanger*). Écarlate vif, centre blanc.
364. Prés. Abeille du Perrin (*Boulanger*). Saumon foncé, centre blanc.
365. Gloire de Mazargue (*Boulanger*). Fond blanc ombré rose saumoné, très-grande fleur.
369. Marquis d'Aix (*Boucharlat*). Rose violacé, variété très-florifère.
383. Madem. Nilsson (*H. Demay*). Nosegay; beau rose lilacé, centre blanc.
389. Jean Sisley (*Lemoine*). Écarlate très-vif, centre blanc.
399. Lord Derby (*John Mann*). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
405. La Fontaine (*Lemoine*). Vermillon, centre et bords blancs.
428. Madame Lemoinier (*Calot*). Saumon clair, centre et bords des pétales blancs.
430. Madame Rœmpler (*Calot*). Rose violacé, pétales supérieurs maculés blanc.
435. Chanoine W. Moreau (*Bruant*). Saumon bordé blanc rosé.
436. Paul Fournier (*Bruant*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
441. Charles Bouchy (*Rendatler*). Écarlate foncé, très-grande fleur.
444. Madame Liabaud (*Rendatler*). Saumon clair veiné et bordé blanc.
446. Victor Didier (*Rendatler*). Écarlate très-foncé, variété naine.
455. Diogène (*Poizeau aîné*). Nosegay; vermillon orangé.
456. J. Ricand (*Puteaux-Chaimbault*). Rouge vermillon.
461. Madame Siesmayer (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.
486. Mad. Jules Aldebert (*Delesalle*). Nosegay; rose clair, très-grande fleur.
492. Charming (*Bull*). Centre blanc, auréole saumon bordé blanc.
494. Herald (*Bull*). Rose saumoné, centre blanc.
502. Lucius (*Bull*). Orange vermillon, une des meilleures variétés pour pleine terre.
503. Isabelle Guérin (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bords blancs.
504. Crimson Nosegay (*Bull*). Écarlate très-foncé.
509. Mad. Hoste (*Lemoine*). Nosegay; blanc nuancé lilas.
511. A fleur tricolore (*Tête d'or à Lyon*). Blanc rubané rose, vert et saumon; variété curieuse, très-florifère.
515. Buisson blanc (*Calot*). Blanc pur, revers des pétales veiné rouge.
517. Henri Delesalle (*Calot*). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
520. Madame L. Courmont (*Calot*). Saumon très-clair, centre blanc.
523. M. Macarez (*Calot*). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
524. M. Paul Risbourg (*Calot*). Vermillon très-vif.
526. Chevandier de Valdrôme (*Lemoine*). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
528. Flambeau (*Lemoine*). Cramoisi foncé, pétales supérieurs maculés feu.
530. Peabody (*Lemoine*). Amarante foncé, forme extra.



540. Arlequin (*Delesalle*). Saumon vif strié blanc.
541. Coquette (*Delesalle*). Rose tendre strié et rubané blanc, variété naine et florifère.
542. Floribundum album. Blanc pur.
544. Madame Rœmpler (*Rœmpler*). Nosegay; violet foncé.
552. Comte de Turenne (*Lierval*). Feu brillant, forte ombelle.
553. Dr Andry (*Lierval*). Orange vif, très-forte ombelle.
556. M. Gigre (*Lierval*). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
557. Triomphe de Neuilly (*Lierval*). Rouge amarante clair, forte ombelle.
558. Arthur Pearson (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-large.
560. Douglas Pearson (*Pearson*). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
561. Duke of Devonshire (*Pearson*). Écarlate teinté violet.
562. E. J. Lowe (*Pearson*). Rose amarante, fleur très-large, pétales bien ronds.
563. Lawrence (*Pearson*). Rose ombré violet.
565. Thomas Speed (*Pearson*). Rouge cerise, très-grande fleur.
566. W. Thomson (*Pearson*). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
574. Brésilien (*Delesalle*). Rouge vineux nuancé rouge sang, maculé violet sur chaque pétale.
578. François Desbois (*Aldebert*). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
579. Marie Aldebert (*Aldebert*). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
580. Mad Legrelle-Dhanis (*Aldebert*). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
581. Mad. V. Thaillier (*Aldebert*).
589. M. Gladstone (*Williams*). Nosegay; écarlate vif nuancé vermillon, variété naine.
590. Mr<sup>s</sup> Upton (*Williams*). Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, variété très-florifère, extra pour pleine terre.
592. Prometheus (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.
598. Brave Denfert (*Lemoine*). Laque clair, centre blanc.
601. Président Thiers (*Lemoine*). Saumon brillant, large fleur.
602. Claude de la Meurthe (*Lemoine*). Rose groseille vif.
603. Président Grévy (*Lemoine*). Beau rouge, pétales supérieurs teintés écarlate et pointés blanc, variété naine.
604. Général Faidherbe (*Lemoine*). Large fleur, rouge laque.
608. Hospitalité suisse (*Lemoine*). Extra comme forme, écarlate à cœur blanc.
609. Le Lord Maire (*Lemoine*). Bouquet énorme, extra comme forme, carmin clair violacé moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.
610. Richard Wallace (*Lemoine*). Belle fleur carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc, forme extra.
612. Comtesse de Courcy (*Boutard*). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés blanc.
613. Hélène de Nadaillac (*Boutard*). Blanc pur étoilé rouge clair au centre.
614. Lina Boutard (*Boutard*). Nosegay; bouquet énorme, lilas clair maculé blanc.
616. Vendôme (*Boutard*). Nosegay; rouge saumoné, très-forte ombelle.
624. M. Gaydet (*Delesalle*). Bonne forme, carmin clair, pétales supérieurs orangés.
625. Striatum perfectum (*Delesalle*). Bonne forme, orange nuancé saumon, entièrement strié blanc.

## PELARGONIUM ZONALE.

### DEUXIÈME SÉRIE.

Pièce . . . . . 1 franc.

706. Stella (*Rendatler*). Saumon clair strié blanc.
707. Quadricolor. Écarlate vif flammé plus foncé et carmin, cœur blanc.
708. Alcyon (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
709. Artaban (*Boutard*). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
710. Duchesse de Maillé (*Boutard*). Lilas carné clair, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
711. Saturne (*Lavertu*). Écarlate clair, beau bouquet.
712. Albert Grévy (*Lemoine*). Large bouquet de forme extra, saumon vif.
714. Avenir national (*Lemoine*). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.



715. **Le Message** (*Lemoine*). Carmin clair violacé.  
 716. **M. Littré** (*Lemoine*). Écarlate foncé vif, pétales supérieurs teintés orange.  
 719. **Julius Berchermann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés, forte ombelle.  
 721. **Robert Baier** (*Zaubitz*). Nosegay ; vermillon vif, unicolore, forte ombelle.  
 723. **Jacob Meth** (*Zaubitz*). Fleur et bouquet énormes, d'un beau rouge.  
 727. **Adonis** (*Crousse*). Extra comme forme, orange nuancé saumon.  
 728. **Mad. Benoît** (*Crousse*). Nosegay ; très-large bouquet, rouge clair saumoné.  
 730. **Mad. Germain** (*Crousse*). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.  
 732. **Mad. Irma des Forges** (*Ballet*). Rose hortensia.

## PELARGONIUM ZONALE.

### TROISIÈME SÉRIE.

Pièce . . . . . 2 francs.

734. **De Rémusat** (*Lemoine*). Rose purpurin, nouvelle teinte.  
 735. **Jules Simon** (*Lemoine*). Couleur très-riche, coquelicot orangé.  
 737. **Le maire de Nancy** (*Lemoine*). Rouge carmin recouvert de veinules carmin brillant.  
 738. **Michelet** (*Lemoine*). Carmin rose, blanc à la base des pétales.  
 739. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur, variété très-florifère.  
 740. **Achilles** (*W. Paul*). Orange écarlate, cœur blanc.  
 741. **Acidalie** (*W. Paul*). Écarlate vif.  
 742. **Barron** (*W. Paul*). Forme extra, écarlate orangé.  
 743. **Lucretia** (*W. Paul*). Beau bouquet blanc à reflet extrêmement tendre.  
 744. **M. J. George** (*W. Paul*). Grandes fleurs écarlate orangé clair.  
 745. **Perseus** (*W. Paul*). Bonne forme, écarlate, cœur blanc.  
 747. **Théocrites** (*W. Paul*). Grand bouquet écarlate orangé, cœur blanc.  
 748. **Theresa** (*W. Paul*). Écarlate légèrement nuancé carmin sur les pétales supérieurs.  
 749. **Ulysses** (*W. Paul*). Écarlate orangé vif.  
 750. **Virgile** (*W. Paul*). Nosegay ; bouquet énorme, rouge clair.  
 751. **Madeleine Boy** (*F. Brassac*). Bouquet énorme, très-compacte, rouge très-vif.  
 752. **M. Bogues** (*F. Brassac*). Grandes fleurs rouge vermillonné.  
 753. **Beauté des squares** (*F. Brassac*). Rose clair vif reflété saumon.  
 754. **Cecily Tibbey** (*F. Brassac*). Lilas lavé orange vermillonné.  
 755. **Telitz** (*F. Brassac*). Nosegay ; grand bouquet rouge éblouissant.  
 756. **La Vienne** (*Bruant*). Blanc extrêmement pur, bouquet serré.  
 757. **Dr Issartier** (*Bruant*). Bouquet excessivement large, du plus riche saumon.  
 758. **Panthéon** (*Bruant*). Blanc de lait étoilé rouge clair au centre.  
 760. **Mad. Dècle** (*Bruant*). Extra comme forme, rose vif moucheté blanc.  
 768. **Edmond Deroux** (*Bruant*). Beau bouquet saumon orange.  
 769. **Mad. Vourion** (*Bruant*). Beau carmin légèrement reflété orange.  
 770. **Talisman** (*Bruant*). Nosegay ; grand bouquet rouge extrêmement vif.  
 771. **Etoile du Nord** (*Bruant*). Saumon vif, centre blanc pur, extra.  
 772. **Feu sacré** (*Bruant*). Rouge de saturne vif, grande fleur, bouquet bien fait.  
 773. **Ferdinand Desweert** (*Crousse*). Bouquet bien fait, carmin très-tendre, extra.  
 774. **Baron de la Coste** (*Crousse*). Carmin extrêmement vif, pétales supérieurs orangés, belle forme.  
 775. **Abbé Fruminet** (*Crousse*). Écarlate très-vif, cœur blanc.  
 776. **La Patrie** (*Crousse*). Rouge cerise reflété orange aux onglets.  
 777. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Écarlate passant à l'orange vif, fleurs énormes.  
 778. **M. Laine** (*Delesalle*). Grand bouquet carmin vif reflété orange.  
 779. **M. Léon Willoquaix** (*Delesalle*). Cerise vif carminé, beau bouquet.  
 780. **Triomphant** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé rose, variété superbe.  
 781. **M. Willerval** (*Delesalle*). Beau carmin très-distingué, pétales supérieurs orange vif, extra.  
 782. **Lothaire** (*Delesalle*). Fleurs extrêmement larges, beaux bouquets rouge vif.  
 783. **Florimond Pourbaix** (*Delesalle*). Carmin tendre, pétales supérieurs légèrement nuancés orange, grand bouquet.  
 794. **Théodule** (*Delesalle*). Ombelle volumineuse, rose magenta, pétales supérieurs flammés orange.



795. **M. Delombaerde** (*Delombaerde*). Rosé, centre carmin, coloris nouveau, plante naine et florifère. Cette variété, cultivée en serre, produit un effet charmant.
796. **Jules Grolet** (*Delombaerde*). Genre Nosegay; bouquets compactes, énormes, beau rose groseille très-vif, flammé feu sur les pétales supérieurs.
797. **Berton Seulin** (*Delombaerde*). Ombelles monstrueuses, chamois nuancé saumon, variété admirable et de grand effet.
798. **Perfection** (*Delombaerde*). Fleur de forme irréprochable, d'un beau coloris rouge orangé, centre blanc.
799. **Candeur** (*Delombaerde*). Forte ombelle de fleurs rose clair nuancé lilas, grand centre blanc, variété florifère.
800. **Gros Papa** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse, pédoncule sortant bien du feuillage, blanc fortement lavé saumon lilacé.
804. **M. Laprévote** (*Bertier-Rendatler*). Fleurs des plus grandes, vermillon vif, œil blanc.
806. **Sensation** (*Bertier-Rendatler*). Fleurs parfaites, frisées, violet carminé, œil blanc bordé feu, extra.
808. **Apollon** (*Bertier-Rendatler*). Groseille fouetté et marginé feu et lilas, bords dentelés.
809. **Tunis** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; carné tendre strié et marbré blanc.
812. **Comte de Flavigny** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay; vermillon vif à reflet velouté.
813. **Amazone** (*Bertier-Rendatler*). Mauve lilacé sablé et pointillé carmin, extra.

## PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1874.

### QUATRIÈME SÉRIE.

*Pièce.* . . . . . 3 francs.

827. **Drapeau français** (*Lemoine*). Très-grandes ombelles, orange vif vermillonné, de 1<sup>er</sup> ordre.
828. **Le Sénat** (*Lemoine*). Grandes ombelles, blanc de lait.
829. **Progrès libéral** (*Lemoine*). Rose violet Cyclamen, belle variété.
830. **Resplendens** (*Malet*). Coloris vif, de 1<sup>er</sup> ordre.
831. **Enfant de Nancy** (*Lemoine*). Nosegay; rouge acajou marqué feu aux pétales supérieurs.
835. **Député Valentin** (*Lemoine*). Nosegay; rouge pourpre foncé violacé, ombelles énormes, variété naine et très-belle.
837. **Ere nouvelle** (*Lemoine*). Rose amarante, belle forme.
842. **Juanita** (*Bull*). Saumon rose, plus foncé vers le centre qui est blanc.
843. **Potamas** (*Bull*). Brillant écarlate clair, les pétales supérieurs nuancés cramoisi.
844. **Hébé** (*Bull*). Blanc pur nuancé et irrégulièrement marqué saumon, centre saumon rosé, très-belle variété.
845. **Thétis** (*Bull*). Blanc pur, zoné rose au centre de la fleur.
846. **Adair** (*Bull*). Riche carmin, pétales épais de couleur cire, extra.
847. **Salvator** (*Bull*). Écarlate brillant, œil blanc.
848. **Jubilee** (*Bull*). Rose laque tendre, très-distinct.
849. **Métis** (*Bull*). Grande fleur écarlate vif, œil blanc.
850. **Pallas** (*Bull*). Rose foncé marqué blanc sur les pétales supérieurs.
851. **Europa** (*Bull*). Variété florifère, riche écarlate, œil blanc, forme parfaite.
852. **Ernestine** (*Bull*). Rose carné nuancé saumon, rose vers le centre.
853. **Cameron** (*Bull*). Magenta pourpre marqué vermillon sur les pétales supérieurs.
866. **Fairy** (*Bull*). Carné richement moucheté et refleté saumon foncé, très-belle variété.
867. **Beauty** (*Bull*). Grande fleur, blanc strié et piqué rose et saumon, de bel effet.
868. **Charmer** (*Bull*). Blanc pur strié et pointé rose, très-belle variété.
869. **Spangle** (*Bull*). Blanc clairement strié et moucheté rose brillant.



## PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1875.

## CINQUIÈME SÉRIE.

*Pièce* . . . . . 4 francs.

815. *Admiranda (Bull)*. Nosegay; l'une des variétés les plus remarquables qui aient jamais été obtenues : ses fleurs sont d'un coloris extrêmement tendre, la base de chacun de ses pétales, ornée de saumon écarlate, donne à l'ensemble de la fleur un cachet de beauté tout spécial.
816. *Algernon (Bull)*. Nosegay; brillante variété d'un carmin fort riche.
817. *Cerès (Bull)*. Nosegay; violet magenta à pétales supérieurs d'un beau vermillon, coloris tout nouveau dans cette section.
818. *Como (Bull)*. Nosegay; cerise ombré carmin, variété des plus distinguées.
819. *Doris (Bull)*. Nosegay; rose très-tendre, les pétales supérieurs à taches blanches très-belles.
820. *Eunomia (Bull)*. Nosegay; rouge foncé ombré écarlate, variété remarquablement belle.
821. *Juno (Bull)*. Nosegay; magnifique fleur rose foncé ombré violet laque, variété de toute beauté.
822. *Ossian (Bull)*. Nosegay; riche cramoi, tous les sommets des pétales mouchetés d'une tache écarlate.
823. *Periplus (Bull)*. Nosegay; fleurs en gros bouquets d'un brillant rose carminé.
824. *Strepho (Bull)*. Nosegay; écarlate vermillon, fleurs larges, supérieurement formées.
825. *Tapos (Bull)*. Nosegay; rose cerise, beaux bouquets de première dimension.
826. *Thapto (Bull)*. Nosegay; larges bouquets d'un riche rouge magenta de toute beauté.
874. *Burnouf (Lemoine)*. Nosegay; rouge fuchsine, pétales supérieurs teintés feu.
875. *La chose publique (Lemoine)*. Grandes ombelles rouge pourpre foncé violacé, fleurs bien faites.
876. *La Tour d'Auvergne (Lemoine)*. Grandes fleurs groseille clair, couleur nouvelle.
877. *Lieutenant Bellot (Lemoine)*. Fleurs et ombelles très-grandes, cinabre foncé.
878. *R. Töppfer (Lemoine)*. Très-grandes fleurs orange pâle marbré rose.
879. *Voltaire (Lemoine)*. Grandes ombelles, fleurs parfaites, rouge vermillon orangé.
880. *Caln Wright (Pearson)*. Écarlate.
881. *Caxton (Pearson)*. Cramoi nuancé violet.
882. *Corsair (Pearson)*. Écarlate brillant, forme parfaite.
883. *Ernest (Pearson)*. Écarlate brillant.
884. *Mrs Turner (Pearson)*. Bouquet splendide, rose foncé.
885. *Lady Byron (Pearson)*. Rose.
886. *Mrs Rogers (Pearson)*. Rose pâle.
887. *Lucy Bosworth (Pearson)*. Rose clair.
888. *Ethel (Pearson)*. Lilas rosé.
889. *Mrs T. F. Fenn (Pearson)*. Rose lilacé.
890. *Annie Orton (Pearson)*. Rose pourpre.
891. *Laura Strachan (Pearson)*. Rouge brique.
892. *Ellen (Pearson)*. Saumon.
893. *Mrs Vickers (Pearson)*. Amarantacé.
894. *Rev. F. Atkinson (Pearson)*. Écarlate.
895. *Ino Gibbons (Pearson)*. Écarlate foncé.
896. *Brutus (Pearson)*. Écarlate vif.
897. *Pirate (Pearson)*. Écarlate carminé.
898. *Rev. S. Hey (Pearson)*. Rouge.
899. *Sir H. S. Stanhope (Pearson)*. Cramoi très-foncé.
900. *Charles Smith (Pearson)*. Cramoi vif.
901. *Mrs Leacroft (Pearson)*. Rouge, œil blanc.
902. *Mrs Whitely (Pearson)*. Écarlate, œil blanc.
903. *A. Henderson (Pearson)*. Cocciné, centre blanc.
904. *Earl Manvers (Pearson)*. Cramoi vif, centre blanc.
905. *Dora Charlton (Pearson)*. Cramoi, œil blanc.
906. *Laura (Pearson)*. Cramoi foncé, œil blanc.
907. *John Fellowes (Pearson)*. Cerise vif.
908. *Mrs Huish (Pearson)*. Rouge cerise,



909. Little Carr (*Pearson*). Rouge cerise carminé.  
 910. Mrs Paget (*Pearson*). Rose.  
 911. Mabel Eden (*Pearson*). Rose vif.  
 912. Mrs Mellish. Rose clair.  
 913. Evelyn Mellish (*Pearson*). Rose foncé.  
 914. Louisa Smith (*Pearson*). Cramoisi rosé.  
 915. Mrs W. Brown (*Pearson*). Cramoisi rosé, œil blanc.  
 916. Mulberry (*Pearson*). Violet foncé.  
 917. Lady Scudamore Stanhope (*Pearson*). Rouge orange.  
 918. Mrs Jacoby (*Pearson*). Rose saumoné.  
 919. Madem. Jeanne Colliard (*Méard*). Minium orangé à reflets plus clairs sur les bords, centre des pétales pourprés, pétales supérieurs maculés plus clair.  
 920. Président Mac Mahon (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné à bords plus clair, œil blanc.  
 921. Le Calvados (*Bruant*). Rouge très-éclatant.

## PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1876.

### SIXIÈME SÉRIE.

Pièce . . . . . 5 francs.

935. Géant des batailles (*Delesalle*). Rouge sang.  
 936. Alcibiade (*Delesalle*). Fleur très-grande, fortes ombelles rouge saumoné, fortement nuancé violet clair au centre.  
 937. Henry Delhay (*Delesalle*). Gros bouquets à pédoncules raides, orange carminé, très-bon pour pleine terre.  
 938. M. Gavelle père (*Delesalle*). Ombelles énormes d'un beau cerise carminé.

## PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

### SEPTIÈME SÉRIE.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 380. Mad. Lemoine ( <i>Lemoine</i> ), rose cent-feuilles. . . . .   | " 50   |
| 391. E. G. Henderson ( <i>Aldebert</i> ), rouge cramoisi, florifère. . . . .                                | " 50   |
| 414. Vésuve ( <i>Lemoine</i> ), écarlate. . . . .   | " 50   |
| 445. Tom Pouce Marie Lemoine ( <i>Lemoine</i> ), rose clair, variété naine, extra . . . . .                 | " 50   |
| 452. Wilhelm Pfitzer ( <i>Lemoine</i> ). . . . .  | " 50   |
| 470. Marie Crousse ( <i>Crousse</i> ), rose glacé satiné, superbe . . . . .                                 | " 50   |
| 497. M. de St-Jean ( <i>Crousse</i> ), rose foncé carminé . . . . .   | " 50   |
| 512. Mad. Michel Buchner ( <i>Lemoine</i> ), rose saumoné . . . . .   | " 50   |
| 532. Louis Van Houtte ( <i>Lemoine</i> ), minium foncé . . . . .  | " 50   |
| 535. M. Gladstone ( <i>Lemoine</i> ), rose vif orangé . . . . .   | " 50   |
| 587. Mary Elisabeth ( <i>Bull</i> ), rose pâle. . . . .   | " 50   |
| 599. Patriote Lorrain ( <i>Lemoine</i> ), rose carminé vif et feu, superbe . . . . .                        | " 50   |
| 605. Préfet de Lyon ( <i>Lemoine</i> ), écarlate velouté pourpre . . . . .                                  | " 50   |
| 618. Rose de Mai ( <i>Crousse</i> ), rose carné tendre glacé, en coupe . . . . .                            | " 50   |
| 623. Rose pur ( <i>Alégatière</i> ), beau rose lilacé . . . . .   | " 50   |
| 628. Alice Crousse ( <i>Crousse</i> ), carné vif, centre saumon . . . . .                                   | 1 "    |
| 629. Aline Sisley ( <i>Jean Sisley</i> ), blanc passant au rose pâle, variété naine, florifère . . . . .    | 1 "    |
| 633. Aurora ( <i>Lawton</i> ). . . . .  | 1 "    |
| 636. Charles Darwin ( <i>Jean Sisley</i> ), cramoisi pourpre . . . . .                                      | 1 "    |
| 645. E. J. Lowe ( <i>Lawton</i> ) . . . . .   | 1 "    |
| 646. Éblouissant ( <i>Delesalle</i> ), rouge feu nuancé orange . . . . .                                    | 1 "    |
| 657. Jeanne Alégatière ( <i>Alégatière</i> ), rose lilas clair . . . . .                                    | 1 "    |
| 659. Jewel ( <i>Lawton</i> ), écarlate foncé . . . . .  | 1 "    |
| 664. Louis Delesalle ( <i>Delesalle</i> ), cerise à reflet écarlate, légèrement carminé. . . . .            | 1 "    |
| 671. Mad. Henri Delesalle ( <i>Delesalle</i> ), rose carminé très-frais, variété naine, florifère . . . . . | 1 "    |



674. Mad. Vergeot (*Crousse*), rose primevère lilacé, centre blanc . . . . . 1 n
677. Malvæflorum (*Delesalle*), mauve nuancé violet. . . . . 1 n
679. Mathilde Cuny (*Crousse*), très-grandes fleurs rouge carminé vif, pétales extérieurs rouge violacé, extra . . . . . 1 n
762. Le Destin (*Bruant*), rouge vineux particulier, variété très-naine . . . . . 2 n
763. M. Boissier (*Bruant*), rose groseille vif à reflets amarante foncé sur le bord des pétales . . . . . 2 n
764. Métamorphose (*Bruant*), rose orange très-vif, extrémité des pétales nuancée amarante. . . . . 2 n
765. Mad. Desrozeaux (*Bruant*), rose tendre uniforme, extra-beau . . . . . 2 n
766. Carnea plena (*Crousse*), carné tendre glacé transparent, en forme de rosace . . . . . 2 n
767. Joseph Sada (*Crousse*), rouge de saturne vif et vermillon, revers des pétales blanc. . . . . 2 n
784. Ravissant (*Delesalle*), de forme originale, rose cerise nuancé carmin. . . . . 2 n
785. M. Demay-Hoez (*Delesalle*), corise orangé, de bel effet . . . . . 2 n
791. Mad. Lemoinier (*Delesalle*), saumon clair fortement nuancé blanc, variété naine et florifère . . . . . 3 n
792. Mad. Léonie Le Guay (*Delesalle*), blanc carné nuancé rose frais . . . . . 3 n
793. Tricolor (*Delesalle*), saumon strié et rubané rose et blanc . . . . . 5 n
801. Marie Bertier (*Bertier-Rendatler*), chair satiné, bords teintés blanc rosé. . . . . 2 50
802. Comtesse de Beurgos (*Bertier-Rendatler*), saumon clair à reflets argentés . . . . . 2 50
803. Madem. Léonie Van Houtte (*Bertier-Rendatler*), abricot tendre strié et rubané blanc. . . . . 2 50
805. Comte de Lambertye (*Bertier-Rendatler*), garance foncé velouté, centre blanc . . . . . 2 50
807. Mad. Am. de Cazanove (*Bertier-Rendatler*), blanc teinté mauve clair. . . . . 2 50
810. Ferdinand d'Aragon (*Bertier-Rendatler*), orange saumoné, parfois liseré blanc . . . . . 2 50
811. Mad. Sadoul (*Bertier-Rendatler*), rose hortensia maculé blanc . . . . . 2 50
814. Mad. de Champeaux (*Bertier-Rendatler*), rose brillant, centre blanc . . . . . 2 50
832. Général Saussier (*Lemoine*), rose vif violacé, centre blanc transparent . . . . . 3 n
833. Diego Poëda (*Lemoine*), rose laque vif, fleurs grandes . . . . . 4 n
834. Le père Secchi (*Lemoine*), rouge de saturne, variété demi-naine, extra . . . . . 3 n
836. Victor Hugo (*Lemoine*), aurore orange éclatant, couleur nouvelle de grand effet . . . . . 4 n
838. Emily Laxton (*Laxton*), écarlate très-beau . . . . . 5 n
839. Guiding Star (*Laxton*), rose pourpre, variété touffue et très-naine . . . . . 5 n
840. Illuminator (*Laxton*), carmin pourpre très-distinct, extra . . . . . 4 n
870. La Constitution (*Lemoine*), saumon aurore brillant . . . . . 5 n
871. Le réserviste (*Lemoine*), rose fleur de pêcher, grands et larges bouquets . . . . . 5 n
872. Le Phare (*Lemoine*), brique orangé, ombelles de grande dimension . . . . . 5 n
873. L'Herzégovine (*Lemoine*), rose violet, grandes ombelles aplaties, variété florifère. . . . . 5 n
922. Auguste Villame (*Crousse*), variété imbriquée, naine, très-florifère, rouge minium vif orangé . . . . . 5 n
923. Comte d'Incourt (*Crousse*), saumon feu très-vif, centre apparent blanc pur, variété très-florifère . . . . . 5 n
924. Edouard Lequin (*Crousse*), rouge amarante violacé, centre nuancé rouge vif, variété très-florifère. . . . . 5 n
925. Marquis de Chambon (*Crousse*), saumon vif tout strié et flammé blanc et rose, extra. . . . . 5 n
926. Marguerite Bruant (*Bruant*), rose aurore saumoné, blanchissant sur les bords . . . . . 5 n
927. M. G. Raverdy (*Delesalle*), violet carminé, riche coloris. . . . . 8 n
928. Souvenir de Carpeaux (*Delesalle*), pétales supérieurs rouge vermillon, pétales inférieurs cerise violacé, variété très-naine et très-florifère . . . . . 8 n
929. Mad. Anssens (*Delesalle*), rose clair carminé, très-frais. . . . . 8 n
930. Fleur de mai (*Delesalle*), blanc pur, variété très-florifère . . . . . 8 n
931. M. Bourgeois (*Delesalle*), saumon orangé . . . . . 8 n
932. Sénateur Testelin (*Delesalle*), orange vermillon, le plus éclatant des coloris connus . . . . . 8 n
933. M. César Routier (*Delesalle*), orange cuivré nuancé violet, de grand effet . . . . . 8 n
934. M. Dibos (*Delesalle*), fleurs en forme de rosace, blanc porcelaine, centre rose glacé . . . . . 8 n



# PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

## HUITIÈME SÉRIE.

|  | Fr. C. |   | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 801. Alma ( <i>Turner</i> ). . . . .                       | n 50   | 943. Humming Bird ( <i>Henderson</i> ). . . . .   | 2 n    |
| 803. Countess of Warwick ( <i>Kinghorn</i> ). . . . .      | n 50   | 945. Autumn ( <i>Pearson</i> ). . . . .   | 2 n    |
| 807. Silver Queen ( n ). . . . .                           | n 50   | 946. Ben Hine ( n ). . . . .  | 3 n    |
| 808. Golden Chain ( <i>Fraser</i> ). . . . .               | n 50   | 948. Edith ( n ). . . . .   | 2 n    |
| 813. Mountain of Snow ( <i>Lennox</i> ). . . . .           | n 50   | 949. Waverley ( n ). . . . .  | 2 n    |
| 821. Golden Tom . . . . .                                  | n 50   | 950. Star of India . . . . .  | 2 n    |
| 823. Flower of Spring ( <i>Turner</i> ). . . . .           | n 50   | 952. Artemus Ward. . . . .  | n 50   |
| 828. Golden Vase ( <i>Henderson</i> ). . . . .             | n 50   | 953. Burning Bush . . . . .   | n 50   |
| 829. Fairy ( n ). . . . .                                  | 1 n    | 954. Silver Cord ( <i>Shenton</i> ). . . . .  | 2 n    |
| 830. Silver Nosegay ( <i>Beaton</i> ). . . . .             | n 50   | 955. Mr Rutter . . . . .  | 2 n    |
| 831. Medea ( <i>Williams</i> ). . . . .                    | n 50   | 967. Bijou. . . . .   | n 50   |
| 835. M <sup>rs</sup> Pollock ( <i>Henderson</i> ). . . . . | n 50   | 971. Fontainebleau . . . . .  | n 50   |
| 837. Glowworm ( n ). . . . .                               | n 50   | 972. Jane . . . . .   | n 50   |
| 838. Queen of Queens ( <i>Weatherill</i> ). . . . .        | n 50   | 973. Louisa Smith . . . . .   | n 50   |
| 841. Sunset ( <i>Henderson</i> ). . . . .                  | n 50   | 974. Madeleine Schiller. . . . .  | n 50   |
| 842. Little Beauty ( n ). . . . .                          | n 50   | 977. Snow-drop . . . . .  | n 50   |
| 843. Gold Pheasant ( n ). . . . .                          | n 50   | 981. Peter Grieve ( <i>Henderson</i> ). . . . .   | 4 n    |
| 845. Elegans ( n ). . . . .                                | n 50   | 984. Countess of Flanders ( <i>W. Paul</i> ). . . . .   | 4 n    |
| 847. Reine d'or ( <i>Bouchariat</i> ). . . . .             | n 50   | 985. Duchess of Edinburgh ( n ). . . . .  | 4 n    |
| 849. Gold Finch ( <i>Henderson</i> ). . . . .              | n 50   | 986. Lady Dorothy Nevill ( n ). . . . .   | 4 n    |
| 850. Honeycomb ( n ). . . . .                              | n 50   | 989. Arbaces ( <i>Bull</i> ). . . . .   | 6 n    |
| 851. Kenilworth ( n ). . . . .                             | n 50   | Feuillage jaune d'or, zoné bronze foncé, fleurs écarlates foncé, de bonne forme et de première dimension. |        |
| 852. Oriana Improved ( n ). . . . .                        | n 50   | 990. Capella ( <i>Bull</i> ). . . . .   | 6 n    |
| 853. Rosette ( n ). . . . .                                | n 50   | Feuillage jaune canari, zoné bronze à reflets.  |        |
| 855. The Empress ( n ). . . . .                            | n 50   | 991. Epirus ( <i>Bull</i> ). . . . .  | 6 n    |
| 856. Golden Cerise unique ( n ). . . . .                   | n 50   | Feuillage vert d'herbe très-clair, zoné bronze très-foncé.  |        |
| 857. Fair Ellen ( n ). . . . .                             | n 50   | 992. Fides ( <i>Bull</i> ). . . . .   | 6 n    |
| 858. The Beauty ( n ). . . . .                             | n 50   | Feuillage jaune d'or, zoné bronze, ombré cinabre et bordé d'une ceinture jaune clair.                     |        |
| 859. M <sup>rs</sup> Benyon ( n ). . . . .                 | 1 n    | 993. Maritana ( <i>Bull</i> ). . . . .  | 6 n    |
| 860. Italia unita ( n ). . . . .                           | 1 n    | Riche feuillage jaune d'or foncé, zoné chocolat foncé et bordé jaune.                                     |        |
| 867. M <sup>rs</sup> Maxwell Hutton ( n ). . . . .         | n 50   | 994. Parthénopé ( <i>Bull</i> ). . . . .  | 6 n    |
| 874. International ( <i>Bull</i> ). . . . .                | 1 50   | Disque jaune, zoné rouge bronzé et bordé d'un ruban jaune canari.   |        |
| 879. Lucy Grieve ( <i>Henderson</i> ). . . . .             | 3 n    | 996. Beautiful Star. . . . .  | 2 n    |
| 881. Sophia Dumaresque ( n ). . . . .                      | 1 n    | 997. Oriental . . . . .   | 3 n    |
| 884. Jack O'Hazeldean ( n ). . . . .                       | 2 n    | 998. Queen of Spain . . . . .   | 2 50   |
| 886. Countess of Tyrconnel ( n ). . . . .                  | 1 n    | 999. Ealing Rival . . . . .   | 3 n    |
| 901. Little Beauty . . . . .                               | 1 n    | 1000. The Moonstone . . . . .   | 3 n    |
| 910. Lizzie ( <i>Bull</i> ). . . . .                       | 3 n    | 1001. Sultana Validé . . . . .  | 3 n    |
| 916. Egyptian Queen ( <i>Carter</i> ). . . . .             | 1 50   | 1002. Mrs Dunnett . . . . .   | 3 n    |
| 918. Justitia ( <i>Henderson</i> ). . . . .                | 2 n    | 1003. Koh-y-Noor . . . . .  | 3 n    |
| 919. Lady Cullum ( n ). . . . .                            | 1 n    |   |        |
| 922. Flower Queen ( n ). . . . .                           | 2 n    |   |        |

# PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE.

(*Pelargonium lateripes*).

## NEUVIÈME SÉRIE.

|  | Fr. C. |   | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 1056. <i>Lateripes album grandiflorum</i> . . . . .  | n 50   | 1064. <i>Lateripes Felicity</i> ( <i>Bull</i> ). . . . .      | n 50   |
| 1063. — <i>Butterfly</i> ( <i>Bull</i> ). . . . .    | n 50   | 1023. — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . . .               | n 50   |
| 1062. — <i>Duke of Edinburgh</i> . . . . .           | n 50   | 1042. — <i>aureo-variegatis</i> . . . . .                     | n 50   |
| 1074. — <i>Emperor</i> ( <i>Henderson</i> ). . . . . | n 50   | 1053. — <i>Grande-Duchesse Marie</i> ( <i>Bull</i> ). . . . . | n 50   |



|  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 1075. <i>Lateripes hederæfolium variegatum</i> . . . . . | 50     | 1054. <i>Lateripes Princess Alexandra</i> (Bull) . . . . . | 50     |
| 1065. — <i>Lavinia</i> (Bull) . . . . .                  | 50     | 1055. — — <i>Thyra</i> ( n ) . . . . .                     | 50     |
| 1060. — <i>L'élegant</i> . . . . .                       | 50     | 1067. — <i>Romance</i> ( n ) . . . . .                     | 50     |
| 1066. — <i>Neatness</i> (Bull) . . . . .                 | 50     | 1068. — <i>Treasure</i> ( n ) . . . . .                    | 50     |
| 1047. — <i>peltatum elegans</i> . . . . .                | 50     |  |        |

## PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE.

(Pelargonium lateripes).

NOUVEAUTÉS DE 1875.

|   | Fr. C. |
|---|--------|
| 1077. <b>Corinth</b> (Bull). Fleurs extrêmement distinctes et belles, d'un rose foncé ombré rose violet; les pétales supérieurs rubanés et ciliés rouge foncé . . . . . | 4      |
| 1078. <b>Hastia</b> (Bull). Pétales inférieurs blanc rosé, les supérieurs rosés, ciliés rose violet . . . . .   | 4      |
| 1079. <b>Leda</b> (Bull). Rose à centre plus clair, pétales supérieurs richement ciliés rouge violet, très-belle variété . . . . .                                      | 4      |
| 1080. <b>Nemansa</b> (Bull). Pétales rose lilacé, les supérieurs ciliés rouge vif . . . . .   | 4      |
| 1081. <b>Phoea</b> (Bull). Rose clair, les pétales supérieurs ciliés cramoisi, très-belle variété. . . . .  | 6      |
| 1082. <b>König Albert flore pleno</b> (Oscar Liebmann). Fleurs d'un rose violet très-vif, doubles . . . . .   | 10     |

## PELARGONIUM DIVERS.


|   | Fr. C. |   | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 1061. <i>ardens majus</i> . . . . .       | 3      | 1041. <i>filicifolium</i> . . . . .                   | 50     |
| 1073. <i>Campylla laciniata</i> . . . . . | 2      | 1069. <i>gibbosum</i> . . . . .                       | 2      |
| 1057. <i>Cooperi</i> . . . . .            | 50     | 1044. <i>Lady Plymouth</i> . . . . .                  | 50     |
| 1038. <i>echinatum</i> . . . . .          | 3      | 1070. <i>melananthum</i> . . . . .                    | 2      |
| 1090. — <i>Rosy Morn</i> . . . . .        | 1      | 1034. <i>Phymatanthus bicolor</i> . . . . .           | 1      |
| 1089. — <i>sæpeflorum</i> . . . . .       | 1      | 1098. <i>quinquevulnerum</i> . . . . .                | 1      |
| 1088. — <i>Spotted Gem</i> . . . . .      | 1      | 1048. <i>ribesifolium foliis variegatis</i> . . . . . | 50     |
| 1058. <i>elegantissimum</i> . . . . .     | 2      | 1104. <i>sarcocaulon Patersoni</i> . . . . .          | 2      |
| 1040. <i>Endlicherianum</i> . . . . .     | 4      | 1049. <i>triste</i> . . . . .                         | 50     |

## VARIÉTÉS

DE

## PENTSTEMON GENTIANOIDES.

## Choix d'élite.

 *N. B.* Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès. Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants. Ces *Pentstemon* marchent de pair avec les *Phlox*; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides*, type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidale, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

*Pièce* : 50 centimes. — *Douze belles variétés* : 5 francs.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 111. <i>Mad. Lebrun</i> (Rendatler). | 156. <i>Richard Guttermann</i> (Rendatler). |
| 127. <i>Aug. Paté</i> (Crousse).     | 159. <i>Castor et Pollux</i> (Lemoine).     |
| 138. <i>William Bull</i> ( n ).      | 167. <i>Linné</i> (Rendatler).              |
| 147. <i>Mad. Cerf</i> ( n ).         | 168. <i>Camille Prieur</i> (Crousse).       |



169. Emile Chaté (*Crousse*).
175. Agnès Laing.
177. Bossuet.
179. Bridemaid.
182. Faust.
183. Général Vinoy.
185. Jules Simon.
187. Prince Jérôme.
189. Suez.
190. Amnistie.
192. Courage.

193. Union.
194. Gumbleton.
198. Novelty.
200. Mad. Masson (*Bruant*).
202. Cicéron ( *n* ).

203. Lina (*Rendatler*) . . . . . fr. 2 "
204. Jason ( *n* ) . . . . . " 2 "
205. Lustre ( *n* ) . . . . . " 2 "

## PERYMENIUM DISCOLOR.

*Pièce* : 1 franc.

Très-ornemental, atteignant jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

## PIVOINES EN ARBRE.

*PÆONIA MOUTAN*.

Voir **Prix-Courant N° 165**, page 417.

## PYRETHRUM GOLDEN FEATHER.

*Pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 4 francs. — *Le cent* : 15 francs.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

## SALVIA.

*Pièce* : 50 centimes.

- |  |   |
|--|---|
| 4. <i>Salvia cacaliæfolia</i> (FLORE).           | 22. <i>Salvia patens</i> (FLORE, V, 503). |
| 6. — <i>gesneriæflora</i> (FLORE, XX, 129).      | 25. — <i>Grahami purpurata</i> .          |
| 10. — <i>ianthina</i> (FLORE, IX, 73).           | 26. — <i>involuta Deschampsiana</i> .     |
| 11. — <i>leucantha (barbata HORT.)</i> .         | (FLORE, XVIII, 136.)                      |
| 13. — <i>obtusa</i> (FLORE, XIV, 47).            | 29. — <i>Verschaffelti</i> .              |
| 15. — <i>splendens Soucheti</i> (FLORE, XI, 63). | 30. — <i>patens alba</i> (FLORE, V, 305). |
| 16. — <i>tricolor</i> (FLORE, XII, 108).         | 31. — <i>lantæfolia</i> .                 |

## N° 28. SALVIA SPLENDENS SOUCHETI FLORE ALBO.

*Pièce* : 1 franc.

Ce *Salvia* a toutes les qualités du *S. Soucheti*; il est très-florifère; ses fleurs et ses bractées, au lieu d'être rouges comme dans le type, sont entièrement blanches et de toute beauté, ce qui en fait une nouveauté hors ligne.

## UHDEA PYRAMIDATA.

*Pièce* : 1 franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3 mètres et plus de hauteur dans le courant d'un été, à planter en plein soleil.



# PLANTES BULBEUSES

pour pleine terre.

 Pour les noms et descriptions, voir CATALOGUE N° 164, pages 366 à 386.

## Anémones doubles (Anemone coronaria flore pleno).

|   |           |   |    |                                |                          |      |
|---|-----------|---|----|--------------------------------|--------------------------|------|
| Collection A  | 1000      | pattés en                                   | 10 | variétés à mon choix . . . . . | fr. 60                   | n    |
| — B   | 500       | —   | 10 | — . . . . .                    | n 32                     | n    |
| — C   | 100       | —   | 10 | — . . . . .                    | n 7                      | n    |
| — D   | 100       | —   | 50 | sans noms. . . . .             | n 12                     | n    |
| — E   | 100       | —   | 25 | — . . . . .                    | n 10                     | n    |
| — F   | 50        | —   | 25 | — . . . . .                    | n 6                      | n    |
| — G   | 25        | —   | 25 | — . . . . .                    | n 3                      | 50   |
| — H   | 24        | —   | 12 | — . . . . .                    | n 3                      | n    |
| Variétés en superbe mélange . . . . .                   |           |   |    |                                | le cent . . . . .        | n 4  |
|   |           |   |    |                                | les cinquante . . . . .  | n 2  |
| Anémones simples, variétés en superbe mélange . . . . . |           |   |    |                                | le cent . . . . .        | n 4  |
|   |           |   |    |                                | les cinquante . . . . .  | n 2  |
| — simple écarlate. . . . .                              |           |   |    |                                | le cent . . . . .        | n 4  |
|   |           |   |    |                                | les cinquante . . . . .  | n 2  |
| 1649.   | Anemone   | apennina.                                   |    |                                | pièce . . . . .          | n 25 |
|   |           |   |    |                                | le cent . . . . .        | n 18 |
| 41.   | —         | fulgens . . . . .                           |    |                                | pièce . . . . .          | n 1  |
|   |           |   |    |                                | la douzaine . . . . .    | n 10 |
| —   | hortensis | (Anémones simples des jardins) . . . . .    |    |                                | le cent . . . . .        | n 15 |
|   |           |   |    |                                | les vingt-cinq . . . . . | n 4  |
| —   | —         | flore pleno (Anémones doubles des jardins), |    |                                | le cent . . . . .        | n 10 |
|   |           |   |    |                                | les vingt-cinq . . . . . | n 3  |

## GLADIOLUS.

### Gladiolus gandavensis, superbes variétés d'élite.

|                                      |     |           |     |                               |                     |      |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------------------------|---------------------|------|
| Assortiment (A)                      | 25  | ognons en | 25  | variétés avec noms . . . . .  | fr. 75              | n    |
| — (n)                                | 12  | —         | 12  | — . . . . .                   | n 37                | 50   |
| — (n)                                | 6   | —         | 6   | — . . . . .                   | n 18                | n    |
| — (B)                                | 25  | —         | 25  | — . . . . .                   | n 50                | n    |
| — (n)                                | 12  | —         | 12  | — . . . . .                   | n 25                | n    |
| — (n)                                | 6   | —         | 6   | — . . . . .                   | n 12                | n    |
| — (C)                                | 25  | —         | 25  | — . . . . .                   | n 25                | n    |
| — (n)                                | 12  | —         | 12  | — . . . . .                   | n 12                | n    |
| — (n)                                | 6   | —         | 6   | — . . . . .                   | n 6                 | n    |
| — (D)                                | 25  | —         | 25  | — . . . . .                   | n 12                | n    |
| — (n)                                | 12  | —         | 12  | — . . . . .                   | n 6                 | n    |
| — (n)                                | 6   | —         | 6   | — . . . . .                   | n 3                 | n    |
| — (E)                                | 100 | —         | 10  | — . . . . .                   | n 20                | n    |
| — (n)                                | 50  | —         | 10  | — . . . . .                   | n 10                | 50   |
| — (F)                                | 100 | —         | 100 | sans noms, de semis . . . . . | n 50                | n    |
| — (n)                                | 50  | —         | 50  | — . . . . .                   | n 30                | n    |
| — (n)                                | 25  | —         | 25  | — . . . . .                   | n 17                | n    |
| — (n)                                | 12  | —         | 12  | — . . . . .                   | n 8                 | n    |
| Variétés en superbe mélange. . . . . |     |           |     |                               | le cent . . . . .   | n 12 |
|                                      |     |           |     |                               | les douze . . . . . | n 2  |



## IRIS.

## Iris (espèces et variétés).

|              |               |                                    |     |    |    |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----|----|----|
| Collection A | 12 plantes en | 12 espèces et variétés à mon choix | fr. | 3  | n  |
| — B          | 100 —         | 10 — — — — —                       | "   | 20 | n  |
| — C          | 50 —          | 10 — — — — —                       | "   | 10 | 50 |
| — D          | 30 —          | 10 — — — — —                       | "   | 6  | n  |

## Iris germanica (Iris à rhizomes).

|              |               |                     |     |    |   |
|--------------|---------------|---------------------|-----|----|---|
| Collection E | 50 plantes en | 50 belles variétés. | fr. | 23 | n |
| — F          | 100 —         | en 10 — — — — —     | "   | 30 | n |
| — G          | 50 —          | en 10 — — — — —     | "   | 16 | n |
| — H          | 30 —          | en 10 — — — — —     | "   | 11 | n |

Iris Kämpferi, 12 variétés à mon choix : 18 francs.

## LILIUM.

1927. *Lilium auratum* (FLORE, XV, 57).

Oignons ayant environ 15 centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à deux fleurs . . . . . 2 50  
les douze . . . . . 20 n

Oignons ayant environ 18 centimètres de circonférence, pouvant donner de deux à trois fleurs . . . . . 3 n  
les douze . . . . . 30 n  
le cent . . . . . 250 n

Oignons ayant environ 20 centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à quatre fleurs . . . . . 5 n  
les douze . . . . . 50 n  
le cent . . . . . 375 n

|       |   |   |                           |         |    |
|-------|---|---|---------------------------|---------|----|
| 1929. | — | Browni (FLORE, I, (1845), 257).                               | . . . . .                 | .8 à 15 | n  |
| 1932. | — | californicum ( <i>pardalinum</i> ) . . . . .                  | . . . . .                 | 5       | n  |
| 2822. | — | callosum (FLORE, III, 230) . . . . .                          | . . . . .                 | 10      | n  |
| 2819. | — | canadense . . . . .   | . . . . .                 | 5       | n  |
| 2319. | — | flavum (FLORE, XI, 203) . . . . .                             | . . . . .                 | 10      | n  |
| 1944. | — | eximium ( <i>vrai</i> ) . . . . .                             | . . . . .                 | 6       | n  |
| 1945. | — | giganteum (FLORE, VIII, 59) . . . . .                         | . . . . .                 | .2 à 10 | n  |
| —     | — | . . . . .   | Bulbe de force à fleurir. | 15      | n  |
| —     | — | . . . . .   | — extra-fort . . . . .    | 20      | n  |
| 1946. | — | Humboldti (FLORE, XIX, 65) . . . . .                          | . . . . .                 | 10      | n  |
| 1947. | — | Jama-Juri ( <i>Takesima</i> ) . . . . .                       | . . . . .                 | 2       | 50 |
| 3023. | — | japonicum Colchesteri (FLORE, XXI, 73). . . . .               | . . . . .                 | 25 à 50 | n  |
| 2538. | — | Krameri (FLORE, XX, 31) . . . . .                             | . . . . .                 | 25 à 40 | n  |
| 1948. | — | lancifolium album . . . . .                                   | . . . . .                 | 1       | n  |
| —     | — | . . . . .   | les douze . . . . .       | 10      | n  |
| 1949. | — | — fasciculatum corymbosum . . . . .                           | . . . . .                 | 1       | n  |
| —     | — | — . . . . .   | les douze . . . . .       | 10      | n  |
| 1954. | — | rubrum ( <i>speciosum</i> ) (FLORE, III, 276) . . . . .       | . . . . .                 | n       | 50 |
| —     | — | . . . . .   | les douze . . . . .       | 5       | n  |
| —     | — | . . . . .   | le cent . . . . .         | 35      | n  |
| 1970. | — | superbum pyramidale (FLORE, X, 121) . . . . .                 | . . . . .                 | 1       | n  |
| —     | — | . . . . .   | les douze . . . . .       | 10      | n  |
| 1971. | — | Szowitzianum ( <i>colchicum</i> ) (FLORE, V, 507-9) . . . . . | . . . . .                 | 6       | n  |
| 1972. | — | tenuifolium (FLORE, XIV, 213). . . . .                        | . . . . .                 |         |    |
| —     | — | Bulbes de force à fleurir. . . . .                            | . . . . .                 | 3       | n  |
| —     | — | . . . . .   | les douze . . . . .       | 30      | n  |



|       |                        |                 |   |  |            |
|-------|------------------------|-----------------|---|--|------------|
|       |                        |                 |   |  | Fr. C.     |
| 1986. | <i>Lilium tigrinum</i> | flore pleno     | (FLORE, XIX, 113).                        |  | 5 "        |
| 1988. | —                      | splendens       | (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5).             |  |            |
|       |                        |                 | 1 <sup>re</sup> force, bulbe extra-fort   |  | 150 "      |
|       |                        |                 | les douze.                                |  | 15 "       |
|       |                        |                 | 2 <sup>me</sup> — — moyen                 |  | 1 "        |
|       |                        |                 | les douze.                                |  | 10 "       |
|       |                        |                 | 3 <sup>me</sup> — — petit, mais à fleurir |  | 50 "       |
|       |                        |                 | les douze.                                |  | 5 "        |
| 2555. | —                      | Wallichianum    | (FLORE, VI, 247 et XIX, 139)              |  | 75 à 125 " |
| 2432. | —                      | Washingtonianum | (FLORE, XIX, 69).                         |  | 10 à 15 "  |

## RENONCULES.

### Renoncules de Perse (FLORE, XVI, 133).

|                             |      |                                     |  |               |           |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|
| Collection A                | 1000 | griffes en 10 variétés à mon choix. |  |               | fr. 100 " |
| — B                         | 500  | — 10 — —                            |  |               | " 53 "    |
| — C                         | 100  | — 10 — —                            |  |               | " 11 "    |
| — D                         | 100  | — 100 — sans noms                   |  |               | " 14 "    |
| — E                         | 100  | — 50 — —                            |  |               | " 10 "    |
| — F                         | 100  | — 25 — —                            |  |               | " 8 "     |
| — G                         | 50   | — 25 — —                            |  |               | " 4 25 "  |
| — H                         | 25   | — 25 — —                            |  |               | " 2 50 "  |
| Variétés en superbe mélange |      |                                     |  | le cent       | " 3 "     |
|                             |      |                                     |  | les cinquante | " 1 75 "  |

### Renoncules turques.

|                             |      |                         |  |               |          |
|-----------------------------|------|-------------------------|--|---------------|----------|
| Collection I                | 1000 | griffes en 10 variétés. |  |               | fr. 70 " |
| — J                         | 500  | — 10 — —                |  |               | " 37 "   |
| — K                         | 100  | — 10 — —                |  |               | " 8 "    |
| Variétés en superbe mélange |      |                         |  | le cent       | " 4 "    |
|                             |      |                         |  | les cinquante | " 2 25 " |

## ROSIERS.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

(Livrables en pots à partir du mois de mai prochain).

### ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Au choix de l'acheteur, pièce . . . . . 3 francs.

2356. *Abel Carrière* (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, de forme creusée, rouge cramoisi pourpre, à reflets violets et noirâtres, centre rouge feu.
2357. *Adélaïde Dufrenoy* (*Moreau-Robert*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris d'un beau rose carné très-tendre, presque blanc.
2358. *Alexis Lepère* (*Vigneron*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, globuleuses, coloris d'un beau rouge clair vif, de beaucoup d'effet.
2359. *Avocat Duvivier* (*Levêque et fils*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rouge pourpre clair, de grand effet.



2360. Charles Martel (*Oger*). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, presque pleines, globuleuses, coloris d'un beau rouge presque velouté.
2361. Comtesse Vally de Serenye (*Fontaine père*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rouge amarante carminé.
2365. Dingée Conard (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en corymbe, d'un beau rouge ponceau éclatant.
2362. Duc de Montpensier (*Levêque et fils*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, de forme régulière, coloris d'un beau rouge nuancé cramoisi et velouté brun.
2363. Duchesse de Chartres (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, beau rose frais vif, revers des pétales plus pâle.
2364. Duguesclin (*Moreau-Robert*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris d'un beau rouge groseille nuancé vermillon.
2353. Duchesse de Vallombrosa (*Schwartz*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, de forme parfaite et élégante, coloris d'un beau rose tendre à centre rose plus foncé, passant au blanc rosé.
2366. Edmund Wood (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, de forme parfaite, d'un beau coloris rouge cerise foncé vif.
2367. Eugène Fürst (*Souper et Notting*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, à pétales larges, coloris d'un rouge cramoisi velouté, nuancé pourpre foncé brillant, revers des pétales violet foncé glacé.
2368. Général de Cisse (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, bombées, très-belles, écarlate très-vif et très-brillant.
2369. Général Duc d'Anmale (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, d'un beau rouge cerise foncé vif, superbe.
2370. Guillaume Koëlle (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, de forme creusée, rouge carminé foncé vif très-frais.
2354. Gustave Revilliod (*Schwartz*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, imbriquées, coloris d'un beau rose pivoine satiné.
2371. Henry Bennett (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rouge feu et carmin très-vif.
2372. Jean Liabaud (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris cramoisi velouté reflété carmin et ombré noir.
2373. Jean Souper (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris pourpre velouté.
2339. John Stuart Mill (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge éblouissant transparent.
2374. La Mignonne (*Souper et Notting*). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris rouge écarlate carminé, passant au rose de Chine.
2375. L'Étincelante (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, d'un beau coloris rouge écarlate des plus éclatants, plante de grand effet.
2376. Ma Frisée (*Vigneron*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge vif brillant, bords des pétales frisés.
2377. Madame Alphonse Aubert (*Fontaine père*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rouge clair nuancé carmin.
2378. Madame Ferdinand Jamin (*Ledéchaux*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-odorantes, en forme de coupe évasée, avec grands pétales, coloris rose foncé carminé.
2379. Madame Genod (*Genod*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris cramoisi foncé ardoisé, à centre rouge feu vif.
2380. Madame Grandin-Monville (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en corymbe, beau rouge cerise très-vif.
2381. Madame Hériveaux (*Hériveaux*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose groseille.
2382. Madame Jules Caboche (*Vigneron*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, coloris d'un beau rose clair à centre plus vif; le bouton est foliacé comme dans la variété *Duchesse de Cambacérès*.
2383. Madame Marie Manissier (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, constamment fleuri, fleurs moyennes, coloris rose saumon glacé très-frais.
2384. Madame Prosper Langier (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, très-pleines, belle forme parfaite, beau coloris rose vif, transparent et très-frais, superbe.



2385. **Madame Rollet** (*Gonod*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose saumon.
2386. **Mademoiselle Berthe Sacavin** (*Eug. Verdier fils aîné*).
2387. **Mademoiselle Emilie Verdier** (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme admirable, rose carminé vif très-frais, superbe.
2388. **Mademoiselle Léonie Giessen** (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme de la rose Cent-feuilles, coloris rose et blanc.
2389. **Mademoiselle Marie Roë** (*Liabaud*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris rose vif nuancé pourpre.
2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris carmin foncé velouté.
2340. **Miss Hassard** (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris carné très-tendre et très-délicat.
2390. **Monseigneur Fournier** (*Lalande J<sup>re</sup>*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rouge clair vif, ou rose très-vif et très-brillant.
2355. **Oscar Lamarche** (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge amarante passant au rouge laque.
2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme de la rose Cent-feuilles, coloris d'un beau rouge cramoisi velouté ombré rouge feu.
2341. **Reverend J. B. M. Camm** (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, globuleuses, coloris rose clair brillant.
2342. **Royal Standard** (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rose satiné.
2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Arbuste très-vigoureux, fleurs moyennes ou grandes, pleines, de forme parfaite, coloris d'un beau rose frais comme la rose Cent-feuilles.
2394. **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge foncé nuancé pourpre et violet.
2393. **Tancrède** (*Oger*). Arbuste vigoureux, très-florifère, fleurs moyennes, pleines, globuleuses, coloris rouge très-vif.
2395. **Triomphe de France** (*Garçon*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, très-pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rose carminé vif.

## ROSIERS THÉS.

1146. **Alphonse Mortelmans** (*Veuve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose lilas rubané blanc, passant au rose clair, variété de bel effet.
1147. **Charles Rovelli** (*Pernet*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, presque pleines, coloris d'un beau rose tendre, centre vif, revers des pétales argentés.
1148. **Ida** (*Veuve Ducher*). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, beau jaune paille.
1149. **La Nuancée** (*Guillot fils*). Arbuste modérément vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris blanchâtre, extrémité du pourtour des pétales rose passant au rose saumon vif avec le fond jaune cuivre.
1150. **Louis Barlet** (*Veuve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, très-pleines, bien faites, coloris blanc saumoné, parfois jaune foncé.
1151. **Madame Bernard** (*Levet*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau jaune cuivré, parfois jaune d'œuf.
1152. **Madame Léon de St-Jean** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, coloris clair à centre saumoné.
1153. **Madame Teyssier** (*Pernet*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, presque pleines, coloris d'un beau rose saumoné.
1154. **Madame Tronel** (*Oger*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, presque plates, coloris blanc carné nuancé jaunâtre.
1155. **Mademoiselle Marie Berton** (*Levet*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris jaune paille passant au blanc.
1156. **Maréchal Robert** (*Veuve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, très-pleines, bien faites, globuleuses, coloris blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé.



1157. **Marquis de Sanima** (*Veuve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, globuleuses, coloris rose cuivré, intérieur passant au rose vif, genre de la variété *Reine de Portugal*.
1158. **Souvenir de Madame Pernet** (*Pernet*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, globuleuses, coloris d'un beau rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet.

### ROSIER NOISETTE.

4057. **Madame Miolan Carvalho** (*X. Leveque et fils*). Arbuste très-vigoureux, sarmenteux, issu de la variété *Chromatella* (*Cloth of Gold*), fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau jaune soufre foncé.

### ROSIER HYBRIDE DE NOISETTE (REMONTANT).

4088. **Mademoiselle Anne Marie Côte** (*Guillot fils*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, globuleuses, coloris blanc pur, très-souvent nuancé rose lilacé, revers des pétales rose vif carminé.

### ROSIERS ILE-BOURBON.

880. **La Rosière d'Enghien** (*d'Allemagne*). Arbuste très-vigoureux, issu de la variété *Blanche Laffite*, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris blanc teinté rose.
879. **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, globuleuses, coloris blanc carné.

### ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU.

5087. **Violacée** (*Souper et Notting*). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, en forme de pavot, coloris bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussu.

### ROSIER BLANC (*ALBA*) (NON REMONTANT).

7404. **Pompon blanc parfait** (*Eug. Verdier fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs petites, très-bien faites, carné très-tendre passant au blanc.


### ROSIER PROVINS (PANACHÉ NON REMONTANT).

7130. **Commandant Beaurepaire** (*Moreau-Robert*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, coloris rose vif panaché pourpre et violet, marbré et ponctué blanc.

### ROSIER *POLYANTHA* (TRÈS-REMONTANT).

4355. **Pâquerette** (*Guillot fils*). Arbuste modérément vigoureux, fleurs très-petites, très-pleines, bien faites, fleurissant en panicules, coloris blanc pur.

### GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

 Nous considérons l'année qui finit comme l'une des plus mauvaises que nous ayons eues depuis très-longtemps; bien que nous majorions nos prix de 25 %, nous pouvons encore nous féliciter de la marchandise que nous offrons : elle ne laisse rien à désirer.

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.



En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain ; s'il est argileux, calcaire ou siliceux ; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux) ; s'il est sec ou aride.

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| 1 kilogr. | fr. | 1 60  |
| 25 »      | »   | 39 »  |
| 100 »     | »   | 150 » |

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

- A. Mélange pour prairie permanente à faucher.  
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts ; cette culture est très-recommandable comme assolement.

- C. Mélange pour pâturage.  
D. — — pelouse de jardin.  
E. — — — fine de petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. ; le kilogr. : 3 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

### Plants d'Asperges (choix extra).

|                                |                         |     |      |
|--------------------------------|-------------------------|-----|------|
| Asperge blanche grosse de Gand | plant de 2 ans, le cent | fr. | 1 50 |
| — — — — —                      | — de 3 ans, —           | »   | 3 50 |
| — — — — —                      | — de 4 ans, —           | »   | 5 »  |
| d'Argenteuil hâtive            | — de 2 ans, —           | »   | 5 »  |
| — — — — —                      | — de 3 ans, —           | »   | 7 50 |
| — — — — —                      | — de 4 ans, —           | »   | 10 » |
| — — — — —                      | — de 2 ans, —           | »   | 4 »  |
| — — — — —                      | — de 3 ans, —           | »   | 6 »  |
| — — — — —                      | — de 4 ans, —           | »   | 8 »  |

## FLORE

### DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

#### ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT ; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR ; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT ; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS ; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC. ; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE ; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'à la fin du XXI<sup>e</sup> volume, de 2261 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.



## VINGT-ET-UN VOLUMES


DE LA

## FLORE

## des Serres et des Jardins de l'Europe

ont paru; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2300 planches noires et 4500 articles horticoles. Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles, au prix NET de 704 francs, *pris à Gand*.

Le premier fascicule du XXII<sup>e</sup> volume, paraîtra fin Avril.

 Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

Ainsi les XXI volumes parus sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à deux années de crédit, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désireraient n'acquitter annuellement que le tiers du prix environ: soit 340 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2261 planches coloriées et de 2300 planches en noir: ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen?

## PRIX DE L'ABONNEMENT.

par volume de quatre fascicules égaux,


contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, et un grand nombre de vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste:

Belgique: 36 fr. — Espagne, France, Italie, Suisse: 38 fr. — De Nederlanden: 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe: 38 francs.

Great-Britain: £ 1-10. — Colonies: £ 1-12 (*Post free*).

The United States of America: 7 1/2 dollars (*Post free*).

Tous les autres pays d'outre-mer: 40 francs.

 Nous avons aussi de disponibles quelques exemplaires d'amateur en RELIURE DE LUXE, maroquin du levant, plats dorés, tranche supérieure dorée, au prix de 52 francs le volume, soit 1076 francs l'ouvrage complet (21 volumes).

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

## GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 167.

|                          | Pages.     |                        | Pages. |                                   | Pages. |
|--------------------------|------------|------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Abelia . . . . .         | 165        | Acrophorus . . . . .   | 139    | Agathæa . . . . .                 | 165    |
| Abutilon . . . . .       | 107 et 165 | Actinopteris . . . . . | 139    | Agave . . . . .                   | 165    |
| Acacia . . . . .         | 165        | Ada . . . . .          | 147    | Ageratum . . . . .                | 165    |
| Acalypha . . . . .       | 107        | Adelaster . . . . .    | 108    | Agnostus . . . . .                | 166    |
| Acanthophaenix . . . . . | 157        | Adenandra . . . . .    | 165    | Aletris . . . . .                 | 166    |
| Acanthorrhiza . . . . .  | 157        | Adiantum . . . . .     | 139    | Alibertia . . . . .               | 108    |
| Acanthus . . . . .       | 107        | Adromistus . . . . .   | 165    | Allamanda . . . . .               | 108    |
| Achyranthes . . . . .    | 107        | Æchmea . . . . .       | 137    | Allantodia, voir <i>Asplenium</i> | 141    |
| Achyrocline . . . . .    | 165        | Aerides . . . . .      | 147    | Alloplectus . . . . .             | 146    |
| Acineta . . . . .        | 147        | Æschynanthus . . . . . | 139    | Alocasia . . . . .                | 131    |
| Acrocomia . . . . .      | 157        | Agapanthus . . . . .   | 165    | Aloe . . . . .                    | 166    |



|  | Pages.     |   | Pages.     |  | Pages.     |
|--|------------|---|------------|--|------------|
| Alpinia . . . . .  | 108 et 162 | Babingtonia . . . . .                                     | 167        | Capucines tubéreuses, voir                             |            |
| Alsophila . . . . .  | 139        | Balanium . . . . .  | 141        | Tropæolum . . . . .                                    | 177        |
| Alternanthera . . . . .  | 108        | Balisiers d'Inde (Canna) . . . . .                        | 181        | Caraguata . . . . .                                    | 137        |
| Amaryllidées . . . . .   | 130        | Bambusa . . . . .   | 110 et 167 | Carapa . . . . .                                       | 112        |
| Amaryllis . . . . .  | 130 et 166 | Banksia . . . . .   | 167        | Cardwellia . . . . .                                   | 168        |
| Amomum . . . . .   | 108 et 162 | Barkeria . . . . .  | 147        | Carludovica . . . . .                                  | 112 et 157 |
| Amorphophallus . . . . .                                       | 132        | Barringtonia . . . . .                                    | 110        | Carolinea . . . . .                                    | 112        |
| Amphicome . . . . .  | 166        | Batemanina . . . . .                                      | 147        | — voir <i>Pachira</i> . . . . .                        | 126        |
| Ananassa . . . . .   | 137        | Beaucarnea . . . . .                                      | 167        | Caryophyllus . . . . .                                 | 112        |
| Anchomanes . . . . .   | 132        | Begonia . . . . .   | 134        | Caryota . . . . .                                      | 157        |
| Andromeda . . . . .  | 166        | — <i>tubéreuse nouvelle</i> . . . . .                     | 134        | Cassia . . . . .                                       | 168        |
| Anemia . . . . .   | 140        | Bentenckia . . . . .                                      | 157        | Castanea . . . . .                                     | 168        |
| Anémones . . . . .   | 208        | Berberidopsis . . . . .                                   | 167        | Castanospermum . . . . .                               | 112        |
| Angelonia . . . . .  | 166        | Berberis . . . . .  | 167        | Casuarina . . . . .                                    | 168        |
| Angiopteris . . . . .  | 140        | Bertolonia . . . . .                                      | 110        | Catasetum . . . . .                                    | 148        |
| Angræcum . . . . .   | 147        | Beschorneria . . . . .                                    | 167        | Catoblastus . . . . .                                  | 158        |
| Anguloa . . . . .  | 147        | Bifrenaria . . . . .                                      | 147        | Cattleya . . . . .                                     | 148        |
| Anhalonium . . . . .   | 178        | Bignonia . . . . .  | 111 et 167 | Ceanothus . . . . .                                    | 168        |
| Anigosanthus . . . . .   | 166        | Billbergia . . . . .                                      | 137        | Cecropia . . . . .                                     | 112        |
| Anœctochilus . . . . .   | 147        | Blandfordia . . . . .                                     | 167        | Centaurea . . . . .                                    | 168 et 182 |
| Anopterus . . . . .  | 166        | Blechnum . . . . .  | 141        | Centradenia . . . . .                                  | 112        |
| Ansellia . . . . .   | 147        | Bletia . . . . .  | 147        | Centropogon . . . . .                                  | 113        |
| Anthericum . . . . .   | 166        | Bolbophyllum . . . . .                                    | 147        | Centrosolenia . . . . .                                | 146        |
| Anthurium . . . . .  | 132        | Bonaparteia . . . . .                                     | 167        | Cephaelis . . . . .                                    | 113        |
| Antiaris . . . . .   | 109        | Boronia . . . . .   | 167        | Cephalotus . . . . .                                   | 113 et 162 |
| Antigonon . . . . .  | 109        | Bougainvillea . . . . .                                   | 111        | Ceratonia . . . . .                                    | 168        |
| Antigramma . . . . .   | 141        | Bouvardia . . . . .                                       | 167        | Ceratopetalum . . . . .                                | 168        |
| Antirrhinum . . . . .  | 166        | Bowiea . . . . .  | 167        | Ceratostemma . . . . .                                 | 168        |
| Aotus . . . . .  | 166        | Brachychiton . . . . .                                    | 112        | Cereus . . . . .                                       | 178        |
| Aphelandra . . . . .   | 109        | Brachysema . . . . .                                      | 167        | Ceropegia . . . . .                                    | 113        |
| Aphelexis, voir <i>Helichrysum</i> . . . . .                   | 171        | Brahea . . . . .  | 157        | Ceroxylon . . . . .                                    | 158        |
| Aponogeton . . . . .   | 166        | Brainea . . . . .   | 141        | Cestrum . . . . .                                      | 113 et 168 |
| Aralia . . . . .   | 109 et 166 | Brassavola . . . . .                                      | 148        | Chamædorea . . . . .                                   | 158        |
| Araucaria . . . . .  | 166        | Brassia . . . . .   | 148        | Chamærops . . . . .                                    | 158        |
| Arbutus . . . . .  | 166        | Bromelia . . . . .  | 137 et 167 | Chavica . . . . .                                      | 113        |
| Ardisia . . . . .  | 110 et 167 | <i>Bromeliacées</i> . . . . .                             | 137        | Cheilanthes . . . . .                                  | 141        |
| Areca . . . . .  | 157        | Brosimum . . . . .  | 112        | Cheiranthra . . . . .                                  | 168        |
| Arenga . . . . .   | 157        | Broughtonia . . . . .                                     | 148        | Cheiranthus . . . . .                                  | 168        |
| Argania . . . . .  | 110        | Brownea . . . . .   | 112        | Chirita . . . . .                                      | 139        |
| Ariopsis . . . . .   | 132        | Brugmansia . . . . .                                      | 167        | Chlorocodon . . . . .                                  | 113        |
| Ariseema . . . . .   | 132        | Buphone . . . . .   | 130        | Chlorophytum . . . . .                                 | 168        |
| Aristea . . . . .  | 167        | Burlingtonia . . . . .                                    | 148        | Choisya . . . . .                                      | 168        |
| Aristolochia . . . . .   | 110 et 167 | Buxus . . . . .   | 167        | Chorizema . . . . .                                    | 168        |
| <i>Aroidées</i> . . . . .                                      | 131        | Cacalia . . . . .   | 167        | <i>Chrysanthèmes, voir Catalogue</i> n° 164, page 345. |            |
| Arpophyllum . . . . .  | 147        | <i>Cactées</i> . . . . .                                  | 178        | Chrysophyllum . . . . .                                | 113        |
| Arrabidaea . . . . .   | 110        | Caladium, voir <i>Catalogue</i> n° 166, page 96.          |            | Chysis . . . . .                                       | 148        |
| Artemisia . . . . .  | 167        | Calamus . . . . .   | 157        | Cibotium . . . . .                                     | 141        |
| Arthropodium . . . . .   | 167        | Calanthe . . . . .  | 148        | Cicca . . . . .  | 113        |
| Arthrotaxis . . . . .  | 167        | <i>Calcéolaires herbacées</i> . . . . .                   | 168        | Cinchona . . . . .                                     | 113        |
| Artocarpus . . . . .   | 110        | — <i>ligneuses</i> . . . . .                              | 167        | <i>Cinéraires naines</i> . . . . .                     | 168 et 182 |
| — voir <i>Ficus</i> . . . . .                                  | 123        | Calla, voir <i>Richardia</i> . . . . .                    | 133        | Cineraria . . . . .                                    | 168 et 182 |
| Arundinaria . . . . .  | 167        | Callixene . . . . .                                       | 168        | Cinnamomum . . . . .                                   | 113 et 168 |
| Arundo . . . . .   | 167        | Calonyction . . . . .                                     | 112        | Cirrhopetalum . . . . .                                | 148        |
| <i>Asperges</i> (plants) . . . . .                             | 214        | Calophyllum . . . . .                                     | 112        | Cissus . . . . .                                       | 113        |
| Aspidistra . . . . .   | 110        | Calypttrion . . . . .                                     | 112        | Citrus . . . . .                                       | 168        |
| Aspidium . . . . .   | 141        | Calyptrogyne . . . . .                                    | 157        | Clematis . . . . .                                     | 169        |
| Asplenium . . . . .  | 141        | Camellia. — <i>Le Catalogue général paraîtra en Août.</i> |            | Clerodendron . . . . .                                 | 114        |
| Astelia . . . . .  | 167        | Campomanesia . . . . .                                    | 112        | Cleyera . . . . .                                      | 169        |
| Astelma . . . . .  | 167        | Camptopus . . . . .                                       | 112        | Clianthus . . . . .                                    | 169        |
| Asterostigma . . . . .   | 132        | Camptosema . . . . .                                      | 168        | Clivia, voir <i>Imantophyllum</i> . . . . .            | 130        |
| Astrapæa . . . . .   | 110        | Camphyllia, v. <i>Pelargonium</i> . . . . .               | 206        | Cobæa . . . . .  | 169 et 183 |
| Astrocaryum . . . . .  | 157        | Campylobotrys, voir <i>Higginisia</i> . . . . .           | 124        | Coburgia . . . . .                                     | 130        |
| Astrophytum . . . . .  | 178        | Campyloneuron . . . . .                                   | 141        | Coccoloba . . . . .                                    | 114        |
| Ataccia . . . . .  | 110        | Canarina . . . . .  | 168        | Cocculus . . . . .                                     | 114        |
| Athyrium . . . . .   | 141        | Canna . . . . .   | 181        | Cochliostema . . . . .                                 | 114        |
| Attalea . . . . .  | 157        | Cantua . . . . .  | 168        | Cocos . . . . .  | 158        |
| Azalea indica. — <i>Le Catalogue général paraîtra en Août.</i> |            |   |            | Codiaeum, voir <i>Croton</i> . . . . .                 | 116        |



| Pages.   | Pages.  | Pages.   |
|--|---|--|
| Coelia. . . . . 148                            | Darwinia. . . . . 170   | Eria. . . . . 150  |
| Cœlogyne. . . . . 148                          | Dasyllirion. . . . . 170  | Erica. . . . . 170   |
| Coffea. . . . . 114                            | Datura. . . . . 118   | Eriocnema. . . . . 123   |
| Colax. . . . . 148                             | Davallia. . . . . 141   | Eriopsis. . . . . 150  |
| Colea. . . . . 115                             | Dekenia. . . . . 153  | Eriostemon. . . . . 170  |
| Coleonema. . . . . 169                         | Dendrobium. . . . . 149   | Erythrina. . . . . 191   |
| Coleus. . . . . 183                            | Dendrochilum. . . . . 150   | Erythroxyton. . . . . 123                                      |
| Collania. . . . . 130                          | Desfontainea. . . . . 170   | Escallonia. . . . . 170  |
| Colletia. . . . . 169                          | Dianella. . . . . 170   | Eucalyptus. . . . . 170  |
| Colocasias. . . . . 132                        | Dianthus. . . . . 190   | Eucharis. . . . . 130  |
| Columnea. . . . . 146                          | — <i>graines</i> . . . . . 190                                    | Eugenia. . . . . 123 et 170                                    |
| Colvillea. . . . . 115                         | Dichorisanthra. . . . . 119                                       | Eulalia. . . . . 170   |
| Combretum. . . . . 115                         | Dicksonia. . . . . 141  | Eulophia. . . . . 150  |
| Commelyna. . . . . 115                         | Didymocarpus. . . . . 139   | Euphorbia. . . . . 123 et 171                                  |
| Condaminea. . . . . 115                        | Didymochlæna. . . . . 141   | Eupodium. . . . . 141  |
| Coniza. . . . . 115                            | Dieffenbachia. . . . . 132  | Eurya. . . . . 171   |
| Conophallus. . . . . 132                       | Dietes. . . . . 170   | Eurybia. . . . . 171   |
| Convolvulus. . . . . 169                       | Dillenia. . . . . 119   | Eurycles. . . . . 130  |
| Cookia. . . . . 115                            | Dillwynia. . . . . 170  | Euterpe. . . . . 158   |
| Copaifera. . . . . 115                         | Dion. . . . . 138   | Exacum. . . . . 123  |
| Copernicia. . . . . 158                        | Dionæa. . . . . 119 et 162  | Fagelia. . . . . 171   |
| Coprosma. . . . . 169                          | Dioscorea. . . . . 119  | Fagraea. . . . . 123   |
| Cordylina, voir <i>Dracæna</i> ,<br>120 et 170 | Diosma. . . . . 170   | Ferdinandanda. . . . . 123                                     |
| Correa. . . . . 169                            | Diospyros. . . . . 119  | Ferdinandusa, voir <i>Cres-</i><br><i>centia</i> . . . . . 116 |
| Corynocarpus. . . . . 169                      | Dipladenia. . . . . 119   | Ficus. . . . . 123   |
| Corynostylis. . . . . 115                      | Diplazium. . . . . 141  | Filices. . . . . 139   |
| Corypha. . . . . 158                           | Dipteryx. . . . . 119   | Fittonia. . . . . 124  |
| Cosbæa. . . . . 169                            | Disa. . . . . 150   | Fitz-Roya. . . . . 171   |
| Cossignia. . . . . 115                         | Disisocactus. . . . . 178   | Fougères de serre<br>— — <i>arborescentes</i> . . . . . 139    |
| Costus. . . . . 162                            | Disteganthus. . . . . 137   | — — <i>collections</i> . . . . . 145                           |
| Cotyledon. . . . . 169                         | Distiacanthus. . . . . 137  | Fourcroya. . . . . 124   |
| Crassula. . . . . 169 et 184                   | Dombeya. . . . . 119  | Franciscea. . . . . 124  |
| Crescentia. . . . . 116                        | Donacodes. . . . . 120  | Fuchsia. . . . . 191   |
| Crinum. . . . . 130                            | Doodia, voir <i>Woodwardia</i> . . . . . 145                      | — <i>nouveaux</i> . . . . . 192                                |
| Croton. . . . . 116                            | Dorstenia. . . . . 120  | Galactodendron. . . . . 124                                    |
| Crowea. . . . . 169                            | Doryanthès. . . . . 120, 130 et 170                               | Garcinia. . . . . 124  |
| Cryptanthus. . . . . 137                       | Doryopteris. . . . . 141  | Gardenia. . . . . 124  |
| Cryptophragmium. . . . . 117                   | Dracæna. . . . . 120 et 170                                       | Garrya. . . . . 171  |
| Cuphea. . . . . 169                            | Dracenopsis, voir <i>Dracæna</i><br><i>indivisa</i> . . . . . 170 | Gasteria. . . . . 171  |
| Curculigo. . . . . 117                         | Drimys. . . . . 170   | Gastronema. . . . . 130  |
| Curcuma. . . . . 162                           | Drymonia. . . . . 146   | Gaussia. . . . . 158   |
| Curmeria. . . . . 118 et 132                   | Drymophlæus. . . . . 158  | Gazania. . . . . 193   |
| Cyanophyllum. . . . . 118                      | Drynaria. . . . . 141   | Gelsemium. . . . . 171   |
| Cyathea. . . . . 141                           | Duboisea. . . . . 150   | Genetyllis. . . . . 171  |
| <i>Cycadées</i> . . . . . 138                  | Duranta. . . . . 170  | Geoffroya. . . . . 124   |
| Cycas. . . . . 138                             | Durio. . . . . 122  | Geonoma. . . . . 158   |
| Cyclamen. . . . . 169                          | Dyckia. . . . . 170   | Georgia. . . . . 158   |
| Cyclanthus. . . . . 118                        | Dypsis. . . . . 158   | Geranium, voir <i>Pelargo-</i><br><i>nium</i> . . . . . 195    |
| Cynoches. . . . . 143                          | Ecceumocarpus. . . . . 170  | Gesneria. . . . . 146  |
| Cymbidium. . . . . 148                         | Echeveria. . . . . 170  | <i>Gesneriacées</i> . . . . . 145                              |
| Cyperus. . . . . 118                           | Echidnium. . . . . 133  | Gladiolus. . . . . 208   |
| Cypripedium. . . . . 148                       | Echinocactus. . . . . 178   | Glazious. . . . . 158  |
| Cyrtandra. . . . . 139                         | Echinocereus. . . . . 179   | Gleichenia. . . . . 141  |
| <i>Cyrtandræces</i> . . . . . 139              | Echinopsis. . . . . 179   | Globba. . . . . 163 et 171                                     |
| Cyrtanthera. . . . . 118                       | Echites. . . . . 122  | Gloriosa. . . . . 146  |
| Cyrtoceras. . . . . 118                        | Elæagnus. . . . . 170   | Gloxinia. . . . . 146  |
| Cyrtodeira. . . . . 146                        | Elæis. . . . . 158  | Gnaphalium. . . . . 171 et 193                                 |
| Cyrtomium. . . . . 141                         | Elæodendron. . . . . 170  | Gnidia. . . . . 171  |
| Cyrtopodium. . . . . 149                       | Eleetaria. . . . . 123 et 163                                     | Godoya. . . . . 124  |
| Cytisus. . . . . 169                           | Embothrium. . . . . 170   | Godwinia. . . . . 133  |
| Dacrydium. . . . . 169                         | Encholirion. . . . . 137  | Gompholobium. . . . . 171                                      |
| Dæmonorops. . . . . 158                        | Enkianthus. . . . . 170   | Gonatanthus. . . . . 133                                       |
| <i>Dahlia d'élite</i> . . . . . 184            | Epacris. . . . . 170  | Gongora. . . . . 150   |
| — <i>nains et lilliputiens</i> . . . . . 188   | Epidendrum. . . . . 150   | Goniophlebium. . . . . 141                                     |
| Dalechampia. . . . . 118                       | Epigynium. . . . . 170  | Gonocalyx. . . . . 171   |
| Dammara. . . . . 169                           | Epiphyllum. . . . . 123   | Goodyera. . . . . 150  |
| Daphne. . . . . 170                            | Eranthemum. . . . . 123   |  |
| Darlingtonia. . . . . 162                      | — voir <i>Cryptophragmium</i> . . . . . 117                       |  |



|                                 | Pages      |                                    | Pages.     |                                 | Pages.     |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| <i>Graminées fourragères.</i>   | 214        | <i>Jambosa</i>                     | 126        | <i>Malortiea</i>                | 159        |
| <i>Grammatophyllum.</i>         | 150        | <i>Jasminum</i>                    | 126 et 171 | <i>Mamillaria</i>               | 179        |
| <i>Graptophyllum.</i>           | 124        | <i>Jatropha.</i>                   | 126        | <i>Mandevilla.</i>              | 173        |
| <i>Gravesia.</i>                | 124        | <i>Jovellana.</i>                  | 171        | <i>Mangifera</i>                | 126        |
| <i>Greigia</i>                  | 137        | <i>Jubæa</i>                       | 158        | <i>Mantisia, voir Globba</i>    | 163        |
| <i>Grenadier, voir Punica</i>   | 175        | <i>Kadsura</i>                     | 172        | <i>Maranta</i>                  | 163        |
| <i>Grevillea.</i>               | 171        | <i>Kæmpferia</i>                   | 163        | — <i>collections.</i>           | 164        |
| <i>Greya.</i>                   | 124 et 171 | <i>Kefersteinia.</i>               | 150        | <i>Marattia</i>                 | 142        |
| <i>Griselinia</i>               | 171        | <i>Kennedya</i>                    | 172        | <i>Marcgravia</i>               | 126        |
| <i>Guarea</i>                   | 124        | <i>Kentia</i>                      | 158        | <i>Marica</i>                   | 173        |
| <i>Guatteria</i>                | 124        | <i>Kleinia</i>                     | 172        | <i>Martinezia</i>               | 159        |
| <i>Guiljelma</i>                | 158        | <i>Knightia</i>                    | 172        | <i>Masdevallia</i>              | 151        |
| <i>Gustavia</i>                 | 124        | <i>Kopsia</i>                      | 126        | <i>Maxillaria</i>               | 151        |
| <i>Guzmannia</i>                | 137        | <i>Korthalsia</i>                  | 158        | <i>Maximiliana.</i>             | 160        |
| <i>Gymnogramme.</i>             | 141        | <i>Lacæna</i>                      | 150        | <i>Medinilla.</i>               | 126        |
| <i>Gymnostachyum, voir</i>      |            | <i>Lachenalia</i>                  | 172        | <i>Melicocca</i>                | 126        |
| <i>Filtonia</i>                 | 124        | <i>Lælia</i>                       | 150        | <i>Memecylon</i>                | 126        |
| <i>Hæmadictyon</i>              | 124        | <i>Lagetta</i>                     | 126        | <i>Meninia</i>                  | 126        |
| <i>Hæmanthus.</i>               | 130        | <i>Lalage</i>                      | 172        | <i>Meniscium</i>                | 142        |
| <i>Hakea</i>                    | 171        | <i>Lantana</i>                     | 193        | <i>Mesembrianthemum</i>         | 173        |
| <i>Hardenbergia</i>             | 171        | — <i>nouveaux</i>                  | 194        | <i>Mesospinidium</i>            | 151        |
| <i>Harina, voir Wallichia</i>   | 161        | <i>Lapageria</i>                   | 172        | <i>Methonica, voir Gloriosa</i> | 146        |
| <i>Haworthia</i>                | 171        | <i>Lasiandra</i>                   | 126        | <i>Metrosideros</i>             | 173        |
| <i>Hebeclinium</i>              | 124        | <i>Lasiolipsis</i>                 | 126        | <i>Meyenia</i>                  | 126        |
| <i>Hechtia</i>                  | 137        | <i>Lastrea</i>                     | 142        | <i>Miconia</i>                  | 126        |
| <i>Hedychium</i>                | 163        | <i>Latania</i>                     | 158        | <i>Micrococos</i>               | 160        |
| <i>Hedysarum</i>                | 124        | <i>Laurelia</i>                    | 172        | <i>Microlepis</i>               | 142        |
| <i>Helcia</i>                   | 150        | <i>Laurus</i>                      | 172        | <i>Mikania</i>                  | 126        |
| <i>Helichrysum</i>              | 171        | — <i>voir Viburnum</i>             | 177        | <i>Miltonia</i>                 | 151        |
| <i>Heliconia</i>                | 163        | <i>Ledenbergia.</i>                | 126        | <i>Mimulus</i>                  | 173        |
| <i>Heliotropes</i>              | 193        | <i>Leea</i>                        | 126        | <i>Mimusops</i>                 | 126        |
| <i>Hemerocallis</i>             | 124        | <i>Leptodactylon</i>               | 172        | <i>Mitraria</i>                 | 173        |
| <i>Heritiera.</i>               | 124        | <i>Leptopteris, voir Todea</i>     | 145        | <i>Momordica</i>                | 126        |
| <i>Herrania.</i>                | 124        | <i>Leptotes</i>                    | 151        | <i>Monanthes</i>                | 174        |
| <i>Hexacentris.</i>             | 124        | <i>Leuchtenbergia.</i>             | 179        | <i>Monochaetum</i>              | 126 et 174 |
| <i>Hibbertia</i>                | 171        | <i>Leucopogon.</i>                 | 172        | <i>Monodora</i>                 | 126        |
| <i>Hibiscus</i>                 | 124        | <i>Libertia</i>                    | 172        | <i>Monstera, voir Tornelia</i>  | 134        |
| <i>Higginsia</i>                | 124        | <i>Libocedrus</i>                  | 172        | <i>Moræa</i>                    | 174        |
| <i>Hippobromus</i>              | 124        | <i>Libonia</i>                     | 172        | <i>Morenia</i>                  | 160        |
| <i>Hippomane</i>                | 124        | <i>Licuala</i>                     | 158        | <i>Morinda</i>                  | 126        |
| <i>Hohenbergia</i>              | 137        | <i>Lierres, voir Hedera au</i>     |            | <i>Musa</i>                     | 164 et 177 |
| <i>Horsfieldia</i>              | 124        | <i>Catalogue n° 165, page 403.</i> |            | <i>Musschea</i>                 | 174        |
| <i>Houlletia</i>                | 150        | <i>Ligularia</i>                   | 172        | <i>Myristica.</i>               | 126        |
| <i>Hovea.</i>                   | 171        | <i>Ligustrum</i>                   | 172        | <i>Myroxylon</i>                | 126        |
| <i>Hoya</i>                     | 124        | <i>Liliacées</i>                   | 146        | <i>Myrtus</i>                   | 126 et 174 |
| <i>Hydrolea.</i>                | 124        | <i>Lilium</i>                      | 209        | <i>Nandina</i>                  | 174        |
| <i>Hymenæa</i>                  | 124        | <i>Limatodes</i>                   | 151        | <i>Nanodes</i>                  | 151        |
| <i>Hymenocallis</i>             | 130 et 171 | <i>Linaria</i>                     | 172        | <i>Napoleona</i>                | 126        |
| <i>Hymenodium</i>               | 142        | <i>Linum</i>                       | 172        | <i>Nasonia</i>                  | 151        |
| <i>Hyophorbe</i>                | 158        | <i>Lithospermum</i>                | 172        | <i>Neottia</i>                  | 151        |
| <i>Hyospathe</i>                | 158        | <i>Litobrochia.</i>                | 142        | <i>Neottopteris, voir Tham-</i> |            |
| <i>Hypocyrtia</i>               | 124        | <i>Littonia</i>                    | 146 et 172 | <i>noptertis</i>                | 145        |
| <i>Hypoestes, voir Eranthe-</i> |            | <i>Livistona.</i>                  | 159        | <i>Nepenthes</i>                | 126        |
| <i>mum</i>                      | 123        | <i>Lobelia</i>                     | 172 et 194 | <i>Nephrodium.</i>              | 142        |
| <i>Ilex</i>                     | 171        | <i>Lolium</i>                      | 172        | <i>Nephrolepis.</i>             | 142        |
| <i>Illicium</i>                 | 171        | <i>Lomaria</i>                     | 142        | <i>Nerium</i>                   | 174        |
| <i>Imantophyllum.</i>           | 124 et 130 | <i>Lomatia</i>                     | 172        | <i>Nertera</i>                  | 174        |
| <i>Impatiens</i>                | 125        | <i>Lophospermum.</i>               | 172        | <i>Nicotiana.</i>               | 126        |
| <i>Indigofera</i>               | 171        | <i>Luculia</i>                     | 126        | <i>Nidularium</i>               | 137        |
| <i>Iochroma</i>                 | 125 et 171 | <i>Lucuma</i>                      | 126        | <i>Nierembergia</i>             | 174 et 194 |
| <i>Ionopsis</i>                 | 150        | <i>Lycaste</i>                     | 151        | <i>Nipa</i>                     | 126        |
| <i>Ipomœa</i>                   | 125        | <i>Lygodium</i>                    | 142        | <i>Niphobolus</i>               | 142        |
| <i>Iresine</i>                  | 171        | <i>Macadamia</i>                   | 172        | <i>Odontoglossum.</i>           | 151        |
| <i>Iris</i>                     | 209        | <i>Machærium.</i>                  | 126        | <i>Œllets</i>                   | 190        |
| <i>Ismene</i>                   | 130        | <i>Mackaya.</i>                    | 126        | — <i>graines.</i>               | 190        |
| <i>Isochilus.</i>               | 150        | <i>Macrozamia.</i>                 | 138        | <i>Oldfieldia</i>               | 126        |
| <i>Isonandra</i>                | 126        | <i>Magnolia.</i>                   | 126 et 172 | <i>Oleandra.</i>                | 142        |
| <i>Ixora</i>                    | 126        | <i>Mahonia</i>                     | 172        | <i>Oncidium</i>                 | 154        |
| <i>Jacaranda</i>                | 126        | <i>Malacocarpus</i>                | 179        | <i>Oncosperma.</i>              | 160        |



|                                       | Pages.     |                                    | Pages.     |                                      | Pages.     |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Onychium . . . . .                    | 142        | Phyllocladus . . . . .             | 174        | Rhaphis . . . . .                    | 161        |
| Ophianthe . . . . .                   | 146        | Phyllotænium . . . . .             | 126 et 133 | Rhipidodendron . . . . .             | 175        |
| Ophiopogon . . . . .                  | 174        | Phymatanthus, voir <i>Pelarg-</i>  |            | Rhipidopteris . . . . .              | 145        |
| Oplismenus . . . . .                  | 126        | <i>gonium</i> . . . . .            | 206        | Rochea . . . . .                     | 176        |
| Opuntia . . . . .                     | 174 et 180 | Phymatodes . . . . .               | 142        | Rhodea . . . . .                     | 175        |
| <i>Orangers</i> . . . . .             | 174        | Physianthus . . . . .              | 174        | Rhodochiton . . . . .                | 175        |
| Orania . . . . .                      | 160        | Phytelephas . . . . .              | 161        | Rhododendron. — Le <i>Prin-</i>      |            |
| <i>Orchidées tropicales</i> . . . . . | 146        | Pilea . . . . .                    | 126        | <i>Courant</i> paraîtra en Août.     |            |
| Oreodaphne . . . . .                  | 174        | Pilocereus . . . . .               | 180        | Rhodomyrtus . . . . .                | 175        |
| Oreodoxa . . . . .                    | 161        | Pilumna . . . . .                  | 155        | Rhopala . . . . .                    | 128        |
| Oreopanax . . . . .                   | 174        | Pimelea . . . . .                  | 174        | Rhynchosia . . . . .                 | 128        |
| Otacanthus . . . . .                  | 126        | Pinanga . . . . .                  | 161        | Rhynchospermum . . . . .             | 175        |
| Ouvirandra . . . . .                  | 126        | Pincenectitia, voir <i>Beau-</i>   |            | Richardia . . . . .                  | 133 et 175 |
| Oxalis . . . . .                      | 174        | <i>carnea</i> . . . . .            | 167        | Roella . . . . .                     | 176        |
| Pachira . . . . .                     | 126        | Pinckneya . . . . .                | 127        | Rœzlia . . . . .                     | 176        |
| Pachyphytum . . . . .                 | 126 et 174 | Pinus . . . . .                    | 175        | Rogiera . . . . .                    | 128        |
| Palicourea . . . . .                  | 126        | Piper . . . . .                    | 127        | Rondeletia . . . . .                 | 128 et 176 |
| <i>Palmiers</i> . . . . .             | 157        | Pisonia . . . . .                  | 127        | <i>Rosiers, nouveautés</i> . . . . . | 210        |
| Palumbina . . . . .                   | 154        | Pistia . . . . .                   | 127 et 133 | — blancs (alba) . . . . .            | 213        |
| Pancratium . . . . .                  | 130        | Pitcairnea . . . . .               | 137        | — Bourbon . . . . .                  | 213        |
| Pandanus . . . . .                    | 161        | Pittosporum . . . . .              | 175        | — Cent-feuilles mous-                |            |
| Panicum . . . . .                     | 126        | <i>Plantas bulbeuses</i> . . . . . | 208        | <i>sus</i> . . . . .                 | 213        |
| — voir <i>Oplismenus</i> . . . . .    | 126        | Platycerium . . . . .              | 143        | — hybrides remon-                    |            |
| Paphinia . . . . .                    | 154        | Plectranthus . . . . .             | 127        | <i>tants</i> . . . . .               | 210        |
| Parochetus . . . . .                  | 174        | Pleione . . . . .                  | 156        | — <i>Noisettes</i> . . . . .         | 213        |
| Passiflora . . . . .                  | 162 et 174 | Pleroma . . . . .                  | 127 et 175 | — polyantha . . . . .                | 213        |
| Paulinia . . . . .                    | 126        | Plumbago . . . . .                 | 127        | — <i>Provins</i> . . . . .           | 213        |
| Pavetta . . . . .                     | 126        | Podocarpus . . . . .               | 175        | — <i>Thés</i> . . . . .              | 212        |
| Pearcea . . . . .                     | 146        | Podolobium . . . . .               | 175        | Rubus . . . . .                      | 128 et 176 |
| Pelargonium à grandes                 |            | Pogostemon . . . . .               | 127        | Rudgea . . . . .                     | 128        |
| <i>fleurs</i> . . . . .               | 195        | Poinciana . . . . .                | 127 et 175 | Sabal . . . . .                      | 161        |
| — — — doubles . . . . .               | 197        | Poinsettia . . . . .               | 128        | Saccharum . . . . .                  | 128        |
| — — — nouveautés . . . . .            | 196        | Polianthes . . . . .               | 175        | Saccolabium . . . . .                | 156        |
| — — — remontants . . . . .            | 197        | Polycyenis . . . . .               | 156        | Salvia . . . . .                     | 207        |
| — espèces . . . . .                   | 207        | Polygala . . . . .                 | 175        | Sanchesia . . . . .                  | 129        |
| — zonale à fleurs doubles . . . . .   | 203        | Polymnia . . . . .                 | 128        | Sansevieria . . . . .                | 129        |
| — — dits Scarlet . . . . .            | 197        | Polypodium . . . . .               | 144        | Sapindus . . . . .                   | 129        |
| — — — nouveautés . . . . .            | 201        | Polystichum . . . . .              | 144        | Sarcopodium . . . . .                | 156        |
| — à feuilles pana-                    |            | Pontederia . . . . .               | 128        | Sarmienta . . . . .                  | 146        |
| <i>chées</i> . . . . .                | 205        | Porphyrocoma . . . . .             | 128        | Sarracenia . . . . .                 | 162 et 176 |
| — à feuilles de Lierre                |            | Portea . . . . .                   | 137        | <i>Sarracénées</i> . . . . .         | 162        |
| <i>(lateripes)</i> . . . . .          | 205        | Portulacaria . . . . .             | 175        | Sauromatum, voir <i>Ancho-</i>       |            |
| — — — nouveautés . . . . .            | 206        | Pothos . . . . .                   | 133        | <i>manes</i> . . . . .               | 132        |
| Pentstemon . . . . .                  | 206        | Pourretia . . . . .                | 137        | Saxe-Gothea . . . . .                | 176        |
| Peperomia . . . . .                   | 126        | <i>Primevères</i> . . . . .        | 175        | Saxifraga . . . . .                  | 176        |
| Pepinia . . . . .                     | 137        | Primula . . . . .                  | 175        | Scheelia . . . . .                   | 161        |
| Peristeria . . . . .                  | 154        | Pritchardia . . . . .              | 161        | Schizocasia . . . . .                | 134        |
| Persea . . . . .                      | 126        | Promenæa . . . . .                 | 156        | Schomburgkia . . . . .               | 156        |
| Perymenium . . . . .                  | 174 et 207 | Pronaya . . . . .                  | 175        | Sciadocalyx . . . . .                | 146        |
| Pescatorea . . . . .                  | 154        | Prostanthera . . . . .             | 175        | <i>Scilaminées</i> . . . . .         | 162        |
| Petraea . . . . .                     | 126        | Protea . . . . .                   | 175        | Scottia . . . . .                    | 176        |
| Phenocoma . . . . .                   | 174        | Psychotria . . . . .               | 128        | Scutellaria . . . . .                | 129 et 176 |
| Phajus . . . . .                      | 154        | Pteridophyllum . . . . .           | 128        | Scuticaria . . . . .                 | 156        |
| Phalænopsis . . . . .                 | 156        | Pteris . . . . .                   | 144        | Seaforthia . . . . .                 | 161        |
| Pharus . . . . .                      | 126        | Ptychosperma . . . . .             | 161        | Sedum . . . . .                      | 176        |
| Philesia . . . . .                    | 174        | Pultenæa . . . . .                 | 175        | Selaginella . . . . .                | 145        |
| Philodendron . . . . .                | 133        | Punica . . . . .                   | 175        | Selenipedium, voir <i>Cypri-</i>     |            |
| Phlox . . . . .                       | 174        | Puya . . . . .                     | 137        | <i>pedium</i> . . . . .              | 148        |
| Phœnicophorium . . . . .              | 161        | Pyrethrum . . . . .                | 207        | Sempervivum . . . . .                | 176        |
| Phœnix . . . . .                      | 161        | Quassia . . . . .                  | 128        | Senecio . . . . .                    | 176        |
| Pholidophyllum . . . . .              | 137        | Quercus . . . . .                  | 175        | <i>Serre chaude</i> . . . . .        | 107        |
| Pholidota . . . . .                   | 156        | Quesnelia . . . . .                | 137        | — — spécialités . . . . .            | 130        |
| Phormium . . . . .                    | 174        | Quivisia . . . . .                 | 128        | — froides . . . . .                  | 165        |
| Phycella . . . . .                    | 174        | Raphiolepis . . . . .              | 175        | — — spécialités . . . . .            | 178        |
| Phygelius . . . . .                   | 174        | Ravenala . . . . .                 | 164        | Sideroxylon . . . . .                | 129        |
| Phylla . . . . .                      | 174        | Reineckia . . . . .                | 175        | Sigmatostalix . . . . .              | 156        |
| Phyllagathis . . . . .                | 126        | Renanthera . . . . .               | 156        | Simaruba . . . . .                   | 129        |
| Phyllanthus . . . . .                 | 126        | <i>Renoncules</i> . . . . .        | 210        | Sinclairia . . . . .                 | 129        |
| Phyllocactus . . . . .                | 180        | Restrepia . . . . .                | 156        | Sinningia . . . . .                  | 146        |



|                                    | Pages.     |                                      | Pages.     |                                 | Pages.          |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| Siphocampylus . . . . .            | 129        | Tacsonia . . . . .                   | 162 et 176 | Tropæolum . . . . .             | 171             |
| Skimmia . . . . .                  | 176        | Tamarindus . . . . .                 | 129        | Tydaea . . . . .                | 146             |
| Sobralia . . . . .                 | 156        | Tamus, voir <i>Testudinaria</i> .    | 176        | Typhonium . . . . .             | 134             |
| Solanum . . . . .                  | 129 et 176 | Tapeinotes . . . . .                 | 146        | Udhea . . . . .                 | 129, 177 et 217 |
| Sollya . . . . .                   | 176        | Tasmannia . . . . .                  | 176        | Urania, voir <i>Ravenala</i> .  | 164             |
| Sonerila . . . . .                 | 129        | Tecoma . . . . .                     | 176        | Urceolina ( <i>Collania</i> ) . | 130             |
| Sophranitis . . . . .              | 156        | Teleianthera . . . . .               | 129        | Uropedium . . . . .             | 156             |
| Sparmannia . . . . .               | 176        | Terminalia . . . . .                 | 129        | Uroskinnera . . . . .           | 129             |
| Spathiphyllum . . . . .            | 134        | Testudinaria . . . . .               | 176        | Urvillea . . . . .              | 129             |
| Sphærogyne . . . . .               | 129        | Tetrapanax ( <i>Aralia</i> ) . . . . | 129        | Utricularia . . . . .           | 129             |
| Spigelia . . . . .                 | 129        | Teucrium . . . . .                   | 176        | Vaccinium . . . . .             | 177             |
| Stadmannia . . . . .               | 129        | Thalia . . . . .                     | 164        | Vallota . . . . .               | 130 et 177      |
| Stangeria . . . . .                | 138        | Thamnopteris . . . . .               | 145        | Vanda . . . . .                 | 156             |
| Stanhopea . . . . .                | 156        | Thea . . . . .                       | 176        | Vanilla . . . . .               | 129 et 157      |
| Stannia . . . . .                  | 129        | Themistoclesia . . . . .             | 176        | Veitchia . . . . .              | 161             |
| Stapelia . . . . .                 | 176        | Theobroma . . . . .                  | 129        | Veronica . . . . .              | 177             |
| Statice . . . . .                  | 176        | Theophrasta . . . . .                | 129        | Verschaffeltia . . . . .        | 161             |
| Stauntonia . . . . .               | 176        | Thibaudia . . . . .                  | 176        | Viburnum . . . . .              | 177             |
| Stenia . . . . .                   | 156        | Thrinax . . . . .                    | 161        | Victoria . . . . .              | 129             |
| Stenocarpus ( <i>Agnostus</i> ) .  | 176        | Thunbergia . . . . .                 | 129        | Vriesea . . . . .               | 137             |
| Stenomesson . . . . .              | 176        | Thunia . . . . .                     | 156        | Wallichia . . . . .             | 161             |
| Stephanotis . . . . .              | 129        | Thyracanthus . . . . .               | 129        | Warrea . . . . .                | 157             |
| Stevensonia . . . . .              | 161        | Tillandsia . . . . .                 | 137        | Warszewiczella . . . . .        | 157             |
| Stravadium . . . . .               | 129        | Todea . . . . .                      | 145        | Weinmannia . . . . .            | 177             |
| Strelitzia . . . . .               | 164        | Torenia . . . . .                    | 129        | Welfia . . . . .                | 161             |
| Streptocarpus . . . . .            | 139        | Tornelia . . . . .                   | 134        | Wigandia . . . . .              | 129             |
| Stromanthe . . . . .               | 164        | Torreya . . . . .                    | 177        | Witsenia . . . . .              | 177             |
| Stylidium . . . . .                | 176        | Toxicophleæa . . . . .               | 129        | Woodwardia . . . . .            | 145             |
| Styphelia . . . . .                | 176        | Tradescantia . . . . .               | 129        | Xanthochymus . . . . .          | 129             |
| Swainsonia . . . . .               | 176        | Tremandra . . . . .                  | 177        | Xanthorrhoea . . . . .          | 177             |
| Swietenia . . . . .                | 129        | Trichinium . . . . .                 | 177        | Xanthosoma . . . . .            | 134             |
| Syagrus . . . . .                  | 161        | Trichoceros . . . . .                | 156        | Yuca . . . . .                  | 177             |
| Synechanthus . . . . .             | 161        | Trichomanes . . . . .                | 145        | Zalacca . . . . .               | 161             |
| Syngonium . . . . .                | 134        | Trichophila . . . . .                | 156        | Zamia . . . . .                 | 138             |
| Tabernaemontana . . . . .          | 129        | Tricyrtis . . . . .                  | 177        | Zamioculcas . . . . .           | 134             |
| Tacca, voir <i>Ataccia</i> . . . . | 110        | Trithrinax . . . . .                 | 161        | Zygopetalum . . . . .           | 157             |

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 162, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne, etc.

N° 163, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les *Azalea mollis* (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère.

N° 164, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, etc.

N° 165, comprenant les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tous genres, etc.

N° 166, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias bulbeux, les Pommes de terre, etc.

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXII<sup>e</sup> volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra fin avril.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)**